

មគ្គុទេសក៍នៅតំបន់វាលឆ្នេរ៖ទៅស្នាស់

ឋានិកសត្វ

នៃ ប្រទេស កម្ពុជា



A Guide to the
MAMMALS OF CAMBODIA



សៀវភៅថវិកាសត្វកម្ពុជា

រៀបរៀងដោយ

ម៉ែន សុរិយន៌ សួន ធីត្តា ស៊ិន ប៊ូលីន និង

Joe Walston

រចនា និង បញ្ចូលរូបភាពដោយ

លោកស្រី សុត សុភ័ណ្ឌ និង លោក អាឡាំង មីស្ស

បោះពុម្ពលើកទី២

ឆ្នាំ ២០០៧



មាតិកា

Table of Contents



១. ក្រុមកន្ទឹក TREESHREWS



២. ក្រុមកំប្រុក SQUIRRELS



៣. ក្រុមប្រម៉ា PORCUPINES



៤. ក្រុមថនិកសត្វកកេរ RATS



៥. ក្រុមប្រចៀវ BATS



៦. ក្រុមពានរ PRIMATES



៧. ពង្រួល PANGOLIN



៨. ឆ្កែ DOGS



៩. ខ្លាប្តុំ BEARS



WILD PIG ជ្រូកព្រៃ .១០



SMALL CARNIVORES មំសាសីថ្នាក់តូច.១១



OTTERS ក្រុមកេ .១២



CATS ក្រុមមំសាសី(ខ្លា) .១៣



ELEPHANT ដំរី .១៤



RHINOCEROS រមាស .១៥



DEER ក្រុមតិណាសី ថ្នាក់តូច .១៦



WILD CATTLE ក្រុមគោសាទិស.១៧



HARE ប្រភេទទន្សាយ .១៨



CETACEA ថនិកសត្វសមុទ្រ .១៩



សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ

ជាប់រមសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តម **ចិត្ត សុគន្ធ** ប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ លោក **ម៉ែន ភិរម្យ** ប្រធានការិយាល័យការពារសត្វព្រៃដែលបានគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងលើកកម្ពស់ភាពចុះស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក **ញ៉ិក រតនៈពេជ្រ** ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្តង់ដារសត្វព្រៃជាតិ ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការថតរូបភាពសត្វនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តង់ដារសត្វព្រៃជាតិ ព្រមទាំង លោក **ស៊ុន ហ៊ាន** និងលោក **Colin Poole** ដែលបានផ្ដើមរៀបចំសៀវភៅថតនិកសត្វនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូង។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក **កែវ អូម៉ាលីស្យ** និង លោក **ចក់ សុខវិជ្ជបុត្រ** ដែលបានប្រឹងប្រែងរៀបចំបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថតនិកសត្វនៅកម្ពុជា លើកទីមួយ។

សៀវភៅនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេ ប្រសិនបើពុំមានការជួយកែសម្រួលទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធនិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសពី លោក **សិន ភក្តី** និង លោក **លូ រត្នី**។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក **សុខ គោ ឥត** ម៉េងហ៊ី ប៊ិច ប៊ុនណាត វ៉ត ប៊ុនធឿន លី វុឌ្ឍិ ឈៀង ដានី សេង គឹមហ៊ាត់ ផៃ សូម៉ានី ព្រំ សុវណ្ណា អាន តារា ហុត ពិសិដ្ឋ ហុង ចំណាន តាន់ សេដ្ឋា សុង ចាន់សុជាតិ ហេង គឹមធាយ អ៊ូ រតនៈ រ៉ូ ប៊ូរី ទឹម សូលីតា តាន់ ថាវ៉ា **Allan Michaud, Annette Olsson, Ben Rawson, Hanneke Nooren,** និង **Edward Pollard** ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងការងារបច្ចេកទេសទាំងឡាយ និងផ្តល់រូបភាពថតនិកសត្វមួយចំនួន ដើម្បីឱ្យការបោះពុម្ពសៀវភៅថតនិកសត្វលើកទី២នេះ បានទទួលជោគជ័យចប់សព្វគ្រប់។

សូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម អស់លោក លោកស្រីទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការរៀបចំសៀវភៅថតនិកសត្វកម្ពុជាលើកទី២នេះ សូមទទួលបាននូវ បញ្ញាឈ្លាសវៃ សុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ជួបតែវិបុលសុខ សុភមង្គល និងសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង:

- ១. រដ្ឋបាលព្រៃឈើ អាគារលេខ៤០ ខណ្ឌដូនពេញ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ក្រុងភ្នំពេញ។
 - ២. អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ (WCS) ផ្ទះលេខ២១ ផ្លូវលេខ២១ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។
- ទូរស័ព្ទដៃ: (៨៥៥-១២) ៨១៥ ១២៣

អារម្ភកថា

ថនិកសត្វព្រៃ គឺជាសាសនាភាគមួយនៃធនធានធម្មជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ និងផ្តល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រព័ន្ធធម្មជាតិនៅលើផែនដីតាមរយៈសោភ័ណភាព តម្លៃវិទ្យាសាស្ត្រ វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រភេទសត្វនីមួយៗ ព្រមទាំងទម្រង់ផ្សេងគ្នារបស់វាដែលបង្កើតបានជាផ្នែកមួយមិនអាចជំនួសបានក្នុងធម្មជាតិ និងសម្រាប់ការកំសាន្តរបស់មនុស្សជំនាន់នេះ និងជំនាន់ក្រោយ។ ជាអកុសលពពួកសត្វព្រៃមួយចំនួនបានវិនាសផុតពូជ និងមួយចំនួនទៀតកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ និងជួបវិបត្តិដោយសារការមានកំណើននៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស ការខ្វះខាតចំណីអាហារ ការបំពុលនៃសារធាតុគីមី និងការបាត់បង់មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់វា។ ជីវិតសត្វព្រៃអាចនឹងត្រូវវិនាសសាបសូន្យពីលើផែនដីនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ប្រសិនបើភាពរងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់។

ការរក្សាទីជម្រក និងអភិរក្សធនធានសត្វព្រៃ គឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុត របស់រដ្ឋឬប្រទេស ដែលគ្រប់គ្រងលើធនធានសត្វព្រៃទាំងនោះ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះ គេត្រូវតែរៀបចំបង្កើត ឱ្យមានគម្រោងអភិរក្ស និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការរួមចំណែកការពារ និងអភិរក្ស។ តួឯកដូចជា វិធានការថ្មីៗ ដែលបានអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាល រួមមានការអនុម័តច្បាប់ ការកែទម្រង់វិស័យគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ និងធនធានជីវចម្រុះ ការរៀបចំបង្កើតតំបន់ព្រៃការពារ និងតំបន់អភិរក្សនានា ព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិរក្ស និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរ។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការអភិរក្សកម្រិតអន្តរជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ ដោយបានសម្រេចចូលជាសមាជិក អនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាអនុសញ្ញាស្តីពី ជីវចម្រុះ អនុសញ្ញាសាយតេស អនុសញ្ញា ស្តីពី បំរែបំរួលអាកាសធាតុ អនុសញ្ញា ស្តីពី តំបន់ដីសើម កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពី ជីវចម្រុះ និងអនុសញ្ញា សាយតេសជាដើម។ សៀវភៅថនិកសត្វនៅកម្ពុជា គឺជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនូវពុទ្ធិនៃធនធានថនិកសត្វព្រៃនានា ដែលកំពុងរស់នៅ និងមានវត្តមាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សៀវភៅនេះអាចនឹងបង្កើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងច្រើនអំពីភាពសំបូរបែប តម្លៃនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន មន្ត្រីរាជការ គ្រប់ថ្នាក់ និងជនាញ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកអភិរក្ស ស្រាវជ្រាវអំពីធម្មជាតិ ព្រមទាំងអាចទាក់ទាញនូវភ្ញៀវទេសចរធម្មជាតិដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងពពួកថនិកសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាផងដែរ។

ការបោះពុម្ពលើកទីពីរ គឺជាស្នាដៃរៀបរៀងរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃការិយាល័យការពារសត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការចុះស្រាវជ្រាវ អង្កេតនៅលើភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែង រួមផ្សំនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសារដែលមានស្រាប់ និងសហការជាមួយអ្នកសត្វសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ និងអភិរក្សពួកសត្វព្រៃទាំងនោះនៅកម្ពុជា។ ហេតុនេះការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្ត្រីរាជការ សិស្ស និស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងសកម្មភាពអភិរក្ស គឺជាសកម្មភាពមួយសំខាន់បំផុត ដើម្បីធានាឱ្យការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ និងការអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានចីរភាព ។

សេចក្តីផ្តើម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាប្រទេសមួយដែលមានភ័ព្វវាសនាជាងគេក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយបានទទួលចំណងជ័យធម្មជាតិ ទាំងព្រៃឈើ សត្វព្រៃ និងធនធានជីវចម្រុះដទៃទៀត។ សត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ មិនគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សាគុណភាពធម្មជាតិ ទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅ និងបង្កើនផាសុកភាពសម្រាប់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បំណងប្រាថ្នា និងតម្រូវការផ្នែកអារម្មណ៍របស់មនុស្ស និងសង្គមថែមទៀត។ តាមរយៈការជម្រុញឱ្យមានកម្មវិធីទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ពពួកសត្វព្រៃបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ ប៉ុន្តែគួរឱ្យស្តាយធនធានជីវចម្រុះទាំងនេះ បាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ ដែលមានប្រភេទសត្វព្រៃខ្លះបានបាត់បង់ក្នុងកម្រិតមួយគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ការបំផ្លាញទីជម្រក ការធ្វើអាជីវកម្មលើសំណាកនៃប្រភេទសត្វព្រៃ ការរាលដាលនៃជម្ងឺទៅលើការរស់នៅរបស់ពពួកថនិកសត្វព្រៃ គ្រោះធម្មជាតិ និងការបំពុលគីដាកត្តាចម្បងនៃការបាត់បង់ជីវចម្រុះ និងពពួកថនិកសត្វគ្រប់ប្រភេទ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រហូតមកទល់ពេលនេះនៅមានប្រភេទសត្វព្រៃមួយចំនួនដូចជា សត្វគោព្រៃ និងរមាស ដែលអ្នកធម្មជាតិវិទ្យា នៅមិនទាន់ហ៊ានអះអាងច្បាស់លាស់ពីវត្តមានជាក់ស្តែង របស់ពួកវានៅឡើយទេ។

ប្រឈមមុខចំពោះស្ថានភាពបាត់បង់ខាងលើ និងស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីគោលនយោបាយវិស័យព្រៃឈើជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ កំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារ និងអភិរក្សសត្វព្រៃ ព្រៃឈើ និងធនធានជីវចម្រុះទាំងនេះ ទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងក្រៅតំបន់យ៉ាងសកម្មបំផុត ដោយបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវ បង្កើត និងពង្រឹងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសត្វព្រៃទាំងឡាយ ឱ្យក្លាយទៅជាតំបន់ព្រៃការពារ សម្រាប់អភិរក្សធនធានសេនេទិច រុក្ខជាតិ សត្វព្រៃ និងធនធានជីវចម្រុះទាំងឡាយ បន្ថែមលើតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង ២៣កន្លែងដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ លើសពីនេះទៅទៀត ផ្នែកលើយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និងកម្មវិធីកំណែទម្រង់លើវិស័យព្រៃឈើ រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បាននិងកំពុងរៀបចំកសាងលិខិតបទដ្ឋានស្របច្បាប់មួយចំនួនបន្ថែមទៀត សំដៅការពារអភិរក្ស និងគ្រប់គ្រងពពួកសត្វព្រៃ ជាពិសេសប្រភេទថនិកសត្វទាំងឡាយឱ្យបានរស់នៅមានចីរភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បាននិងកំពុងជម្រុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ

ជាសាធារណៈស្តីពីការអភិរក្សសត្វព្រៃ និងព្រៃឈើយ៉ាងសកម្ម ព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយអង្គការ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយ និងទប់ស្កាត់រាល់កត្តាទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឱ្យមានការគំរាមកំហែង ការវិនាសបាត់បង់ពូកថនិកសត្វ និងសត្វព្រៃទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថនិកសត្វនៅកម្ពុជាលើកទី២នេះ មានគោលបំណងផ្តល់ជាវិភាគទានដល់ការស្វែងយល់ និងផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីជីវសាស្ត្រ និងអត្តសញ្ញាណនៃប្រភេទថនិកសត្វនីមួយៗ ។ ការអធិប្បាយប្រភេទសត្វនីមួយៗ បានផ្តោតទៅលើការវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈសម្គាល់នៃរូបរាងសត្វ លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ របាយរស់នៅតាមភូមិសាស្ត្ររបស់សត្វក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនៅលើពិភពលោករួមទាំងមានពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់ប្រភេទសត្វនីមួយៗ ស្របតាមច្បាប់ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានា ដែលកម្ពុជាបានចូលរួមជាសមាជិករួចហើយ ។ យោងតាមឯកសារចាស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវត្តមានថនិកសត្វចំនួន ២១២ប្រភេទ ដែលក្នុងនោះថនិកសត្វថ្នាក់ធំសំខាន់ៗ មានដូចជា គោព្រៃ រមាស ដំរី ខ្លាំង ទន្សោង រមាំង ប្រើស ខ្លាធំ ខ្លាខ្លី ខ្លាឃ្មុំ ដែលមានវត្តមានរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រភេទថនិកសត្វរស់នៅក្នុងទឹកប្រៃ និងទឹកសាបមួយចំនួនដូចជា ផ្សោត បាឡែន និងជ្រូកទឹកជាដើម ។ ប៉ុន្តែជាអកុសល ប្រភេទខ្លះ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពុំទាន់មានកំណត់ត្រា និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ ។ ប្រភេទសត្វនីមួយៗមានបញ្ចូលរូបភាពច្បាស់សម្រាប់ឱ្យអ្នកអាន សិស្ស និស្សិត និងសត្វវិទូ ឬអ្នកស្រាវជ្រាវ ងាយស្រួលសម្គាល់ និងកំណត់ចំណាំ ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារសំខាន់ សម្រាប់បន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើ ពូកថនិកសត្វនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាពេលអនាគត និងសម្រាប់ជាបច្ច័យដល់ការកែលម្អ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយលើកក្រោយទៀត ។ ការចូលរួមសហការពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន អង្គការអភិរក្ស និងស្ថាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាមួយនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកការពារ និងអភិរក្សធនធានសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប្រកបដោយចីរភាព សម្រាប់រក្សាលំនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ និងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀត ។

វិធីសាស្ត្រនៃការអង្កេតស្រាវជ្រាវថនិកសត្វ

ការអង្កេតស្រាវជ្រាវថនិកសត្វនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ឬ នៅលើភូមិសាស្ត្រជាក់ស្តែងមាន វិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាង និងទាមទារនូវចិត្តអំណត់ច្រើនក្នុងពេលចុះអង្កេត និងតាមដានសត្វ ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថនិកសត្វនិយមប្រើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជា ការចុះសម្ភាសន៍ ជាមួយប្រជាជនដែលមានបទពិសោធន៍ និងរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ ការប្រើ វិធីសាស្ត្រត្រង់ស៊ីក និងការដាក់ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិ ។ល។ សម្រាប់ការសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រ ស្រាវជ្រាវថនិកសត្វនៅកម្ពុជាសូមអានឯកសារជាភាសាខ្មែរ ស្តីពីការអភិរក្ស និងស្រាវជ្រាវ សត្វព្រៃនៅលើភូមិសាស្ត្ររបស់លោក អាឡាំង រូប៊ីណូវិច (Alan Robinowitz) ។

ការកំណត់ហៅឈ្មោះប្រភេទថនិកសត្វជាភាសាខ្មែរ

ប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃច្រើនប្រភេទ ដូចជា ពពួកថនិកសត្វ ឧរង្គសត្វ សត្វស្លាប និងប្រភេទជីវចម្រុះផ្សេងទៀត ។ សត្វស្លាបចំនួន ៥៣៥ ប្រភេទ (សត្វស្លាបនៃប្រទេស កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៣) និង ថនិកសត្វ ៨៨ប្រភេទ (ថនិកសត្វនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០០) ត្រូវបាន បោះពុម្ពជាលើកដំបូង ។ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅខាងលើនេះ ផលលំបាកមួយដែលក្រុម អ្នករៀបរៀងបានជួបប្រទះគឺ ការកំណត់ហៅឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃនីមួយៗជាភាសាខ្មែរ ។ បញ្ហានេះ បណ្តាលមកពីកត្តាចំនួនពីរ គឺ:

កត្តាទី១. ប្រភេទសត្វព្រៃមួយចំនួន នៅពុំទាន់មានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាតាម តំបន់ (Local Name) នៅឡើយ គឺមានតែភាសាអង់គ្លេស និងឈ្មោះជាឡាតាំង ឬឈ្មោះ វិទ្យាសាស្ត្រ) ប៉ុណ្ណោះ (English Name and Scientific Name) ។ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះមាន ទស្សនៈផ្សេងដោយមិនដាក់ឈ្មោះតាមភាសា អង់គ្លេស ឬ ឈ្មោះឡាតាំងដែលមានស្រាប់ ទាំងនោះទេ ព្រោះពួកគេបានចុះជួបសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជាជនតាមមូលដ្ឋាន ឬ តាមតំបន់ដែល មានពពួកសត្វព្រៃរស់នៅ ហើយបានហៅឈ្មោះសត្វនូវពាក្យតែមួយដូចគ្នា ។ ឧទាហរណ៍ ប្រភេទថនិកសត្វថ្នាក់តូច (Small Mammals) ដូចជាពពួកអំបូរកន្ទឹក សំពោច ប្រចៀវ និង កំប្រុក ជាដើម ដែលភាគច្រើនសត្វនីមួយៗ ពុំទាន់មានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់នៅឡើយ ឬសូម្បីតែឈ្មោះតាមមូលដ្ឋាន តាមតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសក៏ពុំទាន់មានដែរ គឺគ្រាន់តែហៅ បានត្រឹមតែហៅឈ្មោះទូទៅតែមួយថា ជាកំប្រុកៗ ឬ ប្រចៀវៗ ជាដើម ។ល។ ម្យ៉ាងទៀតនៅ មានប្រភេទថនិកសត្វជាច្រើនទៀត ដែលការហៅឈ្មោះរបស់ពួកវានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅ ឡើយទេ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកស្រុកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី ហៅប្រភេទសត្វមួយថា ឆ្មាបា (Sunda Colugo , *Cynocephalus variegatus*) ចំណែកឯប្រជាជនមួយចំនួន នៅភូមិភាគខាង

ជើង ហៅកំប្រុកធំ ឬកំប្រុកស្លាបធំ ថាជា ឆ្មាបា ទៅវិញ។ តាមពិតកំប្រុកធំ មានឈ្មោះអង់គ្លេស និងឡាតាំង (Black Giant Squirrel, *Ratufa bicolor*) រីឯ កំប្រុកស្លាបធំ មានឈ្មោះអង់គ្លេស និងឡាតាំង (Indian Giant Flying Squirrel, *Petaurista philippensis*) ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកនិពន្ធបានសម្រេចយក Sunda Colugo ហៅជាភាសាខ្មែរថា ឆ្មាបា ដោយផ្អែកលើសណ្ឋាន រូបសាស្ត្រ និង ជីវសាស្ត្រ ។

កត្តាទី២. ជាទូទៅប្រជាជនមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែមានការភ័ន្តច្រឡំ ក្នុងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះ បើទោះជាប្រភេទសត្វមួយចំនួននោះត្រូវបានគេស្គាល់ និងដឹង ឮរួចហើយក៏ដោយ ។ ដូចជា ប្រភេទសត្វ ទន្សោង (Banteng) តែអ្នកខ្លះបែរជាច្រឡំថា គោព្រៃ (Kouprey) ទៅវិញ ។ នោះក៏បណ្តាលមកពីការហៅរបស់អ្នកកវិនិពន្ធមួយចំនួនដែលតែងតែភ្ជាប់ពាក្យ ទន្សោង ជាមួយ គោព្រៃ នៅក្នុងបទចំរៀង កំណាព្យ ឬ ប្រលោមលោកជាដើម ដែលនាំឱ្យមានការច្រឡំថា ទន្សោង និងគោព្រៃជាប្រភេទសត្វតែមួយ ។ ការប្រើពាក្យថាតែមួយ "ទន្សោងគោព្រៃ" បែបនេះ ព្រោះថាទន្សោងជាសត្វដែលមានរូបរាងដូចគោបេះបិទ គ្រាន់តែផ្នែកកូចរបស់វាមានពណ៌ស ហើយសត្វប្រភេទនេះរស់នៅក្នុងព្រៃ ជាហេតុធ្វើឱ្យគេច្រឡំហៅថា "គោព្រៃ" តែម្តង ។ ការហៅ ទាំងច្រឡំបែបនេះ ធ្វើឱ្យមានការច្រឡំតាមរយៈការរៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីប្រជុំជន ទីក្រុង តំបន់ទំនាបកណ្តាល ដែលមិនធ្លាប់បានឃើញសត្វព្រៃហៅទាំងច្រឡំតាមគ្នា ។ នេះជាកង្វល់នៃអ្នក សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកជំនាញបរទេសផងដែរ ។ ហេតុនេះ ការស្គាល់ប្រភេទសត្វព្រៃទាំងអស់នោះ គឺអាស្រ័យទៅលើការវិភាគចេញពីភាសាអង់គ្លេស ដោយផ្អែកលើឈ្មោះដែលមានស្រាប់ (សក្ខណៈរូបសាស្ត្រ សក្ខណៈជីវសាស្ត្រ និងភូមិសាស្ត្រដែល វាស់នៅ) និងឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ។

ការយល់ដឹង និងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះសត្វដែលមានស្រាប់ភាគច្រើនតែងតែផ្តោតទៅ លើប្រភេទសត្វធំៗ និងប្រភេទមួយចំនួនដែលមានការជួបប្រទះញឹកញាប់ធ្វើឱ្យប្រជាជនយើង មានលទ្ធភាពដាក់ឈ្មោះ ប្រភេទសត្វទាំងនោះបាន ឬហៅតាមរយៈការរៀនមក ។ ប្រភេទសត្វមួយ ចំនួនធំនៅក្នុងសៀវភៅថ្នាក់កណ្តាលនេះ ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយក្រុមអ្នកសត្តសាស្ត្រខ្មែរ ដើម្បី បំពេញឱ្យបាននូវការហៅឈ្មោះជាភាសាខ្មែរគ្រប់ប្រភេទសត្វទាំងអស់ដែលបានរកឃើញថាមាន វត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសប្រភេទដែលមានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅនេះ ។

ដើម្បីឱ្យការរៀបចំចងក្រងសៀវភៅនេះឱ្យបានល្អប្រសើរនៅលើកក្រោយទៀត យើងខ្ញុំ អ្នករៀបរៀង សូមអនុញ្ញាតទទួលយកនូវមតិវិចារ កែលម្អ និងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពីសំណាក់ សម្តេច ព្រះអង្គម្ចាស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី ក្នុងគោលបំណងនៃការចូលរួម ចំណែកនៃការអភិរក្សធនធាន ជីវចម្រុះប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

របៀបកត់សម្គាល់ថនិកសត្វ

ដូចម្តេចដែលហៅថាថនិកសត្វ?

ថនិកសត្វគឺជាប្រភេទសត្វដែលមានលក្ខណៈខុសពីប្រភេទសត្វដទៃទៀតដោយលក្ខណៈច្រើនយ៉ាង ។ គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ផ្តល់កំណើតជាកូន ហើយចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ ។ ថនិកសត្វភាគច្រើនមានរោម សូម្បីតែថនិកសត្វរស់នៅក្នុងទឹកដូចជាពូកផ្សោត និងបាឡែន ក៏មានរោមនៅលើដងខ្លួនដែរ ប៉ុន្តែវាមិនបញ្ចេញច្បាស់ឱ្យយើងសង្កេតមើលបានពីចម្ងាយដូចថនិកសត្វរស់នៅលើគោកឡើយ ។ គ្រប់ប្រភេទសត្វទាំងអស់គឺមានឈាមក្តៅ និងបែងចែកជាលក្ខណៈកាយ-វិភាគសាស្ត្រច្រើន ។ ភាគច្រើនមានអវយវៈដៃជើង៤ ដែលជើងពីរនៅខាងមុខ និងជើងពីរនៅខាងក្រោយ ឬ ក៏យើងអាចហៅបានថា ស្លាប ឬ ដៃ ។ ថនិកសត្វមួយចំនួនតូចមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសត្វស្លាប ល្អិត និងមច្ឆា ដែលអាចបង្កឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំគ្នាដូចជា អំបូរប្រចៀវត្រូវបានគេគិតច្រឡំថាជាសត្វស្លាប ពីព្រោះវាអាចហើរបាន សត្វពង្រួលច្រឡំថាជាពពួកសត្វល្អិតព្រោះ វាមានស្រកា និងអណ្តាតវែង ចំណែកឯត្រីបាឡែន និងត្រីផ្សោតវិញក៏ត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាត្រីផងដែរ ។ ប៉ុន្តែធាតុពិតនោះពួកវា គឺជាថនិកសត្វ ដោយពួកវាពពួកសត្វមានឈាមក្តៅ បង្កកំណើតកូនខាងក្រៅ និងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ។

ប្រភេទសត្វនីមួយៗត្រូវបានគេកំណត់ជាផ្លូវការដោយឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលឈ្មោះទាំងនោះជាធម្មតា ត្រូវបានគេសរសេរជាអក្សរឡាតាំង ឬក្រិច ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោក ។ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះជាទូទៅត្រូវបានគេសរសេរជាអក្សរទ្រេត ដោយមានពីរឃ្លា ដើម្បីសម្គាល់ពីអំបូរ និងប្រភេទរបស់វា ។

ការកំណត់កិនភាគថនិកសត្វ:

សម្បុរជានិច្ចយល់ខាន់បំផុតដែលនាំទៅដល់ការស្គាល់ថនិកសត្វ ។ នៅពេលជួបប្រទះសត្វ កត្តាសំខាន់នោះត្រូវពិនិត្យមើលពណ៌នៅលើដងខ្លួនរបស់វា ។ ទំហំក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ សំរាប់បែងចែកលក្ខណៈខុសគ្នាពីថនិកសត្វមួយទៅមួយ ហើយទំហំនោះអាចមានការប្រែប្រួលដោយអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈ សណ្ឋានរបស់វា ប្រសិនបើខ្លួនមានរាងកោងនោះដងខ្លួនរាងខ្លី ចំណែកឯកន្ទុយមានរាងវែង ។

ការស្វែងរក និងការសិក្សាអំពីថនិកសត្វ

ជាទូទៅទោះបីជាថនិកសត្វមានការលំបាកអង្កេតជាងសត្វស្លាបក៏ដោយ ក៏គេមានវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីស្វែងរក និងសិក្សាអំពីថនិកសត្វទាំងនោះ។ វិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺផ្អែកលើប្រភេទថនិកសត្វ និងទីជីវកដែលពួកវាស់នៅ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទថនិកសត្វភាគច្រើនចូលចិត្តរស់នៅព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ រីឯប្រភេទមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃដែលសម្បូរដោយវាលភក់ និងមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ ឬតំបន់ព្រៃភ្នំ ហើយប្រភេទទាំងអស់តែងតែរស់នៅដោយធ្វើផ្ទះទីពឹងកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ។ នៅពេលថ្ងៃសត្វស្លា កំប្រកខ្លះ និងកន្ត្រឹក ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើដើម ឈើ រីឯប្រភេទថនិកសត្វធំៗមួយចំនួនដូចជា ជ្រូកព្រៃ ដំរី ខ្លា ខ្លីង ទន្សោង ស្តា ខ្លាឃ្មុំ និងភេ ត្រូវបានគេប្រទះឃើញធ្វើសកម្មភាពនៅលើដី។ ប្រភេទថនិកសត្វថ្នាក់ធំភាគច្រើនមានការលំបាកខិតចូលទៅជិតណាស់ដោយសារពួកវាឆាប់ឆ្អើល។ ចំណែកសត្វដែលច្រើនធ្វើសកម្មភាពនៅពេលយប់មានដូចជាៈ ពពួកសត្វ សំពោច កណ្តុរ កំប្រកស្លាប ប្រឡៅវី ជ្រីង ។ល។

ដូច្នេះឱកាសនៃការអង្កេតថនិកសត្វដែលរកស៊ីនៅពេលយប់គឺងាយជាងថនិកសត្វដែលធ្វើសកម្មភាពនៅពេលថ្ងៃពីព្រោះថនិកសត្វដែលរកស៊ីពេលយប់មិនសូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចថនិកសត្វរកស៊ីនៅពេលថ្ងៃនោះទេ។ វិធីសាស្ត្រសំខាន់បំផុតក្នុងការអង្កេតនៅពេលយប់យើងត្រូវមានពិលគោមធំមួយ និងពិលសំរាប់ពាក់នៅលើក្បាលមួយដែលមានកំលាំងវ៉ាត់ពី៣០-៥០W ងាយស្រួលក្នុងការអង្កេតសត្វនៅលើដើមឈើផងដែរ។

ការអង្កេតដានថនិកសត្វក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយសំខាន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការវាស់វែង និងការរាប់ចំនួនដានដែលអាចឱ្យយើងដឹងអំពីចំនួន និងអាយុរបស់វា។

ក្រុមកន្ទីក

TREESHREWS



សេចក្តីផ្តើម: កន្ទីកជាសត្វដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Tupaiidae ហើយវាគឺជាសត្វដែលស្ថិត
ស្ថិតជាអាហារដែលវត្តមានរបស់វាមាននៅតាមតំបន់ឥណ្ឌូម៉ាឡាយ៉ាន។ វាមានរូបរាងស្រដៀង
គ្នាទៅនឹងសត្វកំប្រកដែរ ពីព្រោះវាមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានភ្នែកធំ កន្ទុយសំពោងវែង និង
មានមាត់ប្រែងស្រួចវែង។ ទោះបីជាវាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Tupaiidae នេះក៏ដោយ វាពិតជាមានការ
ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអំបូរពានរង្វងដែរ ដូចនេះហើយទើបប្រភេទទាំងនេះត្រូវបានចុះ
នៅក្នុងបញ្ជីសាយរតសទាំងអស់។ ប្រភេទមួយចំនួនរស់នៅលើដើមឈើ ឯប្រភេទមួយចំនួន
ទៀតរស់នៅ និងរកចំណីអាហារនៅលើដី។ កន្ទីកគឺជាសត្វដែលរកចំណីនៅពេលថ្ងៃ ដោយស៊ីរុក្ខ
ជាតិ និងសត្វល្អិតផ្សេងៗជាច្រើន។ គេប្រទះឃើញប្រភេទនេះរស់នៅតាមទីជីវកជាច្រើនប្រភេទ
ចាប់ពីព្រៃស្រោងរហូតដល់ព្រៃឫស្សីក្រាស់ ចំការ និង សួនច្បារ។

កន្លឹកក្បាលឆ្នូត

កំណត់: កន្លឹកក្បាលឆ្នូតមានប្រវែងក្បាល និងដងខ្លួនពី ១១៥-១៣៥ម.ម កន្ទុយមានប្រវែងពី ១០៥-១៣០ និងមានទម្ងន់ពី ៣៥-៥៥ក្រាម ។ ប្រភេទនេះគេអាចសំគាល់បានដោយសារវាមានច្រមុះស្រួចវែង កន្ទុយវែង និងមានរោមខ្លី ។ រោមនៅលើដងខ្លួនខ្លី និងរលោង ។ ខ្នងមានសំបុរ ប្រផេះចាស់រហូតភ្លាតចាស់ ហើយពោះ និងផ្នែកសងខាងដងខ្លួនមានពណ៌ត្នោត ។ មានឆ្នូតពណ៌ខ្មៅជាច្រើនលាតចាប់ពីច្រមុះកាត់តាមក្រោមភ្នែករហូតដល់គុម្ពត្រចៀក និងមានឆ្នូតពណ៌សអមសងខាង ។ សត្វឈ្មោលមានទំហំធំ និងពណ៌ភ្លឺជាងសត្វញី ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះភាគច្រើនរស់នៅតាមគុម្ពត្រចៀក និងគុម្ពឫស្សី ព្រៃស្រោង និងព្រៃបោះ ។ វាជាសត្វរកស៊ីនៅពេលថ្ងៃ ហើយចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជាផ្លែឈើ និង សត្វល្អិត ជាពិសេសពពួកអណ្តើកមាស និងកំព្លោជាដើម ។ ប្រភេទនេះមានការបន្តិសម្លេងឮខ្លាំង ។

របៀបរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា វាមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តកោះកុង មណ្ឌលគីរី និងតំបន់ភូមិភាគខាងជើង ។ ប្រភេទនេះក៏មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ឡាវ និងថៃភាគខាងកើត ។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: គេមិនទាន់ដឹងស្ថានភាពអភិរក្ស ពួកវាពិតប្រាកដនៅឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែវាទំនងមិនមែន ជាប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែងជាសកលនោះទេ ។

Mainland Slender-tailed Treeshrew

Dendrogale murina



© Jonathan Linus Fiely



កន្លឹក

វិនិច្ឆ័យ: ប្រភេទនេះមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ១៣៥-២០៥ម.ម កន្ទុយមានប្រវែងពី ១២៥-១៩៥ម.ម និងមានទម្ងន់ពី ៨៣-១៨៥ក្រាម ។ វាមានរូបរាងដូចកំប្រុកដោយមានកន្ទុយវែងសំពោង និងមានច្រមុះវែងហើយស្រួច ។ ខ្នងនិងកន្ទុយមានពណ៌ត្នោតចាស់ ចំណែកឯពោះមានពណ៌ត្នោតស្រាល ។ ដូចគ្នានឹងប្រភេទផ្សេងទៀតដែរ នៅក្នុងអំបូរនេះ វាមានឆ្មុតតូចពណ៌លឿងស្រាលនៅលើស្មា ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅតាមទីជីវកផ្សេងៗជាច្រើនចាប់ពីព្រៃស្រោងព្រៃបោះ ចូលព្រៃក្ស រហូតដល់ចំការ ។ វាភាគច្រើនរស់នៅលើដើមឈើ តែវាវកចំណីនៅលើដី ។ វាជាសត្វទីវាចរ (រកស៊ីនៅពេលថ្ងៃ) ហើយចំណីអាហាររបស់វារួមមានសត្វល្អិត ពីងពាង ជន្លេន និងផ្លែឈើ ។

របាយការណ៍: ប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជា ។ ហើយពួកវាក៏មានត្រូវបានប្រទះឃើញផងដែរនៅប្រទេស បង់ក្លាដេស ភូមា ថៃ ឥណ្ឌូចិន ចិនភាគខាងត្បូង និងអាស៊ាន ។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្ករ ។

Northern Treeshrew

Tupaia belangeri



© WCS



ក្រុមកំប្រុក

SQUIRRELS



សេចក្តីផ្តើម: កំប្រុកគ្មានស្លាបជាប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ (Sciuridae) និងកំប្រុកមានស្លាប ស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ (Pteromyidae) ។ កំប្រុកមានស្លាបមានភ្នែក និងត្រចៀកធំ ហើយកន្ទុយមាន រោមវែងសំពោង ។ សត្វកំប្រុកមានវត្តមាននៅតាមបណ្តាប្រទេសនានា នៅលើពិភពលោក ។ ទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់វាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីក្រុមកំប្រុកគ្មានស្លាប ដោយក្រុមកំប្រុកគ្មានស្លាបចូលចិត្តរកចំណីនៅពេលថ្ងៃ រីឯក្រុមប្រភេទមានស្លាបវិញចូលចិត្តស្វែងរកចំណីនៅពេលយប់ ។ កំប្រុកភាគច្រើនរស់នៅលើដើមឈើ និងភាគតិចចូលចិត្តបន្ទុះជីវិតរស់នៅលើដី ។ កំប្រុកជាប្រភេទតិណ្ហសី ប៉ុន្តែមានប្រភេទមួយចំនួនចូលចិត្តស៊ីសត្វល្អិតតូចៗ និងពងសត្វផងដែរ ។ មានប្រភេទកំប្រុកជាច្រើន ដែលបានផ្លាស់ពណ៌សម្បុរទៅតាមតំបន់ ឬទីជម្រកដែលវាស់នៅ និងជួនកាលវាប្តូរពណ៌ពេលដែលវាស់នៅក្នុងតំបន់តែមួយ ។ កំប្រុកមានស្លាបមានក្លាស់នៅជើងមុខ និងជើងក្រោយដែលអាចឱ្យវាហើរសំកាំងបានរហូតដល់ទៅរាប់រយម៉ែត្រពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយទៀត ។ កំប្រុកមានធ្មេញស្រួចអាចបង្កឱ្យមានរបួស ឬ ដំបៅក្លាយបាន ព្រោះមានកំប្រុកខ្លះមានមេរោគឆ្លង ពីសត្វល្អិតចង្រៃដែលស្ថិតនៅលើបន្លែផ្លែឈើជាចំណីអាហាររបស់វា ។ អ្នកស្រាវជ្រាវអង្កេតសត្វកំប្រុកខ្លះអាចសម្គាល់ពីវត្តមានសត្វកំប្រុកនៅក្នុងតំបន់មួយបានតាមរយៈរោមជម្រុះរបស់វា ។ នៅប្រទេសប៊ីកចច្រើនកំប្រុកប្រភេទខ្លះត្រូវបានគេបង្ហាត់ឱ្យចេះសំដែង និងកាន់ចំណីអាហារស៊ីដូចពពួកសត្វស្វាផងដែរ ។ មានសត្វកំប្រុក ៦ប្រភេទ ត្រូវបានគេតំត្រា និងបញ្ជាក់ថាវាមានវត្តមានរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

កំប្រុកពោះប្រជេះ

រិទ្ធភាព: កំប្រុកពោះប្រជេះមានរោមទន់ ហើយនៅផ្នែកខាងលើមានពណ៌ត្នោត និងផ្នែកខាងក្រោមមានពណ៌ប្រផេះស្រាល ឬ ស ។ វាមានកន្ទុយសំពោងរង្វើលបង្កប់ដោយជួរពណ៌ខ្មៅលាយស ។ កំប្រុកពោះប្រជេះមានបាតជើងធំទូលាយ ហើយនៅផ្នែកខាងលើស្បែក ជើងគ្មានរោមទេ ។

ជីវសាស្ត្រ: កំប្រុកពោះប្រជេះជាសត្វរាត្រីចរ វាស់នៅតាមតំបន់ព្រៃបោះ វាលស្មៅ ព្រៃដាំ (ចំការកៅស៊ូ និង ដូងប្រេង) រួមទាំងព្រៃកោងកាងផងដែរ ។

របៀបរស់នៅ: កំប្រុកពោះប្រជេះមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ប្រភេទនេះមាននៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី កោះស៊ូម៉ាត្រា កោះថាវ៉ា និង កោះប័រណេអូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កំប្រុកពោះប្រជេះជាប្រភេទមានរស់នៅច្រើនបង្កួរតាមតំបន់ព្រៃឈ្មោះ និងចំការឈើដីទំនៀត ។ ប្រសិនបើសត្វនេះកើនចំនួនច្រើនលើសលប់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយ គួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនូវចំនួនសត្វនេះ ។

Grey-bellied Squirrel

Callosciurus caniceps



© L Bruce Kekule

កំប្រុកធំ

ភិនភាគ: កំប្រុកធំមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ៣៧០-៤០៥ម.ម កន្ទុយប្រវែងពី ៤២៥-៥០០ម.ម និងមានទំងន់ រហូតទៅដល់ ១៥០០ក្រាម។ ផ្នែកពោះមានពណ៌ចាប់ពីពណ៌ពងមាន់ រហូតដល់ពណ៌ទឹកក្រូច និងផ្នែកខ្នងមានពណ៌ខ្មៅ ឬ ត្នោតចាស់។ បំពង់ក និងថ្ពាល់មានពណ៌ភ្លឺ ដែលខ័ណ្ឌដាច់ពីគ្នាដោយឆ្នុតពណ៌ខ្មៅ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះច្រើនរស់នៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ ដែលមានគំរូបព្រៃក្រាស់ៗ ហើយសំបូរ រស់នៅតាមដងទន្លេ ស្ទឹង។ វាជាសត្វដែលមានការផ្លាស់ទីយ៉ាងរហ័សពីដើមឈើមួយទៅមួយ។ ចំណីអាហាររបស់វារួមមាន ផ្លែឈើ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ ស្លឹកឈើ សត្វល្អិត និង សត្វតូចផ្សេងៗទៀត។ សំបុករបស់វាមានរាងមូលស្ថិតនៅផ្នែកខាងចុងមែក ឈើតូចៗ ព័ទ្ធស្លឹកឈើ។ សត្វញីមានដោះ បីគូ និង មានកូនម្តងពី ១-២ក្បាល។


របៀបរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទនេះមាននៅក្នុងខេត្តកោះកុង ពោធិសាត់ មណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះវិហារ ហើយប្រភេទនេះត្រូវបានរកឃើញផងដែរ នៅទូទាំងឥណ្ឌូចិន^(១) ដីគោកនៃ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះស៊ូម៉ាត្រា និង កោះបារ៉ា) ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កំប្រុកធំរស់នៅមានដង់ស៊ីតេកម្រិតទាប ហើយគេកម្រជួបប្រទះនៅក្នុងព្រៃ ធម្មជាតិ។ ប្រភេទនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការរងគ្រោះថ្នាក់ពីការបាត់បង់ទីជម្រក និងការទាក់ ចាប់ ឬបរបាញ់។

(១) ឥណ្ឌូចិនរួមមានប្រទេស ភូមា ថៃ ឡាវ កម្ពុជា និងវៀតណាម ។

Black Giant Squirrel

Ratufa bicolor



© L Bruce Kekule

កំប្រុកពណ៌

ភិរក្ខភាព: កំប្រុកពណ៌មានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ១៩០-២៣០ ម.ម កន្ទុយមានប្រវែងពី ២២៥-២៤០ ម.ម និង មានទម្ងន់៣០០ក្រាម ។ វាមានមាឌមធ្យម និងមានការប្រែពណ៌ពីសទៅពណ៌ទឹកក្រូច ឬ ខ្មៅ និងពណ៌ចម្រុះផ្សេងៗ ប្រភេទនេះភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគនិរតី ហើយភាគច្រើនមានពណ៌ក្រហមទឹកក្រូច ។ ចំពោះភូមិភាគខាងជើង ប្រភេទនេះមានពណ៌ក្រហមផ្កាតដោយមានបង្កង់ពណ៌សនៅគល់កន្ទុយ ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះច្រើនរស់នៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ ដែលមានទីជម្រកផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅតាមព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃបោះ និងចំការ ។ វាធ្វើសំបុកពីមែកឈើតូចៗ និង ស្លឹកឈើ នៅលើមែកឈើធំៗ ឬ នៅក្នុងប្រហោងឈើ ។ ចំណីអាហាររបស់វារួមមានផ្លែឈើ គ្រាប់ផ្លែឈើ ធូលីផ្លែឈើ និងសត្វល្អិត ។ វាជាសត្វរហ័សរហួន និងផ្លាស់ទីពីដើមឈើមួយទៅមួយបានយ៉ាងរហ័ស ។ វាអាចមានជីវិតរស់នៅរហូតដល់អាយុ២៧ឆ្នាំ ។ សត្វព្រីមានដោះពីរគូ និងមានកូនម្តងពី១-២ក្បាល ។

របាយរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តកោះកុង ពោធិសាត់ មណ្ឌលគីរី ដែនជំរកសត្វព្រៃតូលែនព្រហ្មទេព និងតំបន់ព្រៃការពារ នៃខេត្តព្រះវិហារ ។ ប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅប្រទេសភូមា ថៃ និងវៀតណាមភាគខាងត្បូង ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កំប្រុកពណ៌មានដងស៊ីតេរស់នៅច្រើនបង្កួរ និងមានអត្រាបន្តពូជឆាប់រហ័ស និងរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចពីមជ្ឈដ្ឋានដែលវាស់រស់នៅ ។

Variable Squirrel

Callosciurus finlaysonii



កំប្រុកឆ្នុតខ្នង

កិនភាគ: កំប្រុកឆ្នុតខ្នងមានប្រវែងដងខ្លួន ពី ២០០-២៦០ម.ម និងមានប្រវែងកន្ទុយ ១៩៧ម.ម និងមានមាឌមធ្យម ។ នៅលើខ្នង និងកន្ទុយមានពណ៌ត្នោតប្រផេះ ដោយមានឆ្នុតធំ ពណ៌ក្រហមជាំ ។

ជីវសាស្ត្រ: វាស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង និង ព្រៃបោះដែលមានរយៈកម្ពស់រហូតដល់ ១០០០ម ។ វាក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រៃឫស្សីក្រាស់ តំបន់វាលទំនាប ។ វាស់នៅតែង ឬ ជា ក្រុមតូចៗ ។ វាធ្វើសំបុកនៅលើមែកឈើខ្ពស់ៗ ។ ចំណីអាហាររបស់វាមានផ្លែឈើ ត្រាប់ឆ្មារ ជាតិ មើមរុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិត ។

របាយរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា វាមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អភិរក្សជីវចម្រុះកែវសីមា នៅខេត្តមណ្ឌលគីរី ។ ប្រភេទនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងកើត ប៊ូតាន ភូមា ចិន (ភាគខាងត្បូង) ឥណ្ឌូចិន និងម៉ាឡេស៊ី ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កំប្រុកឆ្នុតខ្នងមានដងស៊ីតេរស់នៅច្រើនបង្កួរ មានអត្រាបន្តពូជខ្ពស់ និងរង គ្រោះថ្នាក់តិចតួចពីមជ្ឈដ្ឋានដែលវាស់នៅ ។

Pallas Squirrel

Callosciurus erythraeus



កំប្រុកស្លាបធំ

សេចក្តីផ្តើម: គ្រប់ប្រភេទកំប្រុកស្លាបទាំងអស់ជាទូទៅ គឺវាហោះសំកាំង មិនមែនហើរបក់ស្លាបដូចប្រភេទបក្សីទេ។ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមក បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា មានប្រភេទកំប្រុកស្លាបមួយចំនួនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានកំប្រុកស្លាបពីរប្រភេទត្រូវបានគេធ្វើអត្តសញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់ថា កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយការសម្គាល់លើប្រវែងចុងរោមពណ៌ខ្មៅទៅកាន់ចុងកន្ទុយ។ ប្រភេទកំប្រុកស្លាបធំពុំមានរោមចុងកន្ទុយទេ អាចមានដៃរប៉ុន្តែខ្លីបំផុត។ ចំណែកឯប្រភេទកំប្រុកកន្ទុយក្រហមវិញ មានរោមចុងកន្ទុយដុះវែងប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃប្រវែងកន្ទុយរបស់វា។

ភិនភាគ: ប្រភេទទាំងពីរនេះមានប្រវែងក្បាល និងដងខ្លួនប្រហែល ៤០០ម.ម និងកន្ទុយមានប្រវែងប្រហែល ៤២០ម.ម។ វាមានមាឌធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមក្រុមសត្វកំប្រុក។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះចូលចិត្តរស់នៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ និងជាសត្វរាត្រីចរ រកស៊ីចំណីនៅពេលយប់។ ចំណីអាហារវារ្យមានផ្លែឈើ ស្លឹកឈើ និងមើមឈើ។ វាធ្វើសំបុករបស់វានៅក្នុងប្រហោងឈើ ឬតាមច្រាំងថ្មចោទ។ សត្វញីកូនម្តងបានតែមួយគត់។

របររស់នៅ: ពួកវារស់នៅតាមប្រហោងឈើ និងមានវត្តមានស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទព្រៃទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃស្រោង។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: កំប្រុកស្លាបធំមានដងស៊ីតេរស់នៅកម្រិតទាប គេកម្រឃើញវាហើរ ឬ រស់នៅជាត្រុមតាមទីជម្រកដែលវារស់នៅណាស់ ហើយប្រភេទនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រកដែលវារស់នៅ ការទាក់ចាប់ ឬ បរបាញ់ពួកវា ដើម្បីយកសាច់ធ្វើជាអាហារ និងការលក់ដូរ។

Giant Flying Squirrels

Petaurista spp.



© Annette Olsson CI



កំប្រុកស្លាបតូច

សេចក្តីផ្តើម: ប្រភេទនេះសព្វថ្ងៃ នៅពុំទាន់មានការសិក្សាបែងចែកឱ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេ ទោះបីជាមានការប៉ាន់ស្មានថា វាប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Hylopetes ដែលអាចត្រូវបានឃើញមានវត្តមាននៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដោយ។

ភិក្ខុភាគ: កំប្រុកស្លាបថ្កាស់ក្រហមមានប្រវែងដងខ្លួនពី ១៣០-១៨៤ម.ម និងមានប្រវែង កន្ទុយពី ១០០-១៤០ម.ម។ វាជាប្រភេទដែលមានមាឌតូច ដែលខ្ទង់របស់វាមានពណ៌ ក្រហមភ្លេក និងថ្កាស់ពណ៌ក្រហម។ ផ្នែកខាងក្រោមមានពណ៌ប្រផេះស្រាល កន្ទុយ មានរាងសំប៉ែត និងមានពណ៌ទឹកក្រូច។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងដែលមានរយៈកំពស់ រហូតដល់ទៅ ១០០០ម។ វាធ្វើសំបុកនៅក្នុងប្រហោងឈើដែលមានកំពស់យ៉ាងហោច ណាស់ ៤ម ពីដី។ ចំណីអាហារសំខាន់របស់វាគឺផ្លែឈើ។ សត្វញឹកៗខ្លួនពី១-២ក្បាល។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទកំប្រុកស្លាបតូចនេះ ក៏ជាប្រភេទសត្វព្រៃត្រឹមត្រូវ និងរស់នៅក្នុង ប្រហោងឈើដូចកំប្រុកស្លាបធំដែរ ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចឃើញពួកវានៅពេលព្រលប់ ផងដែរ។ ពួកវាមានភាពធន់ ឬបន្ទុកក្នុងការរស់នៅតាមប្រភេទព្រៃដែលវិចិល និងអាច ឃើញរស់នៅតាមភូមិ និងទីប្រជុំជនមួយចំនួនដែលមានដើមឈើ។ ប្រភេទនេះគេ នៅតែអាចមើលឃើញវាបានច្បាស់នៅតាមដើមឈើខ្ពស់ៗ នៅក្បែរព្រះរាជដំណាក់ខេត្ត សៀមរាបផងដែរ។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: ពួកវាមានដង់ស៊ីតេរស់នៅច្រើនបង្អួរ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាក៏កំពុងតែទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើការបាត់បង់ទីជំរក និងរស់នៅ លាក់ខ្លួននៅតាមតំបន់ស្ងាត់ដាច់ស្រយាលក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជា។

Small Flying Squirrels

Hylopetes spp.



© WCS



កង្ខឹប

កិនភាគៈ កង្ខឹបមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ១០៥-១២៣ម.ម និងកន្ទុយប្រវែងពី ១១៤-១៣០ ម.ម ។ វាមានមាឌតូច ដែលមានលក្ខណៈសម្គាល់ត្រង់មានឆ្នុតពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ពងមាន នៅលើខ្នង ។ សម្បុរនៅសងខាងខ្នងមានពណ៌ត្នោតស្រាល ផ្នែកពោះមានពណ៌ភ្លឺព្រៃលែត ។ មាន ឆ្នុតមួយពណ៌លឿងស្រាលចាប់ពីច្រមុះកាត់តាមក្រោមភ្នែកបន្តរហូតដល់គុម្ពកន្ទុយ ។ កន្ទុយមាន ពណ៌ខ្មៅ និងមានឆ្នុតពណ៌លឿងស្រាល ។

ជីវសាស្ត្រៈ ប្រភេទនេះរស់នៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ ហើយវាជាសត្វមានចលនារហ័សរហួន ។ វាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងព្រៃវាលទំនាប និងព្រៃខ្ពង់រាប (ដែលមានរយៈកំពស់ប្រហែល ៧០០ម) ព្រមទាំងនៅតាមសួនផ្កា និងចំការនានា ។ វាចូលចិត្តរស់នៅតែឯង ឬក្រុមតូចៗ ។ វាធ្វើសំបុករបស់វាក្នុងប្រហោងឈើ ។ ចំណីអាហាររបស់វារួមមានផ្លែឈើ បន្លែ និងសត្វល្អិត ។

រចនាសម្ព័ន្ធៈ នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ កោះកុង ដែនជំរកសត្វព្រៃតូលែនព្រហ្មទេពនៃខេត្តព្រះវិហារ និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត ហើយវាក៏ត្រូវបាន រកឃើញនៅក្នុងប្រទេស ថៃ ឡាវ និងវៀតណាមភាគខាងត្បូង ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ សត្វនេះមានរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង មានចលនារហ័សរហួន និងរងគ្រោះ ថ្នាក់តិចតួចពីការទាក់ទាញ ។

Striped Squirrels

Tamiops spp



កង្កែប

កិនភាគ: កង្កែបមានប្រវែងដងខ្លួនពី១៨៤-២១០ម.ម និងកន្ទុយមានប្រវែងពី១៤០-១៧៥ ម.ម។ វាមានមាឌមធ្យម និងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកង្កែបដោយសារទំហំ។ ក្បាលមានពណ៌ ប្រផេះត្នោតមានផ្លុតពណ៌ខ្មៅ ហើយមានពណ៌ពងមាន់នៅលើខ្នង និងចំហៀងខ្លួន ចំណែកពោះ មានពណ៌ប្រផេះភ្លឺ។ កន្ទុយមានប្រវែងខ្លីជាងប្រវែងនៃក្បាល-ដងខ្លួន ច្រមុះរបស់វាវែងបន្តិច ហើយចំពោះសត្វញីមានដោះបីគូ។

ជីវសាស្ត្រ: សត្វប្រភេទនេះភាគច្រើនរស់នៅលើដី និងរកចំណីអាហារដោយប្រើច្រមុះវែង របស់វា នៅលើដីដែលសំបូរទៅដោយកំទេចកំទីស្លឹកឈើជាច្រើន។ វាចូលចិត្តរស់នៅតាមទីជំរក ជាច្រើនប្រភេទចាប់តាំងពីប្រភេទព្រៃ រហូតដល់រស់នៅតាមចំការផ្សេងៗ។ ចំណីអាហាររបស់វា រួមមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ផ្លែឈើ និងពពួកសត្វដែលគ្មានឆ្អឹងកង។

រចនាសម្ព័ន្ធ: នៅប្រទេសកម្ពុជា វាមានវត្តមាននៅខេត្តកោះកុង ពោធិសាត់ ឧទ្យានជាតិ វិរៈជ័យ និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត។ កង្កែបក៏មានវត្តមានផងដែរនៅក្នុងប្រទេសភូមាភាគកណ្តាល និងខាងកើត ចិនភាគខាងត្បូងវៀតណាម ភាគខាងត្បូង ឡាវ និងថៃ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: សត្វនេះមានរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង មានចលនារហ័សរហួន និងរងគ្រោះ ថ្នាក់តិចតួចពីការទាក់ទាញ។

Berdmore's Squirrel

Menetes berdmorei



© Allan Michaud

ក្រុមប្រម៉ា

PORCUPINES



សេចក្តីផ្តើម: សត្វប្រម៉ា និងប្រម៉ាញ ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារពពួកសត្វកកេរ ប៉ុន្តែពួកវាមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីសត្វកកេរដទៃទៀត។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពួកវាតែងតែរស់នៅតាមតំបន់ជនបទស្ងាត់ ជាពិសេសនៅតាមព្រៃធម្មជាតិ។ ប្រភេទប្រម៉ា និងប្រម៉ាញមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសំគាល់ដោយពិនិត្យមើលកាំ (មូលស្រួចៗលើខ្នងប្រម៉ា) របស់វា។

នាពេលបច្ចុប្បន្នសត្វកកេរទាំងពីរនេះមានវត្តមានរស់នៅដោយកម្របំផុតពីព្រោះពួកវាភាគច្រើនត្រូវបានគេបរបាញ់យកសាច់ និងក្រពះ សំរាប់ធ្វើជាអាហារ និងឱសថបុរាណ។ ពួកវាក៏ត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយការស៊ីជាចំណី ដោយពពួកសត្វព្រៃស៊ីសាច់ជាអាហារផងដែរដូចជា ជ្រូកព្រៃ ខ្លាខិន និងពពួកខ្លាផ្សេងៗទៀត។ ពួកវាចូលចិត្តស៊ីរុក្ខជាតិបន្លែ ច្រើនប្រភេទ ហើយជារឿយៗពួកវាតែងតែជីកគាស់ស៊ី ឬស និងមើមរុក្ខជាតិ។

ប្រម៉ា

វិភាគ: ប្រម៉ាគឺជាសត្វកកេរ្តិ៍មួយក្នុងចំណោមសត្វកកេរ្តិ៍ទៀត ដែលមានជើងមុខក្រោយខ្លីៗ និងម្រាមជើងធំៗ ដងខ្លួនខ្លី ត្រចៀកតូច កន្ទុយធំៗ ។ ជាទូទៅ វាមានពណ៌ខ្មៅ មានដងខ្លួន និងកន្ទុយគ្របដណ្តប់ទៅដោយការីងវែងៗរាងដូចបន្ទា ។

ប្រម៉ាមានដងខ្លួនចាប់ពីក្បាលដល់ពាក់កណ្តាលនៃដងខ្លួនដែលគ្របដណ្តប់ដោយកាំខ្លីៗ ដែលមានលក្ខណៈដូចរោម និងផ្នែកនៅសល់គ្របដណ្តប់ដោយកាំវែងៗ ។ កាំប្រមាភាគច្រើនមានពណ៌ខ្មៅនៅផ្នែកកណ្តាល ដោយឡែកខាងចុង និងគល់នៃការិព្យមានពណ៌ស ។

កាំកន្ទុយប្រម៉ាមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាង ខាងក្នុងកាំមានប្រហោងអាចបន្លឺសំលេងបាននៅពេលវាអង្រួន ។ ពេលមានការគំរាមកំហែង វាបំបាត់កាំរបស់វាឡើងលើដើម្បីការពារខ្លួនរបស់វា ឲ្យស្ងួតពីការយាយីពីសត្រូវ ។ ប្រម៉ាមានទំហំដងខ្លួនធំជាងប្រមោញ តែមានកន្ទុយខ្លីជាង និងពុំមានកញ្ចុំនៅចុងកន្ទុយដូចប្រមោញទេ ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រម៉ាវស់នៅក្នុងរូងដីនៃព្រៃគ្រប់ប្រភេទ និងក្បែរតំបន់កសិកម្ម ។ វាជាប្រភេទសត្វដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីផ្លែឈើជ្រូចពីដើម ឬសឈើ មើមរុក្ខជាតិ និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗ ។ ជាទូទៅវាជាប្រភេទសត្វដែលចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ និងសម្លឹងនៅក្នុងរូងនៅពេលថ្ងៃ ។

របៀបរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រម៉ាគឺជាប្រភេទសត្វដែលមានជាមធ្យមស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ។ វាមានរស់នៅគ្រប់ប្រភេទព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ កោះស៊ូមាត្រា និងកោះប័រណេអូ ។ ប្រភេទនេះទទួលរងនូវការបរាព្យាបាលដើម្បីយកសាច់បរិភោគ ។ កាំ និង ក្រពះជាតម្រូវការខាងផ្នែកអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើជាឱសថ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ប្រហែលជាមកពីប្រម៉ាមានកាំសម្រាប់ការពារខ្លួនពីសត្រូវ និងសំបូរចំណីស៊ីហើយមើលទៅ ទើបវាមានដងស៊ីតែរស់នៅច្រើនបង្អួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីស្បៀវភៅក្រហមនៃអង្គការ IUCN ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU) នៅលើពិភពលោក ដោយសារសត្វផ្តែ ឬការបរាព្យាបាលដើម្បីយកក្រពះ និងកាំរបស់វាសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម ។

East Asian Porcupine

Hystrix brachyura



© WWF

ប្រមោញ

កិច្ចការ: ប្រមោញមានរូបរាងដូចប្រម៉ាដែរ ខុសត្រង់ប្រមោញមានទំហំខ្លួនតូចជាង។ វាមានដងខ្លួនគ្របដណ្តប់ដោយរោម ដែលមានលក្ខណៈដូចប្រម៉ាដែរ តែវាមានប្រវែងខ្លីតូចជាងប្រម៉ាបន្តិច ផ្នែកខាងលើនៃដងខ្លួនមានកាំរាងសំប៉ែត។ នៅផ្នែកខាងលើខ្នង មានរោម បន្ទាពណ៌ត្នោតចាស់ហើយវែង ចំណែកនៅខាងក្រោមពោះមានរោមខ្លីពណ៌ត្នោតខ្លី។ កន្ទុយរបស់វាតូចហើយនៅចុងកន្ទុយ មានរោមបន្លាជាកុំព្យូទ័រអំពូល។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រមោញធ្វើរូងរស់នៅក្នុងព្រៃ រឹតបន់ចំការ ជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំ។ ប្រមោញគឺជាប្រភេទសត្វដែលរកស៊ីនៅពេលយប់ដូចប្រម៉ាដែរ ហើយពេលថ្ងៃវាសម្លាត់ខ្លួននៅក្នុងរូង រឺ ល្អាងថ្ម។ ពេលខ្លះ វាវល់ជាហ្វូងនៅក្នុងរូងតែមួយពី២-៣ឆ្នាំ។ ប្រមោញអាចរត់បានយ៉ាងលឿន និងហែលទឹកបានយ៉ាងស្មាត់ជំនាញទៀតផង។ ចំណីអាហាររបស់វារួមមានឫសឈើ មើមឈើ ផ្លែឈើដែលជ្រុះ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ ដំណាំក្នុងចំការ សំបកឈើប្រភេទខ្លះ និងឆ្អឹងសាកសព។

របាំយរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រមោញជាប្រភេទសត្វមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង។ ប្រមោញមានវត្តមាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកោះស៊ូមាត្រា។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: សត្វនេះមានរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃ ចំការ និងជើងភ្នំ ប្រភេទនេះអាចរងគ្រោះថ្នាក់ពីការទាក់ចាប់ ការបណ្តើរសត្វផ្តែនៅក្នុងព្រៃ និងការបំពុល។

Asian Brush-tailed Porcupine

Atherurus macrourus



© WCS



ក្រុមថនិកសត្វកក្រវ

RATS



សេចក្តីផ្តើម: ក្រុមថនិកសត្វកក្រវសំដៅដល់សត្វកណ្តុរដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Muridae ។ វាជាថនិកសត្វដែលសំបូរជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីទាំងប្រភេទនិងចំនួនរបស់វា ។ វាស់នៅតាមទីជម្រកច្រើនប្រភេទតាំងពីតំបន់ព្រៃ វាលស្មៅ កសិកម្ម ស្រែចំការ រហូតដល់គេហដ្ឋាន ដែលមានមនុស្សកំពុងរស់នៅ ។ វាបន្ស៊ាំការរស់នៅនៅលើដើមឈើ រូងដី និងនៅលើដី ។

កណ្តុរភាគច្រើនចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ ។ វាជាសត្វដែលមានកូនច្រើន ប្រភេទខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វចង្រៃ ដោយសារតែវា បំផ្លាញផល ដំណាំរបស់កសិករ ឬម្ហូបអាហារ និងទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមផ្ទះសម្បែង ។ អំបូរនៃសត្វកណ្តុរនេះមាន ១៩ប្រភេទ ដែលក្នុងនោះមានចំនួន ១០ប្រភេទ ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអះអាងថាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រហែលជាមានចំនួនលើសនេះថែមទៀតដែលគេពុំទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយ ។ ខាងក្រោមនេះជាការពិពណ៌នានូវប្រភេទកណ្តុរមួយចំនួន ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើង ។

កណ្តុរស្រែ

ភិនភាគ: កណ្តុរស្រែមានប្រវែងក្បាល និងដងខ្លួនពី ១៣៦-២០៥ម.ម កន្ទុយមានប្រវែងពី ១៤៩-២១០ម.ម និងមានទម្ងន់រហូតដល់ ២៣៩ក្រាម ។ ខ្នងមានពណ៌ត្នោតស្រាល ពោះពណ៌ស ឈាមប្រផេះដោយមានបន្ទាត់មួយពណ៌ប្រផេះចាស់នៅចំកណ្តាលនៃពោះ ។ កន្ទុយវែងជាង ប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួនបន្តិច និងមានពណ៌ត្នោត ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះចូលចិត្តរស់នៅតំបន់មានទឹក ដែលមានស្មៅគ្របពិលើ ហើយសំបូរបំផុត នៅតាមវាលស្រែ ។ គេប្រទះឃើញផងដែរនៅតាមសួនច្បារ និងចំការផ្លែឈើនានា ។ វាស៊ីបំផ្លាញ ដំណាំស្រូវ គ្រាប់ពូជ និងស៊ីពពួកសត្វដែលមានសំបករឹងដូចជា ក្តាម ត្រី ល្បែងជាដើម ។ សត្វ កណ្តុរនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសត្វចង្រៃសំរាប់កសិកម្ម ពីព្រោះវាបំផ្លាញដំណាំស្រូវយ៉ាង ច្រើន ។ ប្រភេទនេះមានកូនពី៥-១២ ក្បាល ហើយជាញឹកញាប់ វាកូនបីដង ឬ ច្រើនជាងនេះក្នុង វដ្តផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ។

របាយរស់នៅ: នៅកម្ពុជាបានកត់ត្រាថា មានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង តាកែវ តំបន់ដំណាំស្រូវវាលទំនាប និងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានគេ សង្កេតឃើញមានសំបូររស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងវៀតណាម ផងដែរ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កណ្តុរស្រែសំបូររស់នៅតាមតំបន់ដែលមានស្រូវ វាបំផ្លាញស្រូវ និងដំណាំ របស់កសិករ ដោយហេតុនេះ ទើបគេចាត់ទុកវាថាជាសត្វចង្រៃ ។ ចំនួនវាកើនច្រើនកាលណា ការបំផ្លាញក៏កាន់តែកើនឡើងផងដែរ ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើបប្រជាជននៅតំបន់ខ្លះប្រើថ្នាំពុល ឬដាក់អង្កប់ ដើម្បីសម្លាប់ និងបន្ថយកំណើននៃចំនួនរបស់វា ។

Rats



© Angela Frost

កណ្តុរភ្នំ

ភិនភាគ: ក្បាល និងដងខ្លួនមានប្រវែងពី ២៥៦-៤៨០ម.ម កន្ទុយមានប្រវែងពី ១០០-១២៤ ម.ម និងមានទំងន់ពី ៦៤៥-៦៩០ក្រាម ។ វាមានមាឌធំ ត្រចៀករាងមូល ហើយគេអាចសម្គាល់ លក្ខណៈរបស់វាបានដោយសារវាមានក្បាលធំ ដងខ្លួនខ្លី ជើង និងកន្ទុយខ្លី ក្រញាំជើងវែង និង ធ្មេញមុខធំៗ ។ រោមរបស់វាវែង និងមានពណ៌ប្រផេះត្នោត ដោយមានពណ៌ប្រាក់នៅខាងចុងរោម ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះបន្ស៊ាំជីវិតរស់នៅក្រោមដី និងចូលចិត្តរស់នៅព្រៃឫស្សី ។ វារកស៊ីនៅ ពេលយប់ ហើយចំណីរបស់វាមាន ឫសឈើ មើមឈើ ផ្លែឈើ ទំពាំង និងស្មៅ ។

របាយរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រភេទនេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខាង លិចទន្លេមេគង្គ ។ វាមានផងដែរនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កណ្តុរភ្នំមានរស់នៅច្រើនតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ ខ្ពង់រាប និងតាមដងទន្លេមេគង្គ ខាងលើ ។ ការរស់នៅរបស់ប្រភេទនេះប្រហែលជាមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទដទៃទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចជាភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺទៅប្រភេទផ្សេងទៀត និងមនុស្សបាន ។

Bamboo Rats

Rhizomys



© Edward Pollard/WCS



© Allan Michaud

ក្រុមប្រល័យ

BATS



សេចក្តីផ្តើម: ពពួកសត្វប្រល័យ និងជ្រឹងស្ថិតនៅក្នុងសំដាប់ថ្នាក់ Chiroptera ។ ក្រុមថ្នាក់សត្វនេះ មានលក្ខណៈពិសេសនៅត្រង់ដើមដៃអាចវិវត្តទៅជាស្លាប និងហើរបានដូចបក្សី។ តាមការប៉ាន់ស្មានក្រុមប្រល័យទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមានចំនួន ១១០០ ប្រភេទ គឺប្រហែលជា ២០% នៃថ្នាក់សត្វលើផែនដី ។ ប្រហែល៧០% នៃសត្វប្រល័យស៊ីសត្វល្អិតធ្វើជាអាហារ និងខ្លះទៀតស៊ីផ្លែឈើ ស៊ីត្រី (នៅអាមេរិកភាគកណ្តាល និងខាងត្បូង) ។ គ្រប់ប្រភេទសត្វប្រល័យប្រើសម្លេងនិង ត្រចៀកធ្វើជាឧបករណ៍សំរាប់ទាក់ទាញចំណីសត្វល្អិត ។ ចំណាំផ្លាស់នៃសម្លេងដែលវាបានបញ្ចេញអាចឱ្យវាកំណត់បាននូវទំហំខ្លួននៃចំណីសត្វល្អិត និងទិសដៅដែលវាត្រូវហើរ ។ ប្រល័យមានមុខងារសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រាយគ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិ លម្អងផ្កា ឬពូជផ្កានៅប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូពិច ។ ជាពិសេសប្រល័យស៊ីសត្វល្អិតចង្រៃដែលបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្ម និងផ្តល់នូវលាមកសម្រាប់ការលូតលាស់នៃដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទ ។

ប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិត

សេចក្តីផ្តើម: ប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិត គឺជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមក្រុមថនិកសត្វទាំងអស់ដែលមានច្រើនប្រភេទជាងគេនៅលើពិភពលោក។ តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបានឱ្យដឹងថា ប្រភេទប្រចៀវនេះមានប្រហែលពី ៥០ ទៅ ១០០ ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិតនេះត្រូវបានគេរកឃើញមាន ៣០ប្រភេទ រួចហើយ។ ប្រភេទសត្វប្រចៀវទាំងនេះវាបានផ្តល់នូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់មនុស្សទាំងបរិស្ថាននិងការលើកកម្ពស់សុខភាពរស់នៅ។ មានប្រភេទប្រចៀវភាគច្រើនស៊ីសត្វល្អិតចង្រៃដែលបំផ្លាញដំណាំកសិកម្ម រីឯសត្វមូសដែលតែងតែខាំរំខានដល់មនុស្សយើង។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហ្វូងប្រចៀវមួយទ្រនំអាចស៊ីសត្វល្អិតចង្រៃរាប់លានក្បាល និងជួយការពារជម្ងឺដល់មនុស្សនិងការបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្ម។ លើសពីនេះទៅទៀត មានប្រភេទប្រចៀវខ្លះ វាបានផ្តល់នូវលាមក ដែលអាចប្រើប្រាស់ធ្វើជាជីធម្មជាតិដ៏មានជីជាតិ។ ជីដែលបានមកពីលាមកសត្វប្រចៀវអាចជួយកសិករបង្កើននូវទិន្នផលដំណាំកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើជីគីមី ហើយទទួលបាននូវផលដំណាំដែលពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សទៀតផង។

ភិកភាគ និងជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទសត្វប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិត វាមានទំហំប្លែកៗគ្នា ភាគច្រើនមានមាឌតូចៗ និងរស់នៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដូចជា នៅតាមដំបូលអាគារ នៅក្នុងធាងស្លឹកចេក តាមប្រហោងឈើងាប់ ឬ ឫស្សី និងនៅតាមចន្លោះផ្ទាំងថ្ម ឬ រូងភ្នំ។ ប្រភេទនេះចូលចិត្តរស់នៅជាក្រុមរហូតដល់រាប់រយក្បាល។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទសត្វប្រចៀវទាំងនេះមានមួយចំនួន វាមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកនិងរស់នៅតែនៅតាមប្រភេទ ទីជម្រកជាក់លាក់មួយដែលជាប្រភេទសត្វកម្រ និងទទួលរងនូវការគំរាមកំហែង ដោយការកាប់ឈើ និងការបាត់បង់ព្រៃឈើ។ រីឯប្រភេទខ្លះទៀតវាសំបូររស់នៅតាមទីប្រជុំជន និងទីក្រុង។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ជាប្រភេទមានដោយបង្អួច និងមានប្រភេទខ្លះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ជាប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែងជាសកល។

Insectivorous Bats



ប្រចៀវស៊ីសាច់

សេចក្តីផ្តើម: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានប្រចៀវពីរប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Megaderma។ ពួកវាជាប្រចៀវដែល រស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ ដែលរកស៊ីចាប់ចំណីជា ប្រភេទសត្វតូចៗដូចជា ប្រភេទពស់តូចៗ កង្កែប កណ្តុរតូចៗ និងប្រភេទសត្វល្អិតមួយ ចំនួន ហើយវាក៏ស៊ីសត្វប្រចៀវតូចៗគ្នាផងដែរ។

ភិនភាគ និងជីវសាស្ត្រ: ប្រចៀវប្រភេទនេះមានស្លឹកត្រចៀកធំរាងមូលស្លូតនៅផ្នែកគល់ និងមានច្រមុះរាងដូចជាបន្ទះ ដុះខ្ពស់ឡើងលើ។ វាមានរោមពណ៌ប្រផេះទៅពណ៌ត្នោត ហើយមានកន្ទុយមិនវែង ហួសពីប្រវែងដងខ្លួន។ វាមានប្រវែងក្បាល.ដងខ្លួន ៦៥- ១៤០ម.ម កំភួនដៃ ៥០-១១៥ម.ម។ ពួកវាមានថ្នាំមជ្ឈមាឌខ្លាំង ហើយជារឿយៗវា តោងសំយុងខ្លួននៅតាមមែកឈើដើម្បីចាំចាប់ចំណីដែលហើរមកជិតវា។

របាយរស់នៅ: ប្រភេទប្រចៀវនេះត្រូវបានគេឃើញមាននៅគ្រប់តំបន់ព្រៃស្រោងក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រភេទនេះរស់នៅឯកកោ ឬជាហ្វូងចាប់ពី ៥០-១០០ក្បាល ដែលគេ បានរកឃើញវត្តមានវានៅតាមរូងភ្នំ ប្រហោងដើមឈើ និងក្នុងបំពង់លូបង្ហូរទឹកធំៗ។



ស្ថានភាពអភិរក្ស: ជាប្រភេទស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយបង្អួច។

Carnivorous Bats

Megaderma spp.



© WCS



ប្រែប្រួល

ភិនភាគ: វាជាសត្វប្រែប្រួលដែលមានត្រចៀកធំជាងគេ នៅក្នុងអំបូររបស់វា និងមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា។ ជាទូទៅ វាមានពណ៌ត្នោតចាស់នៅផ្នែកខាងលើ និង មានពណ៌ស្រាលជាងនៅផ្នែកខាងក្រោម។ សត្វឈ្មោលមានពុកមាត់ពណ៌ត្នោត។ ចំណែកភ្នាស់ស្បែកស្លាបទាំងពីរមានរោមតិច ហើយផ្នែកចុងក្នុងមានរោមវែងៗ។

ជីវសាស្ត្រ: វាជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅតាមរូងភ្នំ តាមដំបូលផ្ទះ និង ស៊ីសត្វល្អិតដែលហើរខ្ពស់ៗ និងនៅក្បែរតំបន់ព្រៃ។ វារស់នៅជាក្រុមរហូតដល់រាប់ពាន់ក្បាល។

រចនាសម្ព័ន្ធ: ប្រភេទនេះមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌា ឥណ្ឌូចិន និងប្រទេសថៃ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ជាប្រភេទមានដោយបង្អួច និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LC) ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះតិចតួចនៅលើពិភពលោក។

Theobald's Tomb Bat

Taphozous theobaldi



© Joe Walston/WCS

ប្រែប្រួល

ភិក្ខុភាគៈ ប្រភេទនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកពីក្រុមប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិត។ វាមានភាពស្មុំញ៉ាំនៅលើផ្ទៃមុខរបស់វា ដែលបានជួយឱ្យវាអាចចាប់ និងបង្កើតបានជាលកសម្លេង Ultra-sound ។ លកសម្លេងនេះ ដែលភាគច្រើនប្រភេទសត្វប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិតប្រើដើម្បីជួយស្វែងរកនូវទីតាំងដែលត្រូវចាប់សត្វល្អិត ដោយបញ្ចេញនូវសម្លេងដើម្បីចាប់ចំណី ហើយមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍រ៉ាដា។

ជីវសាស្ត្រៈ ប្រភេទនេះ ជាទូទៅជាប្រភេទប្រចៀវដែលរស់នៅក្នុងព្រៃ និងមានជំនាញដ៏ច្រើនប្រសព្វក្នុងការសម្បត្តភាពក្នុងការចាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងព្រៃ ដោយការហោះឆាប់ចាប់ស៊ីសត្វល្អិតនៅតាមស្លឹកឈើ មែកឈើ និង រុក្ខជាតិនានា។

របាយរស់នៅៈ ប្រភេទនេះអាចឃើញមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែមានប្រភេទសត្វប្រចៀវខ្លះ វាមានដែនកំណត់ដោយរស់នៅតាមប្រភេទជម្រក និងរយៈកម្ពស់ជាក់លាក់មួយដោយហេតុនេះហើយប្រភេទទាំងនេះច្រើនតែជាប្រភេទសត្វប្រចៀវដែលកម្រ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ប្រភេទសត្វប្រចៀវទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតិចតួចបំផុត ហើយគេជឿជាក់ថានឹងមានសត្វប្រចៀវច្រើនប្រភេទទៀតត្រូវបានគេរកឃើញ។

Horseshoe and Roundleaf Bats



© Joe Walston/WCS



© WCS

ប្រចៀវអង្គាម

សេចក្តីផ្តើម: វាក៏ជាប្រភេទប្រចៀវដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិតផងដែរ។ ពួកវាងាយស្រួលសម្គាល់ដោយពិនិត្យមើលកន្ទុយរបស់វា ដែលមិនពុំទុំវិញដោយស្រទាប់ភ្លាស់ស្តើងរបស់កន្ទុយ ដែលខុសពីប្រភេទប្រចៀវភាគច្រើន។ ពីមុនមានសត្វប្រចៀវនេះរាប់លានក្បាលរស់នៅតាមដំបូលអាគារសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃបានហើរចេញអស់ ដោយការរៀបចំជួសជុលសារមន្ទីរជាថ្មី។ ប្រភេទនេះ លាមករបស់វាក៏អាចយកមកធ្វើជីសំរាប់ដាំដំណាំផងដែរ នៅពេលដែលវាស៊ីបម្លែងសត្វល្អិតឱ្យទៅជាដីមានជីជាតិ។ នៅតាមតំបន់ខ្លះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានប្រជាជនមួយចំនួនគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានតាមរយៈការប្រមូលលាមកសត្វប្រចៀវសំរាប់លក់ឱ្យកសិករ។

កិនភាគ និងជីវសាស្ត្រ: ប្រចៀវប្រភេទនេះមានលលាដ៍ក្បាលតូចជាងប្រភេទប្រចៀវផ្សេងៗទៀតភ្ជាប់ជាមួយធ្មេញថ្មាមលើតូច។ ផ្នែកខាងលើដងខ្លួនមានរោមខ្លីពណ៌ត្នោត ហើយផ្នែកខាងក្រោមមានរោមពណ៌ប្រផេះស្រាល។ បបូរមាត់លើមានភាពជ្រួញអង្កាញ់ខ្លាំងភ្ជាប់រហូតដល់ត្រចៀក ហើយមានរន្ធច្រមុះដូចច្រមុះជ្រូក។ វាជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅជាក្រុមរហូតដល់រាប់ពាន់ក្បាលតាមរូងភ្នំធំៗដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ និងសីតុណ្ហភាពដែលហើរក្នុងអាកាស និងធ្វើសំបុកនៅមាត់រូងដែលវារស់នៅ។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទនេះមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេស។ ប្រភេទនេះប្រហែលជាប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគេតែងតែឃើញវារស់នៅជាហ្វូងមានចំនួនច្រើននៅតាមទ្រនំនានា ក្នុងរូងភ្នំ ផ្ទាំងថ្ម និងនៅតាមចន្លោះពិដានដំបូលអាគារ នានានៅក្នុងទីប្រជុំជន និងទីក្រុង។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ជាប្រភេទមានដោយបង្ករ ដោយប្រចៀវស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារ ទើបធ្វើអោយគេយល់ឃើញថា វាមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ស្រែចំការរបស់កសិករ។ ប៉ុន្តែការបាត់បង់ទីជម្រកដែលវាធ្លាប់រស់នៅបានក្លាយទៅជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ពួកវា។

Free-tailed Bats



© Yim Saksang/WCS

ជ្រឹងធំ ជ្រឹងមធ្យម ជ្រឹងកោះ

ភិក្ខុភាគៈ ប្រភេទជ្រឹងជាទូទៅស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Pteropus។ ពួកវាច្រើនមានទំហំធំ ហើយប្រភេទដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជា និងលើពិភពលោកគឺ ជ្រឹងធំ Pteropus vampyrus ដែលជ្រឹងខ្លះអាចមានប្រវែងសន្ធឹងស្លាបដល់ទៅ ២ម៉ែត្រ។ នៅប្រទេស កម្ពុជាយើងមានជ្រឹងនេះ បីប្រភេទគឺ ជ្រឹងធំ Large Flying-foxes (Pteropus vampyrus) ជ្រឹងមធ្យម Lyle's Flying-fox (Pteropus lylei) និងជ្រឹងកោះ Island Flying-fox (Pteropus hypomelanus)។ ជ្រឹងធំ និងជ្រឹងមធ្យម ពួកវាមានរូបរាង ស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែខុសត្រង់ជ្រឹងមធ្យមមានមាឌតូចជាងបន្តិច។ ពពួកជ្រឹងធំមានពណ៌ លឿងទុំ និង ត្នោត-ក្រមៅ ស្បែករបស់វាគ្របដណ្តប់ដោយរោមរហូតដល់ពាក់ កណ្តាលកំភួនដៃ។ ក្បាលរបស់វា មានពណ៌ក្រហម-ខ្មៅ រី ត្នោត-ក្រហម ខ្នងរបស់វា មានពណ៌ខ្មៅ និង មានលាយរាយពណ៌ស។ ចង្ការវាមានពណ៌ខ្មៅចុះទៅដល់បំពង់ក ដែលមានរោមពណ៌ត្នោតលាយក្រហមនៅអមសងខាង លាតសន្ធឹងដល់ផ្នែកខាងលើ ហើយក្លាយជាពណ៌ទឹកក្រូច។ ប៉ុន្តែពណ៌សម្បុររបស់វាអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាម រដូវកាល។

ជីវសាស្ត្រៈ វាជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូងមានរហូតដល់រាប់រយក្បាលលើដើមឈើ ធំៗខ្ពស់ និង នៅក្នុងល្អាងភ្នំ។ ជ្រឹងញឹកកើតកូនម្តងបាន១ក្បាល នៅចុងខែមីនា-រហូតដល់ ចុងខែមេសា។ វាជាសត្វរាត្រីចរ ភ្នែករបស់វាអាចមើលឃើញបានច្បាស់ល្អនៅពេលយប់ និងច្រមុះរបស់វាពូកែស្រង់ក្លិនណាស់។ កូនរបស់វារស់នៅជាមួយមេរយៈពេល ពីពីរ ទៅបីខែ។ ចំណីអាហាររបស់វាមាន ផ្លែឈើទុំ ផ្កា ទឹកដមផ្កា និងលំអងផ្កា។ វាមាន អាយុកាលរហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ។

របាយរស់នៅៈ នៅប្រទេសកម្ពុជា ពពួកជ្រឹងធំនេះមាននៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដែលមាន ទីជំរកសមស្របជាពិសេសនៅតាមដើមឈើធំៗនៃដងទន្លេសាបនិងមេគង្គ។ រីឯជ្រឹង កោះវិញមានវត្តមាននៅតែតំបន់កោះមួយចំនួននៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។ ជ្រឹង មធ្យម និងជ្រឹងធំ គេអាច ងាយឃើញវា នៅវត្តភ្នំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងនៅសួនឧទ្យាន កែ្បរព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាប។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ពួកវាកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារ ការទាក់ចាប់ ធ្វើអាជីវកម្ម និង ការបាត់បង់ទីជម្រករបស់វា ។ ហើយពួកវាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

Large Fruit Bats

Flying foxes/Pteropus



© Joe Walston/WCS

ជ្រឹងអង្គាម

សេចក្តីផ្តើម: មានប្រភេទជ្រឹងអង្គាមខុសៗគ្នាមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយពួកវាខ្លះស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ *Macroglossus* ដែលមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីប្រភេទដទៃ។ ពួកវាក្រែបតែទឹកដមផ្កាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ដែលខុសពីប្រភេទស៊ីផ្លែឈើទូទៅដែលស៊ីផ្លែឈើព្រៃនានា។ ជ្រឹងអង្គាមគឺជាប្រភេទសត្វជ្រឹងដែលមានទំហំតូចជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ពួកជ្រឹងអង្គាមនេះចែកចេញជាច្រើនអនុប្រភេទ ដែលបច្ចុប្បន្នមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជា៖ ជ្រឹងអង្គាមច្រមុះតូច ជ្រឹងអង្គាមច្រមុះធំ ជ្រឹងអង្គាមកន្ទុយខ្លី និង ជ្រឹងអង្គាមអណ្តាតធំ។ ពួកវាក៏មានសារៈសំខាន់ដូចពួកជ្រឹងធំផងដែរ ដោយពួកវាមានមុខងារជាភ្នាក់ងារជួយពង្រាយគ្រប់ពូជរុក្ខជាតិ និងជួយរោយដំណើរលម្អងផ្ការបស់រុក្ខជាតិហូបផ្លែដែលមានតម្លៃខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនានាដូចជា ផ្លែស្វាយ ផ្លែមង្គុត និងផ្លែធូរវែនជាដើម។

ភិកភាគ និងជីវសាស្ត្រ: ជ្រឹងអង្គាមច្រមុះតូច និងច្រមុះធំ ពួកវាមានល្បាយពណ៌ប្រផេះត្នោតលាយជាមួយពណ៌ទឹកក្រូចនៅជុំវិញករបស់វា។ តែមត្រចៀក និងទ្រនុងស្លាបរបស់វាមានពណ៌សស្រាល និងកំភួនដៃមានប្រវែង ៥៥-៨០ម.ម។ ជ្រឹងអង្គាមកន្ទុយខ្លីវាមានរោមពណ៌ប្រផេះត្នោត ឬក្រហមត្នោតលាយពណ៌ព្រលែត។ តែមត្រចៀករបស់វាមានពណ៌ខ្មៅ ហើយកន្ទុយរបស់វាខ្លីដុតមើលទៅសឹងតែគ្មាន។ កំភួនដៃមានប្រវែង ៤៥-៦០ម.ម។ ចំណែកជ្រឹងអង្គាមអណ្តាតធំ វាមានមាត់រាងទ្រវែងស្រាវ អណ្តាតវែងដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការក្រែបយកទឹកដមផ្កា។ កំភួនដៃវាមានប្រវែងពី ៤៤-៥៥ម.ម ត្រចៀកមានពណ៌ត្នោត។ ពួកវាអាចហើរពិកន្លែងរស់នៅចេញទៅកន្លែងរកចំណីបានចំងាយ២គ.ម។

របាយរស់នៅ: ភាគច្រើនត្រូវបានគេឃើញ នៅរស់នៅតាមសួនច្បារក្បែរផ្ទះនៅក្នុងទីប្រជុំជន និងទីក្រុង។ រីឯប្រភេទផ្សេងទៀតគឺគេអាចឃើញពួកវា តែនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំប៉ុណ្ណោះ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: វាមានដោយបង្អួចនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែចំពោះការអភិរក្សគួរមានតែវិធានការការពារទីជម្រកវាជាចម្បង។

Small Fruit bats



© Joe Walston/WCS



© Allan Michaud

ក្រុមពានរ

PRIMATES



សេចក្តីផ្តើម: គ្រប់ក្រុមប្រភេទសត្វពានរទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Primates និងមាន របាយរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃពិភពលោក ។ ប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមស្វាដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ Cercopithecidae ក្រុមរញ្ជីស្ថិតក្នុងអំបូរ Lorisidae និង ក្រុមតូចទោចដែលស្ថិតក្នុងអំបូរ Hylobatidae ។ ពពួកពានរភាគច្រើនរស់នៅគ្រប់ប្រភេទទីជីវកនៃតំបន់ព្រៃឈើ ខ្ពង់រាបដែល មានរយៈកំពស់ខ្ពស់ជាង ៣០០ម ពីនីវ៉ូសមុទ្រ និងតំបន់ទំនាបគ្រប់ប្រភេទ ។ ក្រុមខ្លះមានសមត្ថ ភាពហែលទឹកយ៉ាងចំណាប់ទៀតផង ។ ដោយសារការរស់ ប្តូរចំណី និងទីជម្រក ក្រុមពានរនៅប្រ ទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការបន្តពូជទាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ និងការអភិរក្សក្រៅតំ បន់ ។ ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រភេទខ្លះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការទាក់ចាប់ និងបរិច្ចាគ ដើម្បី ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងនាំចេញទៅបរទេសសម្រាប់បំរើអោយការធ្វើពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវប្រភេទថ្នាំ ព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ ព្រោះលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រ និងរូបសាស្ត្ររបស់ស្វាមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើន នឹងចិត្តសាស្ត្រឬរូបសាស្ត្ររបស់មនុស្ស ។ រីឯប្រភេទខ្លះទៀតត្រូវស្លាប់ដោយសារមានមេរោគ ចម្លងនៅលើខ្លួនសត្វ ។ សមាគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់លើការប្រើសត្វ ស្វាសម្រាប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវឱសថ ។

ទោចម្ពុដ

កំណត់: ទោចម្ពុដមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការកាត់សម្គាល់ថាជាទោចញី រឺទោចឈ្មោល ដោយធ្វើការសម្គាល់ទោចញីមានពណ៌ស និងមានកាតិបក្សាល និងទ្រូងមានពណ៌ខ្មៅ រីឯឈ្មោល មានពណ៌ខ្មៅ នៅពេលវាមានអាយុ៣-៤ឆ្នាំ លើកលែងតែដៃ ជើង និង រោមជុំវិញ ប្រដាប់បន្តពូជ មានពណ៌ស ។ ផ្ទៃមុខទោចញី និងឈ្មោលមានពណ៌ខ្មៅ និងមានរោមពណ៌ស ដុះព័ទ្ធជុំវិញមុខ រហូតដល់ត្រចៀកដូចគ្នា ។ ចំណែកឯកូន ទើបកើតមានពណ៌ប្រផេះស្រាល ។ នៅពេលវាអាយុ៤-៥ខែ មានដុះចេញនូវដុំខ្មៅពីរដុំដែលមួយដុំនៅលើក្បាលរាងដូចម្ពុដ និងដុំមួយទៀតនៅលើទ្រូង ។ ទោចញីប្រែពណ៌នៅពេលមានអាយុបាន ២ ឬ ៣ឆ្នាំ ហើយក្រោយមកប្រែពណ៌ទៅជាត្នោត ក្លិននៅពេលវាពេញវ័យដោយមានដុំខ្មៅរាងត្រីកោណលើទ្រូង និងម្ពុដពណ៌ខ្មៅនៅលើក្បាល ។ ទោចម្ពុដមានដៃវែងៗ និង គ្មានកន្ទុយទេ ។


ជីវសាស្ត្រ: ទោចម្ពុដត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។ ជាធម្មតាវាវល់នៅជាក្រុមតូចៗពី ២-៥ក្បាលរួមមានមេ បា និង កូន ។ ពួកវាចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ ហើយជារឿយៗវាតែងតែបាក់លោតពីមែកឈើមួយទៅមែកឈើមួយនៅពេលព្រឹក ។ អាហាររបស់វារួមមាន ផ្លែឈើ គ្រប់ប្រភេទស្លឹកឈើ ផ្កា និងសត្វល្អិត ។ ទោចញីបង្កើតកូនម្តងបានតែមួយគត់បន្ទាប់ពីពពោះអស់រយៈពេល ២១០ថ្ងៃ ។ ចន្លោះកូនពីមួយទៅមួយគឺ២-៣ឆ្នាំ ។ ទោចម្ពុដញី និងឈ្មោលចូលចិត្តបន្លឺសម្លេងស្ទើរព្រមៗគ្នានៃក្រុមនីមួយៗ របស់វាដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនព្រៃរៀងៗខ្លួន ។ ការបន្លឺសម្លេងអាចមានចន្លោះពីម៉ោង៩-១១ព្រឹក និងរយៈពេលពី ១-២ គ.ម ។

របាយរស់នៅ: ទោចម្ពុដមានវត្តមាននៅភាគខាងជើង និងនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា (ខាងលិចទន្លេមេគង្គ) នៅភាគខាងកើតប្រទេសថៃ និងខាងត្បូងឈៀងខាងលិចប្រទេសឡាវ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: វាជាប្រភេទសត្វមានដោយកម្រ ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់លើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃអនុសញ្ញា CITES ។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះដោយការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ ការបាត់បង់ទីជម្រក និង ធ្វើអាជីវកម្ម ។

Pileated Gibbon

Hylobates pileatus



ទោចផ្តាច់លើឡើង

កំណត់: ទោចផ្តាច់លើឡើងជាទំនិកសត្វដែលមានរូបរាង និងពណ៌សម្បុរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងទោចម្តងដែរ រួមទាំងការប្រែពណ៌។ វាជាប្រភេទសត្វដែលគ្មានកន្ទុយ គេអាចកត់សម្គាល់ភេទសត្វទោចនេះបានដោយសារ ទោចឈ្មោលមានសម្បុរពណ៌ខ្មៅ លើកលែងតែផ្តាច់មានរោមពណ៌លឿង។ ចំណែកសត្វញីពូជពេលវាពេញវ័យមានពណ៌លឿងស្លាម ដោយមានកញ្ចុំរោមខ្មៅនៅលើក្បាល និងផ្តាច់មានរោមលឿងរាងដូចផ្លិត។ កូនរបស់វាមានពណ៌លឿង ប៉ុន្តែចំពោះកូនទោចឈ្មោលនៅពេលពេញវ័យវាមានពណ៌ដូចបាវរបស់វា ហើយរក្សាពណ៌នេះរហូតអស់មួយជីវិត។ រីឯកូនញីពូជមានការផ្លាស់ប្តូរពណ៌សម្បុរដូចមេរបស់វានៅពេលដែលពេញវ័យ។ ការប្តូរពណ៌នេះហាក់ដូចជាអាស្រ័យទៅលើអ័រម៉ូន។ វាមានជើង និងដៃវែងៗងាយស្រួលក្នុងការបង្គោលទី។


ជីវសាស្ត្រ: ទោចផ្តាច់លើឡើងជាទូទៅត្រូវបានគេប្រទេសឃើញនៅព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់-កណ្តាលស្រោង។ ជាធម្មតាវាស់នៅជាក្រុមតូចៗពី ២-៥ក្បាល។ ពួកវាចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅលើដើមឈើខ្ពស់ៗ។ ជារឿយៗវាតែងតែហាក់លោតពីដើមឈើមួយទៅមួយនៅពេលព្រឹក។ អាហាររបស់វាមាន ផ្លែឈើ ត្រួយឈើ ផ្កា និង សត្វល្អិត។ ទោចញីបង្កើតកូនម្តងបានតែមួយគត់បន្ទាប់ពីពិពោះរយៈពេល ២១០ថ្ងៃ។ ចន្លោះរយៈពេលមានកូន ពីមួយទៅមួយគឺ២-៣ឆ្នាំ។ នៅពេលកូនទោចអាយុបានប្រហែល១ឆ្នាំវាចាប់ផ្តើមរៀនរៀនលោតតាមដើមឈើនៅជិតៗមេរបស់វា។ ញី និង ឈ្មោលចូលចិត្តបន្លឺសម្លេងល្បីៗរួមគ្នានៅពេលព្រឹក ដែលអាចលឺពី១-២ គ.ម អាស្រ័យលើស្ថានភាពគំរប់ព្រៃ។ ការបន្លឺសំលេងកំរិតអប្បបរមានៅម៉ោង៥-៧ ព្រឹក។

របៀបរស់នៅ: វាមានវត្តមានតែនៅភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គ និងប៉ែកឦសាន្ត នៃប្រទេសកម្ពុជា នៅប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូង និងប្រទេសឡាវ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ទោចផ្តាច់លើឡើងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះនៅលើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃ អនុសញ្ញា CITES ។ ប្រភេទនេះ កំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយការបំបាត់ ទាក់ទងនឹង ការបាត់បង់ទីជម្រក និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

Yellow-cheeked Crested Gibbon

Nomascus gabriellae



© Matt Hunt

ញីប្រជេ៖

ភិរក្ខភាព៖ ញីប្រជេ៖ជាទូទៅវាមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា ចាប់ពីត្នោតប្រជេ៖ព្រលែតទៅក្រហមត្នោត និងមានឆ្មាពណ៌ត្នោតចាប់ពីក្បាលរហូតដល់ពាក់កណ្តាលខ្នង រីឯដល់កន្ទុយ និងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងញីភ្លើងដែរ ។ វាមានពណ៌ត្នោតចាស់ព័ទ្ធជុំវិញរង្វង់ភ្នែកទាំងពីរ និងមានរោមឆ្មា ពណ៌សតាមបណ្តោយខ្នងច្រមុះ ។

ជីវសាស្ត្រ៖ ជាសត្វរាត្រីចររស់នៅ និងរកស៊ីនៅពេលយប់នៅតាមដើមឈើតំបន់ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងអាចមានវត្តមាននៅតាមចំការផងដែរ ។ អាហាររបស់វាមានសត្វល្អិត សត្វស្លាប និងផ្លែឈើ ។ ជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅឯកង ហើយធ្វើចលនាបំណាច់ទីយីតៗ មិនសូវរហ័សរហួនដូចសត្វដទៃ ។ ញីប្រជេ៖អាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ១៤ឆ្នាំ ។

របៀបរស់នៅ៖ ញីប្រជេ៖មានវត្តមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសវត្តមានវាសំបូរនៅខាងលិចទន្លេមេគង្គ នៅប្រទេសឥណ្ឌាភាគឦសាន្តរហូតដល់ ប្រទេសភូមា ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ឥណ្ឌូចិន និងប្រទេសថៃ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស៖ ញីប្រជេ៖ស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយកម្រ និងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (DD) ជាប្រភេទមិនទាន់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់លើពិភពលោក ។ វាកំពុងរងគ្រោះដោយសារការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ និងការធ្វើអាជីវកម្ម ។

Northern Slow Loris

Nycticebus bengalensis



© David Emmett CI

រឿងភ្លើង

ភិកភាគ: រញ្ជីភ្លើងមានរោមពណ៌ក្រហមត្នោតភ្លឺ និងមានលាយពណ៌ប្រាក់ពាសពេញលើខ្នង មានឆ្នុតត្នោតចាស់នៅលើខ្នង ហើយឆ្នុតនេះកើតមាន និងបាត់ទៅវិញទៅតាមរដូវ ។ កាលនៅតូច ពុំមានឆ្នុតខ្នងទេ រោមពណ៌ក្រហមព្រឿងៗព័ទ្ធជុំវិញរង្វង់ភ្នែក និងមានភ្នែកធំៗពណ៌ត្នោត ។ វាមានរោមខ្លីក្រាស់ពណ៌សនៅលើថ្ពាល់ និងមានរោមពណ៌សនៅខ្នងច្រមុះ ហើយដោយឡែក នៅរង្វង់ភ្នែកមានរោមពណ៌ត្នោត ។

ជីវសាស្ត្រ: ជាសត្វរាត្រីចរកស៊ីនៅពេលយប់ និងដេកនៅពេលថ្ងៃតាមជំពាមមែកឈើ ។ វាស៊ីសត្វល្អិត សត្វស្លាប និងផ្លែឈើជាអាហារ ។ រញ្ជីចូលចិត្តរស់នៅព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាល ស្រោង និងចំការ ។ ហើយជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅតែងកង្កង ។ សត្វប្រភេទនេះពេលខ្លះអាចបង្កើត កូនម្តងបានពីរ ហើយកូនរបស់វារស់នៅជាមួយមេពី ៦-៩ ខែ ។

របៀបរស់នៅ: រញ្ជីភ្លើងមានវត្តមាននៅភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅអាស៊ី អាគ្នេយ៍ កោះស៊ូម៉ាត្រា និងបរណេអូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: រញ្ជីភ្លើងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ និងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយ រងគ្រោះលើពិភពលោក ។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ ការទាក់ចាប់ និងការធ្វើអាជីវកម្ម ។

Pygmy Loris

Nycticebus pygmaeus



© Joe Walston/WCS

ស្វាកន្ទុយស

កំណត់: ស្វាកន្ទុយសជាប្រភេទពាសមានពណ៌សម្បុរឆើតខុសប្លែកពីប្រភេទស្វាដទៃទៀតដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សត្វឈ្មោលជាទូទៅមានមាឌធំជាងសត្វញី ចំណែកឯរូបរាងរបស់វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ចំណាំណាស់ដោយសារពណ៌របស់វា និងមានរោមក្រាស់ដុះពេញលើដងខ្លួន។ ផ្នែកក្បាលមានពណ៌ត្នោតខ្ចី កន្ទុយមានពណ៌សចាប់ពីគល់រហូតដល់ចុងកន្ទុយ រីឯដៃ និងជើងមានពណ៌ខ្មៅ។ ផ្ទៃមុខមានពណ៌លឿងស្រាលដោយមានរោមរីងៗពណ៌សដុះព័ទ្ធជុំវិញ លើកលែងតែជុំវិញរង្វង់ភ្នែកទាំងពីរមានពណ៌ពងមាន់។ ដងខ្លួនមានពណ៌ប្រផេះ ចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោមនៃដងខ្លួនមានរោមប្រផេះស្រាល ហើយនៅលើថ្ពាស និងផ្នែកខាងមុខមានរោមពណ៌ខ្មៅ។

ជីវសាស្ត្រ: ជារឿយៗ វាចូលចិត្តរស់នៅជាក្រុមតាមដើមឈើខ្ពស់ៗ នៅក្នុងព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង។ វារស់នៅជាក្រុមដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង១០ក្បាល ដោយមានបា មេ និង កូន ជួនកាលក្រុមរបស់វាមានច្រើនរហូតដល់៣០ក្បាល។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (កូទីលេដុង) ត្រួយឈើ ផ្កាឈើ និងផ្លែឈើ។ នៅពេលមានការគំរាមកំហែង ឬ ការរំខានណាមួយពីសកម្មភាពផ្សេងៗ វាតែងតែបង្ហាញលេងជាសញ្ញាអោយគ្នាវាតែចរកកន្លែងសម្ងំលាក់ខ្លួននៅលើចុងឈើខ្ពស់ៗ។ ឈ្មោលជាមេក្រុមគ្រប់គ្រងស្វាញីក្នុងហ្វូងរបស់វា។

របៀបរស់នៅ: ស្វាកន្ទុយសមានវត្តមាននៅភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គ នៃតំបន់ខ្ពង់រាបខាងកើត និងឈូកស្របប្រទេសកម្ពុជា។ តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញពីវត្តមានអំបូរប្រភេទនេះមាន ២ អនុប្រភេទទៀតនៃប្រភេទស្វាកន្ទុយស ជើងប្រផេះ (Grey-shanked Douc Langur) និងស្វាកន្ទុយសជើងក្រហម (Red-shanked Douc Langur) នៅឥណ្ឌូចិន ប៉ុន្តែមិនទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់អំពីប្រភេទ និងរបៀបច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្វាកន្ទុយសស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (CR) ជាប្រភេទជិតផុតពីបំផុតនៅលើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃអនុសញ្ញា CITES ។ ចំនួនស្វាកន្ទុយសមានការថយចុះ ដោយសារការបាត់បង់ ទីជម្រក និងការបរបាញ់។

Black-Shanked Douc Langur

Pygathrix nigripes



© Allan Michaud

ស្វាគ្រោស

ភិក្ខុភាគៈ ក្បាល-ដងខ្លួន និងផ្នែកកន្ទុយមានពណ៌ចាស់ជាងផ្នែកចំហៀងនៃដងខ្លួនដែលមានពណ៌ ភ្លឺរលោង។ កន្ទុយមានប្រវែង១៣នៃប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ហើយមានកន្ទុយកោងជាទម្ងន់ប៉ះ ទៅលើ។ នៅលើក្បាលមានក្រយ៉ៅពណ៌ត្នោតចាស់ ដែលមានរោមខ្លីប៉ះត្រង់ៗមើលទៅរាង ដូចម្លូកកាតិប។ នៅជុំវិញមុខមានរោមកញ្ចុំពណ៌ប្រផេះចាស់ប៉ះត្រង់ព័ទ្ធជុំវិញស្មើរតែលុបបាត់ ត្រចៀក។ ពណ៌ស្វាគ្រោសប្រែប្រួលទៅតាមអាយុ និងភេទ។ ទម្ងន់ស្មើតិចជាងពាក់កណ្តាល នៃទម្ងន់ស្វាឈ្មោល។ ជាធម្មតាស្វាគ្រោសឈ្មោលជំទង់មានទម្ងន់ពី ១១-១៣,៥ គ.ក។

ជីវសាស្ត្រៈ ស្វាគ្រោសរស់នៅព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃឈ្លោះជាហ្នូងពី ៥-៦ ឬអាចរហូតដល់ ៤០ក្បាល។ ហ្នូងរបស់វាមិនរស់នៅកន្លែងណាមួយពិតប្រាកដទេ វាតែងតែដើរ គ្រប់ទិសទីពេញព្រៃ។ ចំណីរបស់វាមាន ផ្លែឈើ ផ្កាឈើ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងសត្វល្អិត។ វារកចំណី នៅលើដើមឈើ និងលើដី។

របៀបរស់នៅៈ ស្វាគ្រោសមានវត្តមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងតំបន់ព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជា លើកលែងតែតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប វាមានវត្តមាននៅប្រទេសឥណ្ឌា បង់ក្លាដេស ភូមា ថៃ ឥណ្ឌូចិន និងខេត្តយូណានប្រទេសចិនផងដែរ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ស្វាគ្រោសស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះ ក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះនៅលើពិភពលោក។ ប្រភេទនេះកំពុង រងគ្រោះដោយសារ ការទាក់ទាញ និង ការបរបាញ់ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម ។

Northern Pig-tailed Macaque

Macaca leonina



© WCS



© Allan Michaud

ស្វាគ្គាម

កិច្ចការ: ស្វាគ្គាមមានការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ពីរដំណាក់កាលសំខាន់ៗគឺពណ៌ប្រផេះលាយត្នោត និងពណ៌ក្រហមភ្លឺ ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរពណ៌នេះប្រែប្រួលទៅតាមអាយុកាល ភេទ និងទីតាំងរស់នៅរបស់វា។ ជាទូទៅវាមានពណ៌ពីប្រផេះភ្លឺទៅពណ៌ក្រហមភ្លឺពេលដែលវារស់នៅក្នុងព្រៃចំណែកពពួកស្វាវរស់នៅមាត់សមុទ្រភាគច្រើនមានពណ៌ភ្លឺឆើតជាងប្រភេទដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀត។ ស្វាគ្គាមមានប្រវែងពីក្បាលដល់កន្ទុយ ៩២-១០៩ស.ម ហើយកន្ទុយរបស់វាវែងជាងគេក្នុងចំណោមប្រភេទស្វាឆាននៅទ្វីបអាស៊ី។ កូនរបស់វាកើតមកមានពណ៌ខ្មៅ។ ចំពោះស្វាមិនទាន់ពេញវ័យមានដុះរោមកញ្ជុំវែងៗលើក្បាល ចំណែកស្វាចាស់វិញមានរោមវែងក្រាស់ដុះជុំវិញមុខ និងមានថ្គាសទំពែក។

ជីវសាស្ត្រ: ស្វាគ្គាមរស់នៅតំបន់ព្រៃស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដូចជា ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឫស្សី តំបន់វាលភក់ ព្រៃលិចទឹក ព្រៃកោងកាង តំបន់កសិកម្ម តាមបណ្តោយឆ្នេរខ្សាច់ និងតាមឆ្នេរកោះ ជាពិសេសវាលភក់ព្រៃកោងកាង។ ចំណីរបស់វារួមមាន: ក្តាម បង្កងខ្យង ខ្មៅ គ្រុំ ល្បែង ងាវ សត្វល្អិត ផ្លែឈើ ផ្កាឈើ និងត្រួយឈើជាដើម។ វាជាប្រភេទស្វាដែលមិនខ្លាចទឹក និងមានភាពស្មាត់ជំនាញក្នុងការហែលទឹក។ ស្វាឈ្មោលអាចមុជទឹកបានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ ៥០ ម៉ែត្រ។ វារស់នៅជាហ្មង់ធំរហូតដល់១០០ ក្បាល។ ស្វាគ្គាម កូនម្តងបានតែមួយគត់បន្ទាប់ពីពោះអស់រយៈពេល៥-៦ ខែ។

របាយការណ៍: មានវត្តមានស្ទើរតែទូទាំងតំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ វាក៏មានវត្តមានផងដែរនៅតាមប្រទេសឆាននៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសថៃ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន កោះស្មូម៉ាត្រា បរណេអូ កោះបារ៉ា និង កោះបាលី។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្វាគ្គាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LR/nt) ជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចលើពិភពលោក និងនៅតាមតំបន់ ដែលត្រូវពឹងអាស្រ័យលើកិច្ចអភិរក្សនៅកម្ពុជា។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះដោយសារការទាក់ទាញបង្កាត់ពូជដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

Long-tailed Macaque

Macaca fascicularis



© Allan Michaud

ស្នាមដង្កត់

ភិនភាគ: ស្នាមដង្កត់មានរូបរាងដូចស្នាមត្រាសបេះបិទ តែវាមានមាឌធំជាងស្នាមត្រាសបន្តិច ។ វាមានទម្ងន់ជាមធ្យមពី ៨ ទៅ ១២គីឡូក្រាម ។ ផ្នែកលើនៃដងខ្លួនវាមានពណ៌ប្រែប្រួលពីខ្មៅស្រាលទៅត្នោតស្រាលបន្ទាប់មក ទៅជាក្រហមច្រើងៗ ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌អាស្រ័យទៅតាមអាយុកាល និងទីកន្លែងដែលវាស់នៅ ។ ស្នាមឈ្មោលពេញវ័យមានរោមដុះពីក្រោមចង្កាច្រើនជាងពុកចង្កា ស្បែកមុខមានពណ៌ក្រហមត្នោត ហើយមានពណ៌ក្រហមខ្លាំងនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅ និងនៅរដូវបន្តពូជ ។ នៅពេលចាស់ផ្នែកខាងខ្នងរហូតដល់ស្មាមានរោមវែង ហើយក្រាស់ ផ្ទៃមុខមានរោមស្លើង ថ្ងាសទំពែកឈយទៅមុខរាងចោត ។ ផ្នែកត្រីភាកកន្ទុយ មានរោមខ្លី ហើយស្លើង និងមានប្រវែងតិចជាង១០% នៃប្រវែងពីក្បាលដល់ដងខ្លួន ។ កូនរបស់វា ទើបកើតមកមានពណ៌សព្រលែត ។


ជីវសាស្ត្រ: ជាប្រភេទសត្វរស់នៅតំបន់មានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ ព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោងក្នុងព្រៃធម្មជាតិ និងព្រៃដុះឡើងវិញដែលមានរយៈកំពស់រហូតដល់ ២០០០ម៉ែត្រ ហើយវាចំណាយពេលជាច្រើននៅលើដីដើម្បីរកចំណី ។ ពួកវាស៊ីគ្រាប់រុក្ខជាតិ ផ្លែឈើ មើមឈើសត្វល្អិត និងប្រភេទសត្វតូចៗ ជាអាហារ ។ ពួកវាវស់នៅជាក្រុមរហូតដល់ ៥០ក្បាល ។

របៀបរស់នៅ: ស្នាមដង្កត់មានវត្តមានតិចតួចនៅខាងលិចទន្លេមេគង្គ និងមានជាមធ្យមខាងកើតទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ វាក៏មានផងដែរនៅភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសថៃ និងឥណ្ឌូចិន ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្នាមដង្កត់ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(VU)ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោក ។ ស្នាមដង្កត់កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារ ការបរបាញ់ ការទាក់ចាប់ ការបាត់បង់ទីជម្រក និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។

Stump-tailed Macaque

Macaca arctoides



© L. Bruce Kekule

ស្វាព្រាម

កិច្ចការ: ស្វាព្រាមមានពណ៌ខ្មៅប្រផេះពាសពេញលើដងខ្លួន ។ ផ្ទៃមុខមានពណ៌ខ្មៅគ្មានរង្វង់កង ព័ទ្ធជុំវិញភ្នែកទេ ។ ផ្នែកច្រមុះ និងមាត់មានពណ៌ស-ប្រផេះ ។ ស្វាព្រាមមានដុះកញ្ចក់មាត់វែង ពណ៌សដុះព័ទ្ធជុំវិញផ្ទៃមុខស្ទើរតែលុបបាត់ត្រចៀក ។ រោមក្បាលដុះវែងកញ្ចក់ ហើយកាន់តែ វែងទៅៗចំពោះស្វាចាស់ ។ កូនស្វានៅតូចមានពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចី មានប្រអប់ដៃ និងប្រអប់ជើង ពណ៌ខ្មៅ និងគ្មានរោមកញ្ចក់នៅលើក្បាលដូចស្វាចាស់ទេ ។ នៅពេលពេញវ័យ វាប្រែពណ៌រោមជា ប្រផេះ ដែលដុះលាតសន្ធឹងរាលដាលប្រអប់ជើង និងកន្ទុយ ហើយការប្រែពណ៌នេះចាប់ផ្តើម ក្រោមអាយុ៣ខែ ។ វាមានពណ៌ប្លែកគ្នាជាច្រើនអាស្រ័យតាមតំបន់ដូចជាតំបន់ក្បែរមាត់ទន្លេ ឬ ស្ទឹង តំបន់វាលភក់ តំបន់ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។

ជីវសាស្ត្រ: ស្វាព្រាមត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងតំបន់ ឆ្នេរព្រៃកោងកាង ។ ពួកវារស់នៅលើដើមឈើ ហើយអាចចុះដីម្តងម្កាលដើម្បីរត់លេង និងស៊ី ដីច្រាបមានសារធាតុឧស្ម័ន ។ ចំណីអាហាររបស់វាមានគ្រួយឈើ មើម ផ្លែឈើខ្ចី (ផ្នែកកោះ ត្រសក់) ផ្កា និងសត្វល្អិតផងដែរ ។ វារស់នៅជាក្រុមដែលមានចំនួនពី១០-៤០ក្បាល ឬច្រើន ជាងនេះ ហើយជួនកាលពួកនេះក៏រស់នៅក្នុងដែនព្រៃរួមគ្នាជាមួយទោចដែរ ។ វាជាសត្វចូលចិត្ត ភាពស្ងៀមស្ងាត់បំផុត ។ វាកើតកូនក្នុងអំឡុងខែធ្នូ រហូតដល់ខែឧសភា ។

របៀបរស់នៅ: ស្វាព្រាមមានវត្តមាននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ភូមិភាគ ខាងជើងបឹងទន្លេសាប និងព្រំប្រទល់កម្ពុជា-វៀតណាម ។ វាក៏មានវត្តមានផងដែរ នៅភាគខាង ត្បូងប្រទេសចិន និងប្រទេសភូមា រហូតទៅដល់ភាគខាងត្បូងឥណ្ឌូចិន និងភាគខាងត្បូង ប្រទេសថៃ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្វាព្រាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួរ ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុង បញ្ជីក្រហម IUCN (LR/nt) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ។ លើពិភពលោក ស្វាព្រាមកំពុងរង គ្រោះថ្នាក់ដោយសារ ការបរបាញ់ ការបាត់បង់ទីជម្រក និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។

Silvered Langur

Trachypithecus germaini



© Allan Michaud

ប្រាជ្ញា

វិភាគ: ឆ្នាបាមានទំហំប្រហែលសត្វឆ្នា ដែលមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួនពី ៣៤-៤២ស.ម កន្ទុយ ២២-២៧ស.ម ប្រវែងស្លាប៧០ស.ម និងទម្ងន់ពី ១-១.៧៥គ.ក។ វាមានដងខ្លួនសំប៉ែតជាមួយ និងស្រទាប់ស្បែកស្តើងគ្របដណ្តប់ដោយតភ្ជាប់ពីក្រហមដល់ម្រាមជើង ហើយព័ទ្ធជុំវិញសងខាង ដងខ្លួនចុះក្រោមរហូតដល់ក្រចកម្រាមជើង និងចុងកន្ទុយ។ ឆ្នាបាមានភ្នែកធំ មានដៃជើងវែងៗ មានក្រពុំកោងស្រួចវែងសំរាប់ចាប់តោងលើដើមឈើក្រោយពេលហើរសំកាំង។ វាមានសម្បុរ ប្រដេះ ឬ ត្នោត និងមានអុចពណ៌សជាច្រើននៅតាមបណ្តោយខ្នង។

ជីវសាស្ត្រ: ឆ្នាបាជាសត្វរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃស្រោង។ វារស់នៅតាមមែកឈើ និងពូកែលាក់ខ្លួននៅតាមដើមឈើ ហើយធ្វើសំបុកក្នុងរន្ធឈើ និងតាមធាង (ត្នោត ដូងតាមចំការ)។ វាធ្វើសកម្មភាពនៅពេលយប់ ហើយអាចធ្វើសកម្មភាពពេលថ្ងៃផងដែរ។ ឆ្នាបាអាចហោះសំកាំងបានចំងាយពី ៦០-៧០ម។ វាឡើងដើមឈើដោយលំបាក ពីព្រោះចាំបាច់ត្រូវឡើងវិលជុំវិញដើមក្នុងដំណើរយើង។ អាហារឆ្នាបាមានដូចជា ស្លឹក ពន្លកឈើ និងផ្លែឈើ។ វាកូនម្តងបានតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេល ៦០ថ្ងៃ ហើយមេរបស់វាអាចពពោះម្តងទៀតក្នុងកំឡុងពេលកូនមិនទាន់កែចេញ។

របាយរស់នៅ: ឆ្នាបាមាននៅតំបន់ភូមិភាគឦសាន និង និរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រភេទនេះក៏មានវត្តមានផងដែរនៅប្រទេសម៉ាឡាស៊ី ថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ី។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឆ្នាបាជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (EN) ជាប្រភេទជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក។

Sunda Colugo

Cynocephalus variegatus



© Norman Lim

ពង្ស

PANGOLIN



ពង្រួល

ភិរក្ខភាគៈ ជាប្រភេទសត្វធ្វើចលនាដោយវារ មានថ្ងាសផុត ស្រការមានពណ៌ស្រអាប់ និងពណ៌ដី ដោយស្បែកបញ្ចូលជាប់នឹងស្បែកដូចដំបូលប្រក់ក្បឿង និងគ្មានឆ្មេញទេ។ ស្រការទាំងនេះគ្របដងខ្លួនទាំងមូល ពិសេសផ្នែកខាងលើចាប់ពីក្បាល ដងខ្លួន ជើងមុខ-ក្រោយរហូតដល់កន្ទុយ លើកលែងតែផ្នែកពោះ និងផ្នែកក្រោមក្បាលរបស់វា។ ជើងមានម្រាមប្រាំ និងមានក្រចកគ្រប់ម្រាមទាំងអស់ ក្រញាំជើងមុខវែងជាង ក្រញាំជើងក្រោយ។ វាប្រើក្រញាំជើងមុខ ដើម្បីកកាយរកចំណី។ ពង្រួលមានចលនាយឺតៗ និងពត់ពែនក្នុងការវារចុះឡើង ហើយពូកែឡើងដើមឈើដោយប្រើជើងទាំងបួន និងជំនួយដោយកន្ទុយ។ ប្រវែងពីក្បាលទៅដងខ្លួន ៤២០-៥០០ម.ម កន្ទុយ ៣៤០-៤៧០ ម.ម ទម្ងន់ ៥-៧ គ.ក ជួនកាល គេប្រទះឃើញពង្រួលកម្ពុជាអាចមានទម្ងន់រហូតដល់ ៨-១២ គ.ក។

ជីវសាស្ត្រៈ វាមានទីជម្រកនៅក្នុងប្រភេទព្រៃដែលមានដើមឈើខ្ពស់ៗ ព្រៃក្រោយការធ្វើអាជីវកម្ម និង ដឹកសិកម្ម។ ពង្រួលជាសត្វរកស៊ីលើដី ឬក្នុងរន្ធលើ ពេលថ្ងៃវាដេកក្នុងរន្ធដី។ ចំណីអាហាររបស់វាមាន ស្រមោច សង្ហារ អង្ក្រង ដុកឡឺ និងកណ្តៀវ ដ៏ច្រើនសន្លឹកសន្លាប់។ វាមានអណ្តាតលិច ងាយក្នុងការចាប់ចំណី ដោយអាចលានចេញក្រៅបានរហូតដល់ ២៥ស.ម ដើម្បីប្រមូលសត្វល្អិត។ ពង្រួលមានត្រចៀកតូចមានស្បែក និងស្រកាក្រាស់។ នៅពេលជួបឧបសគ្គវារមួរខ្លួន ដោយយកកន្ទុយរុំព័ទ្ធជុំវិញរាងមូលដូចបាល់ក្នុងការការពារខ្លួនពីមន្តសត្វនានា។ ជាញឹកញាប់ ពង្រួលញឹបង្កើតកូនម្តងបាន១ក្បាល ជួនកាល២ក្បាលក្រោយពីពរពោះរយៈពេល ២-៣ខែ។ កូនរស់នៅជាមួយមេដោយតោងជាប់នឹងកន្ទុយពេលមេរបស់វាបម្លាស់ទី។ វាជាប្រភេទសត្វស្លូតមិនបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ។

របៀបរស់នៅៈ នៅប្រទេសកម្ពុជាពង្រួលមានដោយកន្លែងក្នុងទីជម្រកសមស្រប។ វាមានផងដែរនៅប្រទេសភូមាភាគខាងកើត ថៃភាគកណ្តាល ឡាវភាគខាងត្បូង វៀតណាម ប៉េណាំងសុលឡា ម៉ាឡេស៊ី កោះស៊ូម៉ាត្រា កោះចាវ៉ា និង កោះបរណេអូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ពង្រួលជាប្រភេទសត្វមានដោយបង្អួច និងបានចុះក្នុងបញ្ជី IUCN (NT) ជាប្រភេទជិតទទួលរងការគំរាមកំហែងលើពិភពលោក។ ប្រភេទនេះបាននិងកំពុងទទួលនូវការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្ស ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម និងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។

Sunda Pangolin

Manis javanica



© Edward Pollard/WCS

ឆ្កែ

DOGS



សេចក្តីផ្តើម: ឆ្កែចកនិងឆ្កែព្រៃស្ថិតក្នុងអំបូរ Canidae និងលំដាប់ថ្នាក់ Carnivora ។ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាពួកចំណីសត្វក្នុងលំដាប់ថ្នាក់មានចង្កូមនិងស៊ីសាច់ជាអាហារ មាន ៥៦ប្រភេទ ដែលរួមមានពពួកខ្លា សំពោច ភេ ...ជាដើម ។ ឆ្កែចកមានរាងតូចជាងឆ្កែព្រៃបន្តិច ឆ្កែព្រៃរស់នៅក្នុងទីជម្រកដែលមានពន្លឺថ្ងៃច្រើនជាងឆ្កែចក ។ ឆ្កែចកនិងឆ្កែព្រៃមានកំលាំង និងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលល្ងាច និងជួនកាលនៅពេលយប់ ។ ឆ្កែចក និងឆ្កែព្រៃទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ និងបាត់បង់ទីជម្រក ។

ផ្លែចក

កិច្ចការ: ផ្លែចកមានរូបរាងស្រដៀងនឹងផ្លែស្រកដែរ ប៉ុន្តែតូចជាងផ្លែព្រៃ ហើយលក្ខណៈពណ៌ មានលាយឡំជាមួយប្រផេះ និង ត្នោត។ ចុងកន្ទុយមានលក្ខណៈសំពោងភ្ជាប់ជាមួយរោមពណ៌ ក្រមៅ។ វាមានកន្ទុយត្រង់មិនខ្លីនឹងដូចកន្ទុយផ្លែស្រកទេ ។


ជីវសាស្ត្រ: វាចូលចិត្តរស់នៅព្រៃរេបេះ វាលស្មៅ និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង។ ជាទូទៅសត្វ ឈ្មោលមានតួនាទីជាអ្នកមើលថែរក្សាកូនតូចៗច្រើនជាងសត្វញី។ វាភាគច្រើនរកស៊ីនៅពេល យប់ ពួកវាតែងតែបញ្ចេញសំលេងល្អនៅពេលយប់ងងឹត និងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗ ហើយ គេបានប្រទះឃើញផងដែរពីវត្តមានសត្វនេះនៅពេលថ្ងៃ។ ជាទូទៅវាតែងតែដើរតែងកង ពេលខ្លះជាក្រុមតូច រឺជាក្រុមមួយនឹងកូនផងដែរ។ ចំណីអាហាររបស់ផ្លែចកមានដូចជា: រុក្ខជាតិ ពពួកឈ្នួស ប្រើស រមាំង សត្វស្លាប ល្អិត ពពួកជល់លិកសត្វ ព្រមទាំងសាកសពសត្វស្តុយរលួយ និងចំណីដែលបន្សល់ទុកពីសត្វដទៃ។ វាបង្កាត់ពូជជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាទូទៅមានកូនពី ៤-៥ ក្បាល បន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេលពីរខែ។ ឈ្មោល និងញីមានភាពរីកចម្រើនរហូតដល់អាយុ ១៦ឆ្នាំ។

របៀបរស់នៅ: ផ្លែចកមានវត្តមាននៅភូមិភាគខាងជើង និង ឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា។ គេរកឃើញផងដែរនៅអាហ្សិកខាងកើត និងខាងជើង ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ប្រទេសឥណ្ឌា ភាគខាងត្បូង អឺរ៉ុប ប្រទេសភូមាភាគខាងជើង និង ភាគខាងលិចនៃប្រទេសថៃ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្លែចកស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LC)ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច។ ផ្លែចកកំពុងរងគ្រោះដោយសារការ ទាក់ចាប់ និង បាត់បង់ជម្រកដែលធ្លាប់តែរកចំណី និងរស់នៅ។

Golden Jackal

Canis aureus



© JC Eames

ផ្លែព្រៃ

កំណត់: ផ្លែព្រៃមានមាឌធំជាងផ្លែចេក មានសម្បុរក្រហមឆ្មោត និងកន្ទុយសំពោងរំងាង កន្ទុយផ្លែចេក នៅចុងកន្ទុយមានសម្បុរខ្មៅងត្រចៀកមានរាងខ្លី និងមូលនៅផ្នែកខាងចុង ។ វាមានរូបរាង និងមាឌប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្លែស្រកដែរ ។

ជីវសាស្ត្រ: ផ្លែព្រៃចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូងដូចផ្លែចេកដែរ និងមានវិសាលភាពទីជម្រកព្រៃធំដូចជា ប្រភេទព្រៃគម្ពោតក្រាស់ រហូតដល់ព្រៃខ្ពស់ៗនៅវាលទំនាប និងព្រៃរេបោះ ។ គេតែងប្រទះ ឃើញវត្តមានសត្វនេះពី ៥-១២ក្បាល រួមមានជាតូ (ញី-ឈ្មោល) ព្រមទាំងកូនផងដែរ ហើយ អាចមានកូនម្តងពី ៤-៦ក្បាល ។ វាមានលទ្ធភាពចាប់សត្វដែលមានមាឌធំជាងខ្លួនមកធ្វើជាចំណី អាហារបានដូចជា ខ្លីង ឈ្នួស ប្រើស ជ្រូកព្រៃ និងសត្វតូចៗដទៃទៀត ពិសេសជាងនេះវាអាច មានសមត្ថភាពដណ្តើមចំណីពីសត្វខ្លាធំ និងខ្លាខ្លីផងដែរ ។ នៅពេលចាប់សត្វជាចំណីពួកវាតែង តែដេញបណ្តាក់គ្នា ដើម្បីធ្វើអោយសត្វនោះអស់កំលាំង ពេលខ្លះប្រើវិធីសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធ ។ វាប្រើទឹកនោមសំរាប់បាញ់ប្រហារទៅលើភ្នែកសត្វ ដែលជាចំណី និងជាសត្វរូបសំរាមវា ។ ផ្លែព្រៃ ចូលចិត្តចេញទៅរកចំណីនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗ និងព្រលប់ងងឹតព្រាលៗ ។

របាយរស់នៅ: វាមានវត្តមាននៅតំបន់ភាគឦសាន ភាគនិរតី និងភាគខាងជើងនៃប្រទេស កម្ពុជា ។ គេក៏បានរកឃើញនៅប្រទេស ឥណ្ឌា ចិន តំបន់ស៊ីបេរី និងភាគខាងត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងកោះស៊ូមាត្រា និងថាវ៉ា ផងដែរ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្លែព្រៃស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូរ ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុង បញ្ជីក្រហម IUCN (EN) ជាប្រភេទជិតផុតពូជលើពិភពលោក ។ ផ្លែព្រៃកំពុងរងគ្រោះ ដោយសារការទាក់ចាប់ បរពាញ និងការបាត់បង់ទីជម្រក ។

Dhole

Cuon alpinus



© CI



© Allan Michaud

ខ្លាឃ្មុំ

BEARS



សេចក្តីផ្តើម: ខ្លាឃ្មុំនិងខ្លាឃ្មុំតូចជាប្រភេទសត្វស្ថិតក្នុងអំបូរ Ursidae នៃលំដាប់ថ្នាក់ Carnivora ។ ខ្លាឃ្មុំទាំងពីរមានដៃដែលមានកំលាំងខ្លាំង និងក្រចកព្រំនៅនឹងប្រអប់ដៃ។ ខ្លាឃ្មុំប្រភេទខ្លះនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនប្រើដៃចាប់ត្រីស៊ីជាអាហារ ខ្លាឃ្មុំច្រើនចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្ងាយ ដើម្បីស្វែងរកចំណី ខ្លាឃ្មុំមានសកម្មភាពនៅពេលព្រឹក និងមុនពេលថ្ងៃលិច។ ខ្លាឃ្មុំរងការគំរាមកំហែងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ និងបាត់បង់ទីជម្រក។

ខ្លាឃ្មុំធំ

ភិកភាគ: ខ្លាឃ្មុំធំមានមាឌធំជាងគេក្នុងចំណោមប្រភេទខ្លាឃ្មុំទាំងអស់ ដងខ្លួនគ្របដណ្តប់ដោយ រោមក្រាស់វែងៗពណ៌ត្នោត និងមានឆ្នុតពណ៌លឿងខ្លាំងដូចអក្សរវេ (V) នៅខាងក្រោមក។ ស្លឹកត្រចៀកមានទំហំធំជាងខ្លាឃ្មុំតូច និងមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួនពី ១២០០-១៥០០ម.ម ជាមធ្យមឈ្មោលមានទម្ងន់ពី ១១០-១៥០ គ.ក រីឯញីមានទម្ងន់ពី ៦៥-៩០ គ.ក។ ប្រអប់ជើង មានទំរង់ស្រដៀងនឹងប្រអប់ជើងរបស់មនុស្ស ។

ជីវសាស្ត្រ: ជាប្រភេទសត្វរស់នៅឯកងរាវ រស់នៅជាកូលរដូវបន្តពូជតែប៉ុណ្ណោះ និងចូលចិត្ត រស់នៅតាមទីជីវកតំបន់ខ្ពង់រាប តំបន់ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងវាលស្មៅក្រាស់ៗ។ ប្រភេទ នេះជាទូទៅដេកនៅពេលថ្ងៃ តាមប្រហោងគល់ឈើធំៗ រូងភ្នំ និងក្រហែងថ្ម។ វាចេញរកស៊ីនៅ ពេលយប់ ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះរកស៊ីពេលថ្ងៃផងដែរនៅរដូវផ្លែឈើទុំ។ ចំណីរបស់វាមានដូចជា ឃ្មុំ ព្រួត ឫសឈើ សត្វល្អិត រុក្ខជាតិ។ វាមានលក្ខណៈបន្ទុំផងដែរទៅនឹងចំណីផ្សេងៗ ចំពោះខ្លាឃ្មុំ ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងសួនសត្វវាស៊ីចំណីដូចជា បបរសណ្តែក បន្លែ ត្រី សាច់រោង ដូង។ល។ ខ្លាឃ្មុំធំ បង្កើតកូនម្តង បាន ១-២ក្បាល បន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេល ៧-៨ខែ ជួនកាលមានកូនរហូតដល់ ៣ -៤ក្បាល ប៉ុន្តែចំនួននេះកម្រនឹងមានណាស់។ កូនរស់នៅជាមួយមេរហូតដល់អាយុ ៣ឆ្នាំ និង ជួនកាលរហូតដល់មេរបស់វាមានកូនបន្ទាប់មួយទៀត។

របាយរស់នៅ: ខ្លាឃ្មុំធំមាននៅកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្របប្រភេទព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាល ស្រោង។ ប្រភេទនេះក៏មានវត្តមានផងដែរ នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ភូមា ថៃភាគខាងជើង ឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្លាឃ្មុំធំស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ ដែលត្រូវបានការពារ ដោយច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទរងគ្រោះ ហើយត្រូវ បានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី 1 នៃអនុសញ្ញា CITES។ ខ្លាឃ្មុំធំត្រូវបានថយចុះដោយសារការ បាត់បង់ទីជីវក ការខ្វះខាតទីតាំងរកចំណី និងការបរបាញ់ដើម្បីយកសំណាកធ្វើអាជីវកម្ម។

Asian Black Bear

Ursus thibetanus



ខ្លាឃ្មុំតូច

ភិក្ខុភាគៈ ជាប្រភេទខ្លាឃ្មុំដែលមានមាឌតូចជាងគេនៅលើពិភពលោក មានទម្ងន់ពី២៧-៦៥ គ.ក ។ ដងខ្លួនគ្របដណ្តប់ទៅដោយរោមខ្លីក្រាស់ពណ៌ខ្មៅរលោង លើកលែងតែផ្ទៃមុខមានរោមពណ៌ស និងឆ្នុតពណ៌លឿងខ្លីរាងអក្សរ(២) នៅខាងក្រោមក ត្រចៀកមូលខ្លី និងមានដានជើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សដែរ ។

ជីវសាស្ត្រៈ វាអាចរស់នៅតាមព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។ ខ្លាឃ្មុំតូចជាសត្វពូកែឡើងដើមឈើ និងមានលក្ខណៈជីវសាស្ត្រដូចខ្លាឃ្មុំធំ ទាំងការបន្តពូជ និងការរកចំណី ។ ប្រភេទចំណីរួមមាន សត្វល្អិត ផ្លែឈើ រុក្ខជាតិ ឃ្មុំ ព្រួត ម្រោម និងពពួកសត្វកក្រើរ ព្រមទាំងសត្វស្លាបដូចជាមាន់ព្រៃផងដែរ ។ ក្រញាំជើងមុខទាំងពីរអាចកាយដំបូកកណ្តើររហូតដល់ជំរៅលិចខ្លួនបាត់ ។ ជាទូទៅវាបង្កើតកូនម្តងបានពី ១-២ ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយកូនរស់នៅជាមួយមេរហូតដល់ពេញវ័យ ។

របាយរស់នៅៈ មានជាមធ្យមនៅភូមិភាគឦសាន និរតី និង ភូមិភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា ។ ពួកវាក៏មានវត្តមានផងដែរ នៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ កោះស៊ូមាត្រា និងកោះបរណេអូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ខ្លាឃ្មុំតូចជាប្រភេទស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយកម្រ និងបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី 1 នៃអនុសញ្ញា CITES ។ ខ្លាឃ្មុំតូចកំពុងរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ទីជម្រក និងការបំបាត់ និងទាក់ទាញដើម្បីយកធ្វើអាជីវកម្ម ។

Sun Bear

Ursus malayanus



© wcs



© Allan Michaud

ជ្រូកព្រៃ

WILD PIG



សេចក្តីផ្តើម: ជ្រូកព្រៃស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Artiodactyla ។ ក្នុងលំដាប់នេះរួមមានសត្វមានស្នែងដទៃទៀតផងដែរ ។ ប៉ុន្តែជ្រូកព្រៃមានលក្ខណៈពិសេសនៅត្រង់ក្រពះរបស់វាដែលអាចកិនឬរំលាយអាហារដែលជាស្លឹករុក្ខជាតិ ស្លឹកស្មៅ និងអាហារដែលមានសរសៃ នៃដើមរុក្ខជាតិបានដូចពពួកសត្វទំពារអៀង និងប្រើសដែរ ។

ជ្រកព្រៃ

ភិក្ខុភាគៈ ជ្រកព្រៃជាសត្វមានសម្បុរផ្លាស់ប្តូរទៅតាមវិធី ។ នៅតូចវាមានសម្បុរប្រផេះ-ត្នោត និងប្រែជាប្រផេះសុទ្ធកាលណាវាមានអាយុជាង ៥ឆ្នាំ ។ ជ្រកព្រៃមានកន្ទុយបះត្រង់ទៅក្រោយ ឬត្រង់ឡើងលើ ឯជ្រកព្រៃមេមានកន្ទុយសំយ៉ុងចុះក្រោម ។ ជ្រកព្រៃមានចង្កូមមួយគូដុះលូតចេញជាខ្លាយស្រួច ជួនកាលខ្លាយនេះកោងខុបចុះក្រោមជារង្វង់ ដែលជាអាវុធសំខាន់សំរាប់ការពារខ្លួន និងសំរាប់ឈ្នួសដី ។ ជ្រកព្រៃមានវិញ្ញាណវៃបំផុតដោយប្រើច្រមុះ និងត្រចៀក ។

ជីវសាស្ត្រៈ ជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅជាយព្រៃស្រាវ ព្រៃដែលមានកូនឈើស្លាប់ជិត និងព្រៃស្ងាត់ដែលមានថ្ម ត្រពាំង សំរាប់ដេកត្រាំកក់នៅពេលថ្ងៃ ហើយចូលចិត្តរស់នៅបំផុតក្នុងព្រៃសើម ។ នៅរដូវប្រាំងវាតែងតែនៅតាមបណ្តោយដងស្ទឹង ព្រែក ឬអូរ ។ ជ្រកព្រៃជាសត្វស៊ីអាហារគ្រប់ប្រភេទ មានសត្វតតអ៊ឹងកងនានា ផ្សិត ឬសឈើ សាកសពសត្វ មើមឈើ ពន្លកឈ្នះ ទំពាំងព្រម ទាំងផ្លែឈើ និងបន្លែរាប់ទាំងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផង ។ វារកចំណីដោយប្រើច្រមុះសំរាប់ឈ្នួសដីរឹង-ទន់ ។ ជ្រកព្រៃជាធម្មតារកស៊ីនៅពេលព្រលឹមស្រាងៗ និងព្រលប់ ប៉ុន្តែវាអាចរកស៊ីនៅពេលយប់ផងដែរ កាលណាបើមានការរំខានពេលវេលារកស៊ីរបស់វាច្រើន ។ វាដោយញឹក-ឆ្មោលនៅខែវិច្ឆិកា ហើយក្រោយពីមានពពោះរយៈពេល ៥ខែ ជ្រកមេអាចផ្តល់កំណើតកូនជាលើកដំបូង ពី ៤-៨ក្បាល និងលើកទីពីរ ១៥-១៧ ក្បាល និងបំបៅដោះរហូតដល់ ៣-៤ខែ ។ សត្វជ្រកព្រៃញឹកអាចបន្តពូជបាននៅអាយុ ៦-៧ខែ ។ អាយុកាលរបស់វាជាមធ្យម ១០-១២ឆ្នាំ និងអាចដល់ ២០ឆ្នាំ ។

របាយរស់នៅៈ នៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង និងមានការរីកសាយភាយ ។ ជ្រកព្រៃមានវត្តមានស្ទើរគ្រប់តំបន់លើពិភពលោកដូចជានៅអឺរ៉ុបភាគខាងជើង ទ្វីបអាហ្វ្រិក អាស៊ី និង ប្រទេសជប៉ុន ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ជ្រកព្រៃ ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូវ ព្រោះវាមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងការបង្កកំណើត ។

Wild pig

Sus scrofa



© WCS



© WWF

មំសាសីថ្នាក់តូច

SMALL CARNIVORES



សេចក្តីផ្តើម៖ ពពួកមំសាសីថ្នាក់តូចរួមមាន៖ សំពោច ជ្រូកព្រល ភេ ស្មា និងកំពឹងដូង ស្លឹត នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Carnivora ។ ពពួកនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមឈ្មួញនៃទីជម្រក និងសម្រាប់ រស់នៅរបស់វា។ ជាពិសេសពពួកសំពោចភាគច្រើនចូលចិត្តស៊ីផ្លែឈើនិងសត្វល្អិត។ ពួកសំពោច ខ្លះជួនកាលក៏ស៊ីសាច់សត្វដ៏ទៃទៀតផងដែរ។ គ្រប់ប្រភេទសត្វក្នុងលំដាប់ថ្នាក់នេះកំពុងស្ថិតនៅ ក្រោមការគំរាមកំហែងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ និងបាត់បង់ទីជម្រក។

សំពោចកល្បឿង

ភិរក្ខភាគៈ សំពោចកល្បឿងមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងសត្វសំពោចដែរ ប៉ុន្តែស្ទើងទ្រវែងបន្តិច។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាមានពណ៌ការប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗ ដែលវាស់នៅដូចជានៅភូមិភាគនិរតី ពួកវាដងខ្លួនស្ទើរទាំងមូលមានពណ៌លឿង រីឯនៅភូមិភាគខាងកើតវាមានពណ៌លឿង តែនៅត្រង់បំពង់ក និងពោះប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯខ្នងមានពណ៌ត្នោត។ ជាទូទៅពួកវាមានកពណ៌លឿងជានិច្ច ទោះបីជាពួកវាស់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ ។

ជីវសាស្ត្រៈ សំពោចកល្បឿងនេះជាសត្វដែលអាចរស់នៅក្នុងទីជម្រកគ្រប់ប្រភេទ ប៉ុន្តែវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទីជម្រកដែលមានព្រៃជាង ហើយអាចឡើងដើមឈើបានយ៉ាងលឿន។ ជាញឹកញាប់វាចុះមកក្រោមដើម្បីរកចំណី។ សត្វនេះច្រើនរកស៊ីនៅពេលថ្ងៃជាតូច ឬ ក្រុម ជួនកាលក៏មានចេញរកចំណីនៅពេលយប់ផងដែរ។ ចំណីរបស់វាមានដូចជា កំប្រុក សត្វស្លាប ស៊ីត ពស់ បង្កុយ កង្កែប សត្វល្អិត ផ្លែឈើ ឬទឹកឃ្មុំផងដែរ។ សត្វនេះមានអាយុកាល ១៤ឆ្នាំ និងមានកូនជាមធ្យម ៣-៥ ក្បាល។

របៀបរស់នៅៈ ប្រភេទនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្របប្រភេទព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោង។ ពួកវាក៏មានវត្តមានផងដែរ នៅទូទាំងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ភាគខាងជើងតំបន់ស៊ីបេរី និងភាគខាងលិចប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ សំពោចកល្បឿង កំពុងរងគ្រោះដោយសារ ការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ និងបាត់បង់ទីជម្រក។ សំពោចកល្បឿងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច។ ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៃបញ្ជីក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច។

Yellow-throated Marten

Martes flavigula



© Matt Hunt



© WCS

សំពោចធំ

ភិនភាគ: សំពោចធំមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងសត្វខ្លីន ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់សត្វនេះមានដុំខ្មៅ អុចៗនៅតាមផ្នែកចំហៀងខ្លួន ក្បាល និងជើងក្រោយ ហើយក្បាល និងមាត់របស់វាធំជាងខ្លីន ។ រោមប្រែងដែលមាននៅលើដងខ្លួនសត្វខ្លីនបានបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងខ្នង ប៉ុន្តែរោមប្រែងរបស់ សំពោចធំបានអូសបន្លាយរហូតដល់ចុងកន្ទុយ ។ សំពោចនេះមានសម្បុរពីប្រផេះរហូតដល់ត្នោត ហើយកន្ទុយវាមិនមានវិណ្ឌពណ៌សព័ទ្ធជុំវិញទាំងស្រុងឡើយ ។ ផ្នែកខាងក្រោមខ្លួនមានពណ៌ពី ប្រផេះរហូតដល់ត្នោត ជើងទាំង៤ មានពណ៌សនៅផ្នែកខាងលើ និងពណ៌ខ្មៅនៅផ្នែកខាងក្រោម ។

ជីវសាស្ត្រ: សំពោចធំរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃផ្សេងៗ ពិសេសនៅក្បែរៗភូមិ ឬតាមត្រពាំងនៅ ក្នុងព្រៃឈ្មោះ ។ សំពោចនេះតែងតែរកចំណីតែឯងនៅតាមគុម្ពាតព្រៃតូចៗ ឬធំ ហើយវាអាច ឡើងដើមឈើបាន ។ ការរកចំណីរបស់សត្វនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលយប់ ហើយចំណីទាំងនោះរួម មាន កណ្តុរ មាន់ និងផ្លែឈើ ។

របាយរស់នៅ: ប្រភេទនេះបានរកឃើញនៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសនៅភាគ ខាងជើង និងខាងកើតក្នុងជំរកព្រៃបោះ ។ វារាយប៉ាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងមានដោយកម្រ នៅបណ្តាប្រទេសជាច្រើន ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: សំពោចធំស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូរ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះបញ្ជី ក្រហម IUCN (LC) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចនៅលើពិភពលោក ប្រភេទនេះកំពុងរង គ្រោះដោយសារ ការបរបាញ់ និងទាក់ទាញដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។

Large-spotted Civet

Viverra megaspila



© WWF

កិនភាគៈ ខ្លិនជាអំបូររស់ពោធិ៍ដែលមានមាឌធំហើយអាចសម្គាល់នូវលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបានដោយសារបំពង់កមានឆ្នួតស-ខ្មៅធំៗ កន្ទុយមានបង្កង់ស-ខ្មៅពី ៦-៧។ ចាប់ពីក្រហូតដល់ចុងខ្នងមានរោមប្រែងពណ៌ខ្មៅ ក្បៅ និងផ្នែកចំហៀងខ្នងមានឆ្នួតពពាណ្ឌខ្មៅ-ស ជើងមុខមានពណ៌ត្នោតចាស់ រីឯជើងក្រោយមានពណ៌ត្នោតខ្ចី បបូរមាត់លើ និងក្នុងត្រចៀកពណ៌ស ។ កូនទើបនឹងកើតភាគច្រើនមានសម្បុរខ្មៅ ។

ជីវសាស្ត្រៈ ខ្លិនច្រើនរស់នៅតាមព្រៃឈ្មោះ ពិសេសគឺស្ថិតនៅព្រៃក្បែរភូមិប្រជាជន ។ សត្វនេះចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ រីឯនៅពេលថ្ងៃវាស្ថិតនៅក្នុងព្រៃគុម្ពោតដែលមានស្មៅក្រាស់ៗ ឬក៏ក្នុងរន្ធ ។ ខ្លិនជាសត្វដែលរស់នៅលើដី ចូលចិត្តលេងចាប់មាស និងរកស៊ីនៅតាមគំនរសំរាម ហើយចំណីរបស់វាគឺ ត្រី សត្វស្លាប ស៊ីត ផ្លែឆ្នាំង បង្កុយ ពស់ កង្កែប សត្វល្អិត កណ្តុរ ផ្លែឈើ និងប្លូសឈើផងដែរ ។ សត្វនេះអាចមានអាយុដល់១៥ឆ្នាំ និងអាចបង្កើតកូនក្នុងមួយឆ្នាំបានពី ២-៤ ក្បាល ។

របាយការណ៍ៈ ប្រភេទនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្រប ។ វាត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌា ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន និងតំបន់ដីគោកទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ខ្លិន ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូរ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ។

Large Indian Civet

Viverra zibetha



© WWF

សំពោចវ័ស្សី សំពោចតូច

កិនភាគ: សំពោចវ័ស្សីមានរូបរាងតូច ជើងរបស់វាខ្លីជាងសត្វខ្លីន កន្ទុយមានបង្កង់ខ្មៅ-សពី ៦-៩ និងមានពណ៌ស នៅខាងចុង ។ ខ្លួនរបស់វាមានដុំខ្មៅតូចៗ ហើយមានវិណ្ឌុស-ខ្មៅនៅកម្រិតបង្ហាញឱ្យច្បាស់ដូចវិណ្ឌុសតូចខ្លីនទេ ។ សំពោចវ័ស្សីជាសត្វមានក្រពេញក្លិន ហើយខាងលើខ្នងរបស់វាមានឆ្អុត ខ្មៅពីរ ឬបី ។ ផ្នែកករបស់វាគ្មានរោមប្រេងដូចសត្វខ្លីនទេ និងមានក្បាលតូច ។

ជីវសាស្ត្រ: សំពោចវ័ស្សីច្រើនរស់នៅឯកោតាមតំបន់ព្រៃឈ្មោះ និងជាសត្វព្រៃត្រចៀកដែលរកចំណីនៅលើដី ជួនកាលវាក៏រស់នៅជាក្រុមក្បែរភូមិដែរ ។ ចំណីអាហាររបស់សត្វនេះមានដូចជា កណ្តុរបក្សី ពស់ ផ្លែឈើ ឬសឈើ និងបន្លែ មាន់ ទាជាដើម ។ វាកើតកូននៅតាមរូងខាងក្រោមផ្ទាំងថ្ម ឬតាមគល់ឈើ ។ វាកើតកូនម្តងបានពី ៣-៥ ក្បាល ហើយវាអាចរស់បានរហូតដល់វាមានអាយុពី ៨-៩ ឆ្នាំ ។

រាយការណ៍នៅ: ពួកវាមានដោយសម្បូរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្រប ប៉ុន្តែលើកលែងតែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោង ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌា ចិន តំបន់ដីគោកទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះសូម៉ាត្រា) និងម៉ាឡេស៊ី (កោះបារ៉ា) ផងដែរ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: សំពោចវ័ស្សីជាក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូរ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ។ សំពោចវ័ស្សីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ធ្វើជំនួញ និងការបាត់បង់ទីជម្រក ។

Small Indian Civet

Viverricula indica



© WCS



© WWF

សំពោចក្រអូប (សំពោចត្នោត)

ភិកភាគ: សំពោចក្រអូប គឺជាសំពោធមានមាឌតូចដែលមានពណ៌ប្រផេះ ឬត្នោត ត្រចៀក ជើង និងផ្នែកចុងនៃកន្ទុយ ពណ៌ខ្មៅ ថ្លាសមានពណ៌ស ដោយមានឆ្នុតខ្មៅនៅចំកណ្តាល ផ្ទៃមុខខ្មៅ ប៉ុន្តែមានឆ្នុតសនៅខាងក្រោមភ្នែក និងសងខាងច្រមុះ។ នៅលើខ្នងមានឆ្នុតខ្មៅ ៣ និងនៅសងខាងខ្នងមានអុចខ្មៅ ហើយរោមនៅកមានច្រើនដែលបង្កើតបានជាគន្លាក់ៗ។ ជាធម្មតាសំពោចនេះមានក្លិនក្រអូប ប៉ុន្តែមានក្លិនឈួលខ្លាំងនៅពេលដែលវាមានការភ័យខ្លាចនឹងអ្វីមួយ។

ជីវសាស្ត្រ: សំពោចក្រអូបនេះមានវត្តមាននៅតាមទីជីវកព្រៃគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំងវាលស្រែចំការដំណាំ និងក្បែរភូមិផងដែរ។ វាចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងងងឹតៗ តាមជង្រុក ទប់ង្គូរទឹក ឬដីបូលផ្ទះ នៅពេលថ្ងៃ ហើយនៅពេលយប់វាចេញរកចំណីដូចជា កណ្តុរ ស្វាយ កាហ្វេ ម្នាស់ ត្រសក់ ស្រូវ និងចេក។ សំពោចនេះបន្តពូជពេញមួយឆ្នាំដោយមានកូននៅខែតុលា និងខែធ្នូ ក្នុងមួយលើកៗ វាអាចមានកូនពី ២-៤ ក្បាលនៅតាមរូងថ្ម ឬប្រហោងឈើ។ អាយុកាលរបស់វាប្រហែល ១៤ឆ្នាំ។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទនេះសម្បូរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្រប។ វាក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅ ប្រទេសឥណ្ឌា ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន និងតំបន់ដីគោកទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះសូម៉ាត្រា) ម៉ាឡេស៊ី (កោះបារ៉ា និង កោះបរណេអូ) និង ហ្វីលីពីនផងដែរ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: សំពោចក្រអូប ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្ក្រាប និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការបរបាញ់ ការបាត់បង់ទីជម្រក និងទាក់ទាញដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

Common Palm Civet

Paradoxurus hermaphroditus



© WWF

សំពោចពណ៌លាត

ភិនភាគ: សំពោចពណ៌លាតជាសំពោចមួយប្រភេទដែលមានពណ៌លាត គ្មានឆ្នុត ឬស្នាមអុចនៅលើដងខ្លួន។ ពណ៌នៅលើដងខ្លួនរបស់វាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងរវាងសត្វនីមួយៗ ហើយពណ៌នេះមានចាប់ពីត្នោតខ្ចីរហូតដល់ត្នោតចាស់ ថ្លាសពណ៌សបង្អស់ដល់ច្រមុះ និងនៅសងខាងក្បាលពណ៌សផ្នែកក្រោមពោះមានពណ៌ក្លីជាងខាងលើ។ កន្ទុយវែងសឹងតែស្មើទៅនឹងដងខ្លួន ហើយនៅខាងចុងភាគច្រើនគឺពណ៌ស។ សំពោចនេះមានក្លិនឈ្ងួលខ្លាំង។


ជីវសាស្ត្រ: សំពោចពណ៌លាតនេះរស់នៅតាមគ្រប់ប្រភេទព្រៃ និងនៅក្បែរភូមិ។ សំពោចនេះចូលចិត្តនៅលើដើមឈើ និងរកចំណីនៅពេលយប់ ចំណីភាគច្រើនគឺជាផ្លែឈើ ដូចជាផ្លែល្ងា ចេក ស្វាយ និងស្លឹកឈើ កណ្តុរ ហើយវាក៏ប្រសិទ្ធិមាំមួន និងទាណាស់។ សត្វនេះសម្លឹងកើតកូននៅតាមប្រហោងឈើ កូនក្នុងមួយលើកៗអាចមានដល់ទៅ ៤ ក្បាល ហើយកូននេះនឹងមានរូបរាងប៉ុនទៅនឹងសត្វពេញវ័យក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទនេះមានតិចតួចនៅភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្រប ហើយក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន និងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ដីគោក អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះសូម៉ាត្រា) និងម៉ាឡេស៊ី (កោះប៉ាវ៉ា) ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: សំពោចពណ៌ ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្ករ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ប៉ុន្តែនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការបរបាញ់ បាត់បង់ទីជម្រក និងទាក់ទាញដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

Masked Palm Civet

Paguma larvata



សំពោចអុចខ្នង

ភិនភាគ: សំពោចអុចខ្នងជាសំពោចដែលមានពណ៌ត្នោតខ្ចី និងនៅក្រោមពោះពណ៌លឿង ។ ដុំខ្មៅអុចៗនៅលើខ្នងបង្កើតបានជាឆ្លុត ៣ នៅលើដងខ្នង កន្ទុយវែងជាងដងខ្នង ហើយនៅពាក់កណ្តាលខាងចុងមានពណ៌ក្រមៅ ។ វាមានឆ្លុតពណ៌សចាប់ពីថ្នាសរហូតដល់ច្រមុះ ។ ជើងមុខមានលក្ខណៈចង្អៀតហើយវែងជាងសំពោចក្រអូប ។ សត្វញីមានក្រពេញក្លិន និងមានដោះពីរគូ ។

ជីវសាស្ត្រ: សំពោចអុចខ្នងនេះចូលចិត្តរស់នៅតាមព្រៃដែលមានដើមឈើខ្ពស់ៗដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិ ។ វាចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ និងចូលចិត្តរស់នៅលើដើមឈើ ហើយវាពូកែឡើងដើមឈើណាស់ ។ ចំណីរបស់វាសំខាន់គឺ ផ្លែឈើ ប៉ុន្តែវាក៏ស៊ីសាច់ផងដែរដូចជា សត្វល្អិត ជលថលិក-សត្វ (កង្កែប...) ថនិកសត្វថ្នាក់តូច សត្វស្លាប ថ្លែន បង្គុយ... ទឹកដមផ្កា (ត្រួយ) និងលម្អងផ្កា ។ វាបន្តពូជពេញមួយឆ្នាំ ដោយកូនម្តងបានពី ២-៣ក្បាល ហើយរយៈពេលពោះ ១៤៥ថ្ងៃ ។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទនេះមានតិចតួចនៅប្រទេសកម្ពុជា ។ គេក៏បានរកឃើញផងដែរនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌា ភូមា ថៃ ឡាវ វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះស៊ូម៉ាត្រា) និងម៉ាឡេស៊ី (កោះបារ៉ា និងកោះបរណេអូ) ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ប្រភេទនេះថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រក និងការទាក់ទាប ។ សំពោចអុចខ្នងស្ថិតក្នុងប្រភេទមានដោយបង្អួច ប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រភេទនេះជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។

Small-toothed Palm Civet

Arctogalidia trivirgata



© Lon Grassman



កំពឹងដូង

ភិកភាគ: កំពឹងដូងជាប្រភេទសំពោចមានរាងស្លឹង ក្បាលរបស់វាតូចវែង មានក្រឡាបង្កងៗ លើដងខ្នង និងមានអុចៗក្រមៅនៅតាមចំហៀងពោះ និងលើជើង ។ សម្បុររបស់វាគឺប្រផេះលឿង ។

ជីវសាស្ត្រ: ច្រមុះរបស់កំពឹងដូងនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសំរាប់ឈ្នួសដឹកសត្វល្អិត ដឹកដើរពីងពាង ដង្កូវ និងសត្វគ្មានឆ្អឹងកងផ្សេងៗទៀត ហើយសត្វនេះអាចកាយដីដោយប្រើក្រពុកមុខ ។

របាយការណ៍: ទោះបីជាមិនមានការកត់ត្រាអំពីប្រភេទនេះជាផ្លូវការក៏ដោយ ក៏គេបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងខេត្តមណ្ឌលគិរី និង ភាគខាងជើងខេត្តរតនគិរី ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ប្រភេទនេះមានដោយបង្អួចនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ។ វាត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយងាយរងគ្រោះនៅលើពិភពលោក និងការពារដោយច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ។ សត្វប្រភេទនេះ មានអត្រាទាបក្នុងការបន្តពូជ និងកំពុងរងគ្រោះដោយសារ ការបាត់បង់ទីជម្រក និងការទាក់ទាញផងដែរ ។

Owston's Civet

Hemigalus owstoni



© Small Carnivore Conservation Project - Cuc Phuong National Park

ឈ្មួសប្រែង ឬ សំពោចភ្នំ

កិនភាគ: ឈ្មួសប្រែងជាប្រភេទសំពោចដែលមានមាឌធំជាងគេ មានសម្បុរក្រមៅលាយជាមួយ ពណ៌ត្នោតនៅខាងចុងនៃរោម រូបរាងដូចសត្វខ្លាឃ្មុំធំ រោមវាវែងៗហើយក្រាស់ វាអាចឡើងដើម ឈើបានដោយប្រើកន្ទុយសំរាប់តោងពីមែកមួយទៅមែកមួយ ។ រោមនៅខាងចុងត្រចៀកមាន ពណ៌ស ត្រចៀកមូលហើយនៅខាងចុង មានពណ៌ស ។ សត្វញីមានដោះពីរគូ ។

ជីវសាស្ត្រ: ឈ្មួសប្រែងនេះចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃដែលមានដើមឈើខ្ពស់ៗ ជាសត្វរកចំណីនៅ ពេលយប់ដោយបំលាស់ទីយឺតៗ ។ នៅពេលថ្ងៃ សត្វនេះដេកនៅតាមប្រហោងឈើដោយប្រើ កន្ទុយរបស់វាបំពាក់ក្បាល ។ ចំណីរបស់វារួមមានផ្លែឈើ និងសត្វរស់នៅតាមដើមឈើ ដូចជា បក្សី អំបូរកកេរ សត្វល្អិត បង្កួយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាអាចមុជ និងហែលទឹកនៅតាមអូរ ក្នុងព្រៃ ដើម្បីចាប់ត្រីតាមមាត់ច្រាំងទៀតផង ។ សត្វនេះបន្តពូជស្ទើរពេញមួយឆ្នាំ សត្វមេអាចមានកូន ចន្លោះពី១-៣ក្បាល/១ឆ្នាំ ហើយអាយុកាលរបស់វាប្រហែល ១៨ឆ្នាំ ។

រាយការណ៍: ប្រភេទនេះមានតិចតួចនៅព្រៃស្រោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ គេក៏បានរក ឃើញផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះស៊ូម៉ាត្រា) ម៉ាឡេស៊ី (កោះបារ៉ា កោះបរណេអូ) ថៃ ខាងជើងភូមា និងខាងកើត ប្រទេសឥណ្ឌា ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឈ្មួសប្រែងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូរ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៃ សៀវភៅក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ។ ប្រភេទនេះកំពុង រងគ្រោះពីការទាក់ទាញ និងបរាបាញ់ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។

Binturong

Arctictis binturong



© David Emmett CI



© WCS

ផ្នែកពោន ឬ ផ្នែកប្រុល

កំណត់: ផ្នែកពោនមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួនពី ៦៥០-១០៤០ម.ម ទម្ងន់ ៧-១៤គ.ក កន្ទុយ ១២០-១៧០ម.ម ជើងក្រោយ ១១៥-១៣៤ម.ម។ វាជាសត្វដែលមានមាឌធំ មានកន្ទុយខ្លី ជើងធំៗ និងមានក្រចកមាំកោងវែងពណ៌ស ច្រមុះរាងទ្រវែងដូចផ្នែក។ ជាទូទៅវាមានសម្បុរលឿងខ្លី ប្រផេះ ឬខ្មៅ ដែលប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាល ផ្នែកលើខ្នងមានពណ៌ក្រមៅជាងផ្នែកខាងក្រោម។ នៅលើក្បាលមានឆ្នុតពណ៌សចេញពីត្រចៀកកាត់តាមភ្នែករហូតដល់ចុងច្រមុះ និងមានឆ្នុតខ្មៅនៅសង្វាងភ្នែកដល់ត្រចៀក បន្ទាប់មកមានឆ្នុតសកាត់តាមថ្ពាល់ផ្នែកខាងលើ។ ទ្រូង និងត្រចៀកមានពណ៌ស។

ជីវសាស្ត្រ: ផ្នែកពោនជាសត្វរស់នៅតែលើដី តាមរូង ឬក្រហែងថ្ម និងរកស៊ីនៅពេលយប់។ វាមិនសូវពូកែភ្នែក និងត្រចៀកទេ តែវាប្រើច្រមុះហិតក្លិនច្រើនជាង។ ការរកចំណីចាប់ផ្តើមចេញនៅពេលព្រលប់ដែលអាហាររបស់វាគឺមើមរុក្ខជាតិ ឬសឈើ ជន្លេន សត្វល្អិត និងសត្វតូចៗ។ វាអាចមានកូនពី ២-៣ក្បាល។

រចនាសម្ព័ន្ធនៅ: ប្រភេទនេះមាននៅតាមតំបន់ព្រៃ ស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសគឺនៅភាគនិរតី ភាគពាយ័ព្យ និងភាគខាងជើងប្រទេស។ រចនាសម្ព័ន្ធនៅមានផងដែរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ឥណ្ឌូចិន ភូមា ថៃ និងកោះស៊ូម៉ាត្រា។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្នែកពោនជាប្រភេទស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយកម្រ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះតិចតួច។ ផ្នែកពោន កំពុងរងគ្រោះដោយសារការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ ដើម្បីយកសំណាកធ្វើអាជីវកម្ម ។

Hog Badger

Arctonyx collaris



© wcs



កិនភាគ: ឆ្នកមានរូបរាងតូចដែលមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួនពី ៣៣-៤៣ស.ម កន្ទុយសំពោងប្រវែងពី ១៥-២៣ស.ម និងមានទម្ងន់១-៣គ.ក នៅពេលពេញវ័យ ជើងរបស់វាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលប្រភេទសត្វជ្រូកពោន ។ វាមានជើងខ្លី ក្រព្យាធំ ក្រចកវែងងាយស្រួលក្នុងការកាយដី និងពូកែឡើងដើមឈើ ។ វាមានសម្បុរ ត្នោត ឬប្រផេះ ដោយមានរោមខ្លីៗនៅផ្នែកពោះ ។ វាមានក្បាលពណ៌ស មានស្នាមពណ៌ខ្មៅពេញផ្ទៃមុខរហូតដល់ច្រមុះ និងមានឆ្នុតខ្នងពណ៌សចាប់ពីក្បាលរហូតដល់គល់កន្ទុយ ។

ជីវសាស្ត្រ: ឆ្នកមានរស់នៅគ្រប់ប្រភេទព្រៃរហូតដល់វាលស្មៅ ។ វាជាសត្វរាត្រីចរ ប៉ុន្តែវាក៏មានសកម្មភាពពេលថ្ងៃផងដែរ ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី២-៣ម៉ោង ។ ប្រភេទនេះភាគច្រើនដេកពេលថ្ងៃនៅតាមរូងចាស់ៗ ។ ភាគច្រើនវារស់នៅលើដី ហើយពេលខ្លះវានៅលើដើមឈើផងដែរ ក្នុងពេលរកចំណី ។ ចំណីរបស់វារួមមាន សត្វល្អិត ខ្យងក្អក់ កណ្តុប ជន្លេន ចង្រិត កង្កែប គីងក់ ថ្លែន បង្កុយ សត្វស្លាប ផ្លែឈើ ។

របាយរស់នៅ: ឆ្នកមាននៅកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្រប និងមានវត្តមានផងដែរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រទេសនេប៉ាល់ ឥណ្ឌាភាគខាងត្បូង ភូមា ចិន វៀតណាម និងថៃ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឆ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LR/LC) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះ ដោយសារការទាក់ទាញ និងការទន្ទ្រានទីជម្រករបស់វា ។

Ferret badger

Melogale sp



© WCS



កំពឹងដូងអុជ

កិនភាគ: កំពឹងដូងអុជ គឺជាប្រភេទសំពោចដែលមានមាឌតូចជាងគេ នៅលើដងខ្លួនរបស់វាមានចំនុចខ្មៅៗជាច្រើនលាយចំរុះគ្នាជាមួយចំនុចពណ៌សស្រាល ហើយនៅលើកន្ទុយមានបង្កង់ពណ៌សខ្មៅ ចំនួន ៩ ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅតាមព្រៃតំបន់ភ្នំ និងខ្ពង់រាបដែលមានរយៈកម្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ ២០០០ម។ វាភាគច្រើនចូលចិត្តរស់នៅលើដើមឈើ និងរស់នៅតាមប្រហោងឈើ ហើយស៊ីសត្វស្លាបតូចៗជាអាហារ។ បើតាមសំដីរបស់លោក Hodon អោយដឹងថារយៈពេលបន្តពូជរបស់វាគឺនៅខែកុម្ភៈរហូតដល់ខែសីហា និងកើតកូនម្តងបានចំនួនពីរក្បាល។ សំពោចប្រភេទនេះគេមិននិយមយកមកចិញ្ចឹម ហើយវដ្តជីវិតក៏មិនទាន់បានគេកត់ត្រានៅឡើយដែរ។

របាយរស់នៅ: ប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទមានដោយកម្រ ប៉ុន្តែមានការកត់ត្រាបានបង្ហាញអោយឃើញថាប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅឧទ្យានជាតិគីរីរម្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រហែលជាមានវត្តមាននៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅតាមព្រៃស្រោងតំបន់ភ្នំ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ប្រភេទនេះស្ថិតនៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ នៃអនុសញ្ញា CITES និងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ។ កំពុងដូងអុជ កំពុងរងគ្រោះដោយសារ បាត់បង់ទីជម្រក ការបរបាញ់ និងការទាក់ទាញ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

Spotted Linsang

Prionodon pardicolor



© WCS Laos - Lao PDR/NEPL NPA

ស្ពាន់តូប

ភិនភាគ: ស្ពាន់តូបជាប្រភេទស្ពាន់ដែលមានមាឌតូច ខ្លួនទាំងមូលមានសម្បុរឆ្មោតចាស់ រឹងក្បាល ភាគច្រើនមានពណ៌ក្រហម ឬឆ្មោត។ រោមមានពណ៌ស និងខ្មៅឆ្លាស់គ្នាមួយៗ ជើងមានសម្បុរ ដូចខ្លួន ជួនកាលក្រម៉ៅជាន់ ហើយកន្ទុយមានប្រវែង២/៣នៃក្បាល-ដងខ្លួន ចំណែកឯសត្វញីមានដោះ ៣គូ។

ជីវសាស្ត្រ: ស្ពាន់តូបនេះចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃឈ្មោះ មាត់ស្ទឹង និងទន្លេក្បែរភូមិ និងគេតែងតែឃើញវាវាត់កាត់ផ្លូវនៅពេលថ្ងៃ។ សត្វនេះរកចំណីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅលើដី ហើយកម្រឡើងដើមឈើ ច្រមុះរបស់វាអាចស្រង់ក្លិនបានល្អ ហើយអាចតាមដានសត្វជាចំណីរហូតដល់រូង។ ចំណីរបស់វាមានដូចជា កណ្តុរ សត្វស្លាប កង្កែប ក្តាម សត្វល្អិត និងពស់វែក។ សត្វញីអាចកើតកូនបានពី ២-៤ក្បាល ហើយរយៈពេលពពោះគឺ ៦សប្តាហ៍។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទីជម្រកសមស្រប ប៉ុន្តែលើកលែងតែតំបន់ព្រៃស្រោង។ វាមានផងដែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កោះស៊ូម៉ាត្រា និងកោះបរណេអូ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្ពាន់តូបស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LC) ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច។

Small Asian Mongoose

Herpestes javanicus



© CI



ស្តារឡើងវិញ

កិច្ចការ: ស្តារឡើងវិញប្រភេទសត្វស្តារដែលមានមាឌធំ មានរោមវែងជាងស្តារតូច កន្ទុយខ្លី និងមានឆ្មាស្លេងច្រើនប្រភេទ។ រហូតដល់ស្តារ។ ចង្កាពណ៌ស កពណ៌ខ្មៅ ទ្រូងពណ៌ត្នោតចាស់ ពោះពណ៌ត្នោតខ្ចី។ សម្បុរខ្លួនទាំងមូលគឺប្រផេះ ឬត្នោតចាស់ ជើងទាំងបួនមានពណ៌ក្រហម។

ជីវសាស្ត្រ: ស្តារធំចូលចិត្តរស់នៅដោយឯកោ ហើយចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ វាអាចរស់នៅតាមតំបន់ជាច្រើនប្រភេទ។ ចំណីរបស់វាភាគច្រើនគឺ ក្តាម ត្រី កង្កែប និយាយរួមគឺសត្វតូចៗដែលរស់នៅអាស្រ័យនឹងទឹក ស្តារធំជាសត្វដែលអាចហែលទឹកយ៉ាងចំណាន។ សត្វនេះអាចរស់នៅបានដល់ ១០ឆ្នាំ។

របៀបរស់នៅ: ប្រភេទនេះមាននៅកម្ពុជាក្នុងជម្រកសមស្រប។ វាក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅភាគខាងកើត ប្រទេសឥណ្ឌា ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន តំបន់ដីគោកទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ស្តារធំស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្អួច ប៉ុន្តែប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រក និង ការទាក់ទាញ ដើម្បីធ្វើជំនួញ។

Crab-eating Mongoose

Herpestes urva



© L Bruce Kekule



ក្រមរក

OTTERS



សេចក្តីផ្តើម: រកបន្ស៊ាំជីវិតរស់នៅក្នុងទឹកយ៉ាងចំណាប់។ ពពួកនេះមានដៃជើងខ្លី ក្រចក និង កន្ទុយ ខ្លាំងក្នុងការហែលទឹក។ ពពួកនេះច្រើនរស់នៅក្នុងទឹក។ ចំណីរបស់វារួមមានត្រីគ្រប់ប្រភេទ ក្តាម ខ្យង និង សត្វដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងទឹក។ ពពួករកច្រើនរស់នៅជិតទឹក និង ហែលបាន ឆ្ងាយក្នុងពេលរកចំណីខុសប្លែកពីថនិកសត្វដទៃទៀត រកប្រើច្រមុះនិងរោមរបស់វាដើម្បីស្រង់ ក្លិនចំណី និងទាក់ទងគ្នា។

កេខ្លួនរលោង

ភិនភាគ: កេខ្លួនរលោងមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ៥២-៧៦ ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ៤០ ទៅ ៤៥ ស.ម និងមានទម្ងន់ពី ៧ ទៅ ១១ គ.ក។ វាមានទំហំ និងពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង កេក្បាលសំប៉ែតដែរ។ លក្ខណៈដែលខុសគ្នានោះត្រង់ថា កេខ្លួនរលោងមានដងខ្លួនរលោងរាបស្មើ និងមានកន្ទុយសំប៉ែត។ បំពង់ក បបូរមាត់លើ ថ្ពាល់ ក និងទ្រូងមានពណ៌លឿងស្រាល។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះមានរស់នៅតាមតំបន់ដីវាលទំនាបដូចជានៅតាមមាត់ពាមទន្លេ មាត់ទន្លេ ព្រៃកោងកាង ស្ទឹង បឹង និងអូរ។ កេខ្លួនរលោងនេះរស់នៅជាក្រុមគ្រួសារដែលមានមេបា និង កូនរបស់វាដូចប្រភេទភេដទៃទៀតដែរ។ ពួកវាតែងតែរួមគ្នាជាច្រើនក្រុមក្នុងការរកចំណី ដែលជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ មនុស្សជាញឹកញាប់តែងតែចិញ្ចឹមសត្វភេនេះ ដើម្បីអោយវា ចាប់ត្រី។ ចំណីអាហារ ទឹកន្លែងលាក់ខ្លួន និងការបន្តពូជមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹង កេក្បាលសំប៉ែតដែរ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៅ: ប្រភេទសត្វនេះមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តក្រចេះ ព្រៃកទាល់ (បំបន្លិយជីវៈ មណ្ឌលបឹងទន្លេសាប) និងកោះព្រែកនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី។ វាជាឃ្លីយៗត្រូវបានគេប្រទះ ឃើញផងដែរនៅតាមសួនសត្វ។ គេក៏បានរកឃើញវត្តមានវាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន និងឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់ជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កេខ្លួនរលោងជាប្រភេទមានដោយបង្កូរ និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះនៅលើពិភពលោក ដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញទីជម្រក ការបរបាញ់ ដើម្បីយកសំណាកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

Smooth-coated Otter

Lutrogale perspicillata



© David Emmett CI



© Allan Michaud

កេរោមច្រមុះ

ភិកភាគ: កេរោមច្រមុះមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ៥០-៨២ស.ម ប្រវែងកន្ទុយ ៤៥-៥០ស.ម និងមានទម្ងន់ពី ៥-៦គ.ក ។ វាមានទំហំតូចជាងកេរោមនរណាង និងកេរោមសំប៉ែត ។ នៅលើខ្នង មានពណ៌ត្នោត ហើយនៅសង្វាងខ្នង ពោះ និងទ្រូងមានពណ៌ព្រៃលែត ។ ចង្កា បបូរមាត់លើបំពង់កមានពណ៌ស ។ វាមានរោមនៅនឹងចុងច្រមុះ ។ កន្ទុយមានរាងមូល ។

ជីវសាស្ត្រ: វាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ដីសើមវាលទំនាបដូចជា ព្រៃកោងកាង ព្រៃ Melaluca ព្រៃវាលភក់ និងតំបន់ដីសើមលិចទឹក ។ ទោះបីជាវាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រភេទព្រៃទាំងអស់នេះ ក៏ដោយ ក៏នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រភេទនេះត្រូវបានកត់ត្រាពីវត្តមានរបស់វានៅរយៈកម្ពស់ រហូតដល់ ៥០០ម ផងដែរ ។

របាយរស់នៅ: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាមានវត្តមាននៅព្រៃកពាក់កន្ទេល(ខេត្តបាត់ដំបង) និងបឹងឆ្នា (ទន្លេសាបភាគឦសានខេត្តកំពង់ធំ) ។ វាក៏មានវត្តមាននៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដែរ ដូចជា នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី និងតំបន់ឆ្នេរជុំវិញ ស្រែអំបិល (ខេត្តកោះកុង) ។ ប្រភេទនេះក៏មានវត្តមាននៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសថៃ ម៉ាឡេស៊ី កោះស៊ូម៉ាត្រា និងកោះបរណេអូផងដែរ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: កេរោមច្រមុះស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ និងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (DD) ថាជាប្រភេទពុំមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ ។ កេរោមច្រមុះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការទាក់ទាញ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងបាត់បង់ទីជម្រក ។

Hairy-nosed Otter

Lutra sumatrana



© David Emmett CI

កេតុប

វិនិច្ឆ័យ: ភេតុចមានប្រវែងក្បាល-ដងខ្លួន ៤៥-៥៥ស.ម ប្រវែងកន្ទុយពី ២៥-៣៥ស.ម និងមានទម្ងន់ពី១-៣គ.ក។ វាជាប្រភេទភេដែលមានមាឌតូចជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមភេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ប្រផេះត្នោត ហើយផ្នែកពោះមានពណ៌សក្លី។ ចង្កា ថ្ពាល់ បំពង់កមានពណ៌ស។ ក្រព្យុរបស់វាខ្លីៗ ហើយមានម្រាមជើងជាប់គ្នាដោយភ្នាស (ដូចម្រាមជើងទា) ។

ជីវសាស្ត្រ: ប្រភេទនេះមានរស់នៅក្នុងទីជម្រកជាច្រើនចាប់ពីតំបន់ដីសើមរហូតដល់ស្ទឹង និងបឹង។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជាពូកសត្វសំបករឹង (ក្តាម លៀស ត្រី) និងត្រី។ វាបន្តពូជពីរដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយមានកូនម្តង ពី ១-២ក្បាល។ វាចូលចិត្តរស់នៅជាក្រុមដែលមានចំនួនរហូតដល់ ១២ក្បាល។

របាយរស់នៅ: ប្រភេទនេះមិនទាន់មានការកត់ត្រានៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។ វាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា (Assam) ប្រទេសនេប៉ាល់ និងតំបន់ខ្លះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ភេតុចជាប្រភេទមានដោយបង្អួច និងបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (NT) ជាប្រភេទជិតទទួលរងគ្រោះ នៅលើពិភពលោក។ ភេប្រភេទនេះ ក៏កំពុងរងគ្រោះដោយសារការទាក់ទាញ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការបាត់បង់ទីជម្រក។

Oriental Small-clawed Otter

Aonyx cinerea



© Julie Larsen Maher WCS



© David Emmett CI

ក្រុមមំសាសី (ខ្នា)

CATS



សេចក្តីផ្តើម: ក្រុមពពួកសត្វខ្នាទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Carnivora ។ ខ្នាដំបង(tiger) ជាប្រភេទសត្វដែលធំជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមពពួកសត្វមំសាសីទាំង ៨ប្រភេទ ខ្នាខិន ខ្នាពក ខ្នាឃ្លីងមាស ខ្នាភ្លឺថ្មកែវ ខ្នាត្រី ឆ្កាប្រៃ ឆ្កាដាវ ខ្នាដំបង ។ ខ្នាដំបងស្ថិតចុងខ្សែទៀតធ្វើជាអាហារ និងមានចរិតរស់នៅស្ងាត់ស្ងៀមតែឯងនៅក្រោយពេលពាក់គ្នារួច ។ ចំនួនសត្វខ្នាដំបងនៅក្នុង ព្រៃធម្មជាតិកំពុងថយចុះយ៉ាងខ្លាំង និងអាចឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជទាំងស្រុងដោយសារ ការបាត់បង់ជីវប្រភេទរស់នៅ ការថយចុះចំណីអាហារនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ការបរបាញ់ ការទាក់ ចាប់ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់គោលបំណងផលិតឱសថ ។ រីឯប្រភេទសត្វខ្នាដទៃទៀត ក៏កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នា និងខ្នាដំបងដែរ ។

ខ្នាត ឬ ខ្នាតបង

កិច្ចការ: ខ្នាតជាប្រភេទដែលមានមាឌធំជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមអំបូរឆ្មា និងងាយស្រួលចំណាំ។ វាមានសម្បុរក្រហម លឿង ឬត្នោតខ្លី មានឆ្នុតបង្កង់ពណ៌ក្រហមកាត់ទទឹងដងខ្លួន។ នៅផ្នែកខាងក្រោមចង្កា និងបំពង់កមានពណ៌ស។ កន្ទុយមានសម្បុរខ្មៅជាកង់ៗ និងខ្មៅផ្នែកខាងចុង។

ជីវសាស្ត្រ: ខ្នាតអាចរស់នៅក្នុងជម្រកគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានទឹក ចំណី និងម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ ព្រោះវាជាសត្វចាញ់កម្ដៅថ្ងៃ។ នៅពេលថ្ងៃក្ដៅខ្លាំង ខ្នាតចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីដេកត្រាំទឹក។ វាមានភាពស្ងាត់ជំនាញក្នុងការរំហែលទឹក ហើយវាមិនឡើងដើមឈើទេ បើសិនមិនចាំបាច់។ ខ្នាតអាចចាប់ចំណីបាន ចាប់ពីសត្វតូចរហូតដល់សត្វធំបាន (ប្រើស ទន្សោង ខ្នឹង)។ ខ្នាតអាចបង្កាត់ពូជបានគ្រប់រដូវ។ វាអាចបង្កើតកូនបានពី ១-៧ ក្បាលបន្ទាប់ពី ពពោះរយៈពេលប្រហែល ១០០ ថ្ងៃ។ វាអាចមានអាយុរហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំក្នុងធម្មជាតិ។ ប្រភេទនេះចូលចិត្តដើរតាមដងផ្លូវដែលទើបតែ ឈូសឆាយរួច ឬផ្លូវស្រឡះក្នុងព្រៃ។

របាយការណ៍នៅ: ខ្នាតជាប្រភេទសត្វដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បំផុត ដោយការបរបាញ់ ដើម្បីពាណិជ្ជកម្មឆ្អឹង និងស្បែក។ វត្តមានរបស់វាមាននៅសេសសល់កម្របំផុតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដូចជាភូមិភាគពាយ័ព្យសាន និរតី និងខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រភេទនេះបានរកឃើញនៅប្រទេសបង់ក្លាដេស ឥណ្ឌា តំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ចំនួននៃប្រភេទនេះបានផុតពូជនៅកោះបាលី ចាវ៉ា និងប្រទេសសិង្ហបុរី ហើយចំពោះវត្តមានតំបន់ផ្សេងៗទៀតកំពុងតែថយចុះយ៉ាងខ្លាំង និងឈានទៅរកការផុតពូជ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្នាតស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ យកឆ្អឹង ស្បែក ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាឱសថបុរាណ។ ខ្នាតត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ (EN) ។

Tiger

Panthera tigris



© WCS



© Allan Michaud

ខ្នាតទី១

ភិនភាគ: ខ្នាតទី១ជាអំបូរឆ្នាំដែលមានមាតិកាដ៏លំដាប់ទី២បន្ទាប់ពីខ្នាតទី២។ សត្វឈ្មោលអាចមានទម្ងន់ ៥៥គ.ក និងញីទម្ងន់ ៣០គ.ក។ ខ្នាតទី១មានភិនភាគងាយចំណាំណាស់ គឺមានពណ៌លឿងក្រហម ត្នោត និងមានអុថ្ងា ពណ៌ខ្មៅជាកញ្ចុំនៅពាសពេញខ្លួន ពេលខ្លះហៅថា “Black Panther” ដែលមានរូបរាងពណ៌ខ្មៅ។

ជីវសាស្ត្រ: ខ្នាតទី១រស់នៅក្នុងព្រៃស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីព្រៃស្រោងរហូតដល់ព្រៃកម្តៅដែលមានផ្ទាំងថ្ម។ វាជាសត្វរហ័សរហួន និងចូលចិត្តឡើងដើមឈើដែលជាជំនាញពិសេសរបស់វា។ វាពុំសូវចាញ់កម្លោះថ្លៃថ្លៃខ្លាំងទេ ហើយអាចរស់នៅឆ្ងាយពីទឹកបានឡើយផង។ បើទោះជាវាអាចហែលទឹកបានក៏ដោយ ក៏វានៅតែព្យាយាមគេចចេញពីតំបន់ទឹកដែរ។ ចំណីរបស់វាមានពពួកប្រើស ឈ្នួស ជ្រូកព្រៃ ស្វា សត្វស្លាប សត្វកក្រើ និងសត្វល្អិត ហើយជារឿយៗវាចាប់ចំណី ដោយលោតកម្រិតពីលើដើមឈើរួចទាញសត្វនោះឡើងដើម្បីស៊ី។ វាចូលចិត្តកំណើតឯង និងជាសត្វរាត្រី។ វាដើរជាតួតែក្នុងរដូវបន្តពូជ។ ខ្នាតទី១អាចបង្កើតកូនបានពី ១-៤ ក្បាល បន្ទាប់ពីពពោះអស់រយៈពេល ៩០-៩៥ថ្ងៃ កូនរស់នៅជាមួយមេរហូតដល់អាយុ ១-២ឆ្នាំ។

របាយរស់នៅ: វាមានតិចតួចតាមតំបន់នានាដូចជា ភូមិភាគឦសាន និរតី និងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ របាយមានច្រើននៅអាហ្សិក អាស៊ីភាគខាងត្បូង រួមទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកោះបារ៉ា។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្នាតទី១ ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ និងស្ថិតក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ ប្រភេទនេះ កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ ទាក់ចាប់ ដើម្បីយកស្បែក ឆ្អឹង សំណាករបស់វាធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការបាត់បង់ទីជម្រកដែលវាធ្លាប់រកចំណី និងរស់នៅ។ ខ្នាតទី១ត្រូវបានអង្គការ IUCN ចាត់ចូលក្នុងបញ្ជីក្រហម ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រជួបប្រភេទខ្លះនេះណាស់។

Leopard

Panthera pardus



© WCS



© Allan Michaud

ខ្នាត៣ក

កំណត់: ខ្នាតពកមានមាឌធំជាងខ្នាតតូចកែវ មានសម្បុរពណ៌ក្រមៅប្រផេះ នៅលើដងខ្លួនមានផ្ទាំងៗ ដូចពកធំៗ នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ទាំងនេះមានពណ៌ខ្មៅខ្លាំងណាស់ដូចជាដំណាក់ដំណាក់នីមួយៗ ។ ដុំផ្ទាំងនេះរីកចំរើននៅផ្នែកខាងក្រោយស្មា ដែលចាប់ផ្តើមពីលើខ្នងរហូតស្ទើរដល់ក្រោមពោះ ។ ច្រមុះមានពណ៌ស និងនៅលើថ្ពាល់មានស្នាមអុចតូចៗ ។ វាមានកន្ទុយវែង អុចៗនៅផ្នែកខាងគល់ និងបន្ទះៗនៅផ្នែកចុង ។ វាមានជើងខ្លី ប្រអប់ជើងធំងាយស្រួលក្នុងការប្រតោងមែកឈើ ។ ខ្នាតពកងាយក្នុងការចំណាំណាស់ គឺយើងត្រាន់តែក្រលេកមើលនៅលើដងខ្លួនរបស់វាមានផ្ទាំងស្រស់ស្អាតដូចដុំពករាយពាសពេញដងខ្លួន ។

ជីវសាស្ត្រ: ខ្នាតពកចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃចម្រុះ ។ ខ្នាតពកជាសត្វរាត្រីចរ ច្រើនរស់នៅជាក្តួលលើដើមឈើ ។ ជាធម្មតាវាចាប់ចំណីដោយលោតពីលើដើមឈើសង្របលើសត្វនៅដី ដូចខ្លាខិនដែរ ។ អាហាររបស់វាមាន បក្សី ពស់ ជ្រូកព្រៃ ឈ្នួស ប្រើស ស្វាជាដើម ។ ខ្នាតពកប្រើក្រព្យុំជើងមុខមុតសំរាប់សង្កត់ចាប់ចំណី រួចទើបខាំជាក្រោយ ។ ខ្នាតពកអាចបង្កើតកូនម្តងបានពី២-៤ ក្បាល បន្ទាប់ពីពោះអស់រយៈពេលប្រហែល៩០-៩៥ថ្ងៃ ។

របាយការណ៍: ខ្នាតពកមាននៅភូមិភាគឦសាន និរតី និងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ វាត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេស ប៊ុយតាន ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី (កោះស៊ូម៉ាត្រា) ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាវ៉ាវ៉ា ភូមា នេប៉ាល់ ថៃ និងប្រទេសវៀតណាម ខ្លាចនេះបានផុតពូជនៅប្រទេសបង់ក្លាដេស សិង្ហបុរី និងតៃវ៉ាន់ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្នាតពក ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស ។ ប្រភេទនេះទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារការបរបាញ់ និងការបាត់បង់ទីជម្រកដែលវាធ្លាប់ស្វែងរកចំណី និងរស់នៅ ។ ខ្នាតពកត្រូវបានចាត់ចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU) នៅក្នុងពិភពលោក ។

Clouded Leopard

Neofelis nebulosa



© WCS/WWF



© WWF

ខ្លាភ្លឺថ្មកែវ

ភិក្ខុភាគៈ ខ្លាភ្លឺថ្មកែវមានមាឌមធ្យម ដងខ្លួនវែង ត្រចៀកមូល និងមានកន្ទុយវែងសំពោង សម្បុរ ដី ផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមមានពណ៌ត្នោតខ្ចី ជាពិសេសនៅលើដងខ្លួនមានស្នាមអុចៗ តូច-ធំ រាយប៉ាយ ។ នៅលើ ក និងខ្នងមាន ឆ្នុតពណ៌ខ្មៅ ។ នៅលើជើង និងកន្ទុយមានស្នាមអុចៗពណ៌ខ្មៅ និង ស្នាមអុចធំៗនៅត្រចៀក ប៉ុន្តែមានទំហំតូចជាងខ្លាពពក ។

ជីវសាស្ត្រៈ វាស់នៅតំបន់ព្រៃខ្ពស់ៗ និងព្រៃក្រោយពីធ្វើអាជីវកម្ម ជាធម្មតាប្រភេទសត្វនេះ ចេញរកស៊ីនៅពេលយប់ និងនៅលើដើមឈើ ។ អាហាររបស់វាគឺ ត្រកូត អន្ស៊ង កំប្រុក រញ្ជី ស្លាកណ្តុរ ទន្សាយ ។

របាយរស់នៅៈ នៅកម្ពុជាប្រភេទនេះត្រូវបានកត់ត្រាជាលើកដំបូងដោយម៉ាស៊ីនថតស្វ័យ ប្រវត្តិក្នុងស្រុក កែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគីរី និងមានទិន្នន័យផងដែរនៅឧទ្យានជាតិបូកគោ ឧទ្យាន ជាតិវិរៈជ័យ ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច និងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញភាគកណ្តាល ។ វាជាប្រភេទមាន ដោយកម្រស្ថិតនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ កោះស៊ូម៉ាត្រា និងកោះបរណេអូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ខ្លាភ្លឺថ្មកែវ ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស ។ គេកម្រឃើញប្រភេទនេះបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិណាស់ ខ្លាភ្លឺថ្មកែវកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ពីការបរបាញ់ និងបាត់បង់ទីជម្រកដែលវាធ្លាប់រកចំណី និងរស់នៅ ។

Marbled Cat

Pardofelis marmorata



© WWF



© WCS

ខ្លាឈ្លើងមាស

កិច្ចការ: ខ្លាឈ្លើងមាសជាប្រភេទសត្វធំជាងគេក្នុងចំណោមត្រកូលខ្លាតូចៗ។ វាមានសម្បុរ ត្នោតឈ្លើងទៅ ត្នោតប្រផេះ វាពុំមានស្នាមអុច និងឆ្អួតនៅលើដងខ្លួនទេ ប៉ុន្តែនៅលើផ្ទៃមុខវា មានសម្គាល់ខ្សែពណ៌ព្រលែតខ័ណ្ឌដោយសម្បុរខ្មៅចាប់ពីថ្ពាល់ កាត់តាមក្បែរភ្នែក រហូតដល់ ផ្នែកខាងលើ។ ផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះមានពណ៌ព្រលែតជាងផ្នែកខាងលើនៃដងខ្លួន។

ជីវសាស្ត្រ: ខ្លាឈ្លើងមាសរស់នៅក្នុងព្រៃជម្រុះស្លឹក និងតាមព្រៃស្រោងផងដែរ។ ជាធម្មតា វាជាសត្វដើរលើដី ប៉ុន្តែវាអាចឡើងដើមឈើបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលមានអាសន្ន។ អាហាររបស់វាមាន ទន្សាយ ក្តាន់ញ្ជ័ង សត្វស្លាប ជាពិសេសពពួកមាន់ទោ ត្រកូត អន្សង និង សត្វតូចៗដទៃទៀត។ ជាធម្មតាវាចាប់អាហារជាតូ និងមានសកម្មភាពទាំងថ្ងៃទាំងយប់ វា បង្កើតកូនក្នុងរន្ធឈើ រូងដី រឺក្នុងចន្លោះផ្ទាំងថ្មជាដើម។ វាអាចបង្កើតកូនបានពី ១-២ក្បាល បន្ទាប់ពីពោះបានប្រហែល ៩០ថ្ងៃ។ សត្វឈ្មោលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាកូន និងនៅជា មួយមេក្នុងកំឡុងមេមានកូន។ បើសិនជាកូនបាត់បង់ទៅ មេអាចបន្តពូជបានក្នុងរយៈពេល ៤ខែបន្ទាប់។

របាយរស់នៅ: ខ្លាឈ្លើងមាសជាប្រភេទសត្វកម្រ និងទទួលការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំង។ វាមាននៅតំបន់ ភូមិភាគខាងជើង ភូមិភាគនិរតី និងឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា។ តែក៏ជួបប្រទះ វាផងដែរនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌា រហូតដល់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន តំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ និងកោះស៊ូម៉ាត្រា។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្លាឈ្លើងមាស ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ និងមានចុះក្នុងបញ្ជី ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ និងទាក់ចាប់ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រភេទនេះត្រូវបានអង្គការ IUCN ចាត់ចូលក្នុងបញ្ជីក្រហម ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU) ។

Asian Golden Cat

Catopuma temminckii



© WCS



© CI

ខ្នាត្រី

កិនភាគ: ខ្នាត្រីមានសម្បុរពណ៌ប្រផេះ រោមទន់មានស្នាមអុចៗ ជើងខ្លី ត្រចៀកខ្លី មានស្នាមអុចតូចៗនៅពីលើស្លឹកត្រចៀក។ ក្បាលមានរាងវែងស្តួច កន្ទុយខ្លីជាងក្បាល-ដងខ្លួនរោមទន់មានស្នាមអុចៗ រាងឆ្នុតខ្លីនៅលើខ្នង។ កន្ទុយមានសម្បុរប្រផេះ មានអុចខ្លៅៗផ្នែកខាងគល់ និងមានបង្កង់ខ្លៅផ្នែកខាងចុង។ ថ្ពាល់ និងក្តោង ច្រមុះមានពណ៌ប្រផេះ ដែលមានឆ្នុតពីរចាប់ពីភ្នែកមកក្រោមត្រចៀក។

ជីវសាស្ត្រ: ខ្នាត្រីចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃគម្លាត និងព្រៃឈ្មោះក្បែរទឹក ដែលនៅទីនោះវាអាចចាប់ត្រី ក្តាម បក្សី គ្រុំ និងសត្វដទៃទៀតបាន។ វាអាចចាប់ត្រីដោយក្រាបលើផ្ទាំងថ្មដែលលយចូលក្នុងទឹក ហើយយកក្រញាំជើងរបស់វាចូកបាចត្រីឡើងមកគោក ពោលគឺវាមិនចុះក្នុងទឹកចាប់ត្រីដូចសត្វភេទទេ។ វាអាចបង្កើតកូនបានពី ២-៣ក្បាល បន្ទាប់ពីពពោះអស់រយៈពេលពី ៩០-៩៥ ថ្ងៃ ហើយកូនវាអាចបន្តពូជបាននៅអាយុ ៨ខែកន្លះ ។

របាយរស់នៅ: ខ្នាត្រីជាប្រភេទមួយមានជាមធ្យម វាស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសនៅតំបន់ភូមិភាគឦសាន ខាងជើង និងនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ គេបានរកឃើញវាផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌា រហូតដល់តំបន់ភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមទាំងកោះស៊ូម៉ាត្រា ចាវ៉ា ភូមា ភាគកណ្តាលប្រទេសថៃ និងឥណ្ឌូចិន។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្នាត្រី ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កូវ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ (VU) ។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ និងទាក់ចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ។

Fishing Cat

Prionailurus viverrinus



© Allan Michaud



© Annette Olsson CI

ឆ្នាំព្រៃ

វិភាគ: ឆ្នាំព្រៃមានមាឌធំជាងឆ្នាំស្រុក មានត្រចៀកខ្ពស់ត្រង់ឡើងលើ និងមានកន្ទុយបង្កង់ ក្រមៅហើយ ចុងកន្ទុយមានពណ៌ខ្មៅ។ ដងខ្លួនពណ៌ប្រផេះ ឬត្នោតលឿង ផ្នែកពោះរាងព្រលែត និងមានរោមវែងជាង។ កន្ទុយរបស់វាខ្លីជាងប្រវែងដងខ្លួន និងក្បាល។

ជីវសាស្ត្រ: ឆ្នាំព្រៃចូលចិត្តរស់នៅតាមវាលស្មៅក្រាស់ខ្ពស់ៗ ព្រៃឈ្លោះ ព្រៃគម្ពោត និងតាម ដងអូរ។ គេពុំដែលបានជួបប្រទះវានៅព្រៃស្រោងក្រាស់ទេ។ វាជាសត្វរស់នៅលើដី និងកម្រ ឡើងលើដើមឈើណាស់។ ឆ្នាំព្រៃចូលចិត្តចាប់ចំណីដូចជាពូជសត្វកក្រើរ ត្រកួត កង្កែប បក្សី ជាដើម។ វាមានពោះរយៈពេលពី ៦៥-៦៧ថ្ងៃ ហើយអាចមានកូនពី ២-៥ ក្បាល។

របៀបរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រភេទនេះត្រូវបានកត់ត្រាជាលើកដំបូងដោយម៉ាស៊ីន ថតស្ទើរប្រវត្តិក្នុង ស្រុកវែបខេត្តព្រះវិហារ ហើយក៏ជាលើកដំបូងដែរនៅឥណ្ឌូចិន។ វត្តមានរបស់ វាត្រូវបានកត់ត្រានៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៃខេត្តកំពង់ចាម សៀមរាប ហើយភាគច្រើនមាន សម្បូរនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី និងព្រះវិហារនៅតំបន់វាលស្មៅ តំបន់ព្រៃឈ្លោះ។ គេបានរកឃើញផង ដែរថាប្រព័ន្ធជីវចម្រុះបូព៌ាហូតដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឆ្នាំព្រៃ ស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC)។ ប្រភេទនេះត្រូវបានថយចុះនៅក្នុងតំបន់ជា ច្រើននៅលើពិភពលោក ដោយសារការបរបាញ់ ការទាក់ទាប និងការបាត់បង់ទីជម្រក។

Jungle Cat

Felis chaus



ប្រាជ្ញា

ភិកភាគ: ឆ្នាំដាវមានសម្បុរលឿង-ត្នោត លាយជាមួយរោមអុចៗពណ៌ខ្មៅដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ២,៥សម ឬលើសពីនេះ និងមានឆ្នុត ៤-៦ សម្បុរត្នោតចាស់ចាប់ផ្តើមចេញពីលើក្បាល និង ផ្នែកខាងក្រោយនៃករបូតដល់ស្មា។ ផ្នែកចំហៀង និងជើងទាំង៤មានដុំអុចៗក្រមៅចាស់ក្នុងទំហំ និងរាងខុសៗគ្នា។ កន្ទុយមានលាយរាយពណ៌ខ្មៅ អុចៗក្នុងទំហំខុសៗគ្នាចាប់ពីគល់កន្ទុយរហូតដល់ចុង។ ផ្នែកខាងក្រោយ និងក្រោមភ្នែកមានឆ្នុតក្រមៅ ខ័ណ្ឌចែកដោយបន្ទះពណ៌ស។

ជីវសាស្ត្រ: ឆ្នាំដាវរស់នៅក្នុងព្រៃស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ ព្រមទាំងព្រៃដាំ។ វាមិនកាចសាហាវចំពោះមនុស្សទេ ហើយជាធម្មតា គេអាចជួបប្រទះវានៅក្បែរៗភូមិ។ អាហាររបស់វាមាន បក្សី សត្វកករ ត្រកូត អន្ស៊ូង ក្តាន់ព្យែងជាដើម។ វាអាចចាប់ចំណីបានដោយសារការលោតចុះសង្ក្រប់ពីលើដើមឈើទៅលើចំណីរបស់វា។ វាជាសត្វពូកែហែលទឹកណាស់។ វាអាចបន្តពូជបានពេញមួយឆ្នាំ រយៈពេលពេញពី ៦៥-៧២ថ្ងៃ អាចមានកូនម្តងពី ១-៤ក្បាល។ កូនរបស់វាអាចបើកភ្នែកបានក្នុងរយៈពេលប្រហែល ១០ថ្ងៃ ក្រោយពេលកើត។ កូនរបស់វាអាចបន្តពូជបាននៅអាយុ ១៨ខែ និងអាចរស់បានពី ១២-១៣ឆ្នាំ។

របាយរស់នៅ: ឆ្នាំដាវមាននៅភាគឦសាន និងនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ គេបានរកឃើញផងដែរនៅប្រទេសនេប៉ាល់ ឥណ្ឌា (ភាគខាងជើង) រហូតដល់ភាគខាងកើតប្រទេសចិន តំបន់ស៊ីបេរី និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមទាំងកោះស៊ូម៉ាត្រា ថាវ៉ា និងបរណេអូ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឆ្នាំដាវស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយចង្អុល និងមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច (LC) ។ ឆ្នាំដាវកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការខ្វះចំណីការទាក់ទាញ និងស្ថានភាពបំផ្លាញទីជម្រកដែលវាធ្លាប់រស់នៅ និងស្វែងរកចំណី។

Leopard Cat

Prionailurus bengalensis



© Allan Michaud



© wcs



ELEPHANT



សេចក្តីផ្តើម: ដំរីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងដំរីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកទាំងពីរ ក្រុមស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ Proboscidea ថ្មីៗនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការរកឃើញ ប្រភេទដំរីមួយទៀតដែលមានរូបរាងតូចជាងដំរីអាស៊ី ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សា ស្រាវជ្រាវអំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងដំរីទាំងពីរប្រភេទ ព្រោះប្រភេទដំរីថ្មីមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ នៅចន្លោះក្រុម mammoths និង mastadons ។

កំណត់: ដីជាប្រភេទសត្វតូចៗដែលមានមាត់ជាងគេបំផុត។ វាមានប្រមាណរឹងមានស្បែកក្រាស់ពណ៌ប្រផេះ និងមានរោមរឹងៗ ស្លឹកត្រចៀកមានរាងដូចផ្ចិតតែស្តើង ដីមានក្រចកម្រាមជើង ១៨ គឺនៅជើងមុខនីមួយៗមានក្រចកម្រាមជើង ៥ ឯក្រចកជើងក្រោយនីមួយៗមានម្រាម៤ តែមានដីខ្លះមានក្រចកម្រាមជើងដល់ទៅ ២០ដែរ។ ដីញី មានភ្នក "ចៃ" ដែរ តែវាមិនបញ្ចេញឱ្យឃើញច្បាស់ដូចដីឈ្មោលពេញវ័យទេ។ ភ្នកដីរង ឈ្មោលមួយចំនួនមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ ១ម៉ែត្រ។ ដីនៅតំបន់អាស៊ីខ្ពស់ពីដីនៅតំបន់អាហ្វ្រិក ដោយសារមាត់ និងស្លឹកត្រចៀកមានទំហំតូចជាង។ ដីអាស៊ីមានខ្លួនស្ទើររាបស្មើ ឯដីអាហ្វ្រិកមានខ្លួនកោងជាទូលខ្ពស់ឡើងលើ។

ជីវសាស្ត្រ: ដីច្រើនរស់នៅតាមព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ ព្រៃឫស្សី ព្រៃជាំទឹក តាមដងអូរ ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃស្រោង។ វាស៊ីតំបន់កំណើន ស្លឹកឈើ មើមឈើ ឫសឈើខ្លីៗ ទំពាំងឫស្សី ផ្កា និងវល្លិជាដើម។ ចំពោះការចិញ្ចឹមក្នុងសត្វ ដីអាចស៊ីផ្លែឈើ អំពៅ ចេក។ល។ វាផឹកទឹករហូតដល់ ២០០លីត្រ ក្នុងមួយថ្ងៃ (នៅកន្លែងសំបូរទឹក)។ ដីច្រើនផ្តល់កំណើតកូនក្នុងខែកក្កដា-សីហា កូនម្តងបាន១ក្បាល រីឯភ្លោះក៏មានដែរ ប៉ុន្តែកម្រណាស់ បន្ទាប់ពីពោះរយៈពេល២១ខែ (យូរបំផុត២៥ខែ)។ ដីមេអាចបង្កើតកូនបាន ៤ ឬ៥ដង ហើយអាចមានកូនរហូតដល់អាយុ ៥០-៧០ឆ្នាំ។ គេអាចសម្គាល់ដីឈ្មោលចុះប្រេងនៅពេលដែលគេឃើញមានសារធាតុរាវម្យ៉ាងហូរចេញពីរន្ធមួយនៅចន្លោះត្រចៀក និងភ្នែក ដែលជាទូទៅនៅចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូ។

របៀបរស់នៅ: ដីមានតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាកូមភាគព្រៃសាន និរតី និងភូមិភាគខាងជើង។ ដីមានរបៀបប្រទេសឥណ្ឌា រហូតដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ កោះស៊ូម៉ាត្រា និងនៅភាគខាងជើងនៃកោះបរណេអូ។ ចំនួនសត្វដីបានថយចុះដោយសារការប្រមាញ់យកភ្នក និងការបាត់បង់ទីជម្រក។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ដីជាប្រភេទជិតផុតពូជ និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (EN) ជាប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោក។ ដីនៅអាស៊ីត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។

Asian Elephant

Elephas maximus



© WWF

រមាស

RHINOCEROS



សេចក្តីផ្តើម: រមាសកុយមួយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Perissodactyla ។ នៅក្នុងកំណត់ត្រា
នៃឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ។ រមាសកុយមួយធ្លាប់មាន វត្តមានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែនា
ពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទនេះប្រហែលជានាសផុតពូជទៅហើយ ព្រោះពុំមានការកត់ត្រា និងការ
ស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃប្រភេទនេះប្រាកដនៅឡើយ ។

រមាសកុយមួយ

កិនភាគ: រមាសកុយមួយមានលក្ខណៈខុសពីរមាសកុយពីរ ដោយសារវាមានទំហំធំជាង ហើយមានស្បែកក្រាស់រលីងពណ៌ប្រផេះរាងជាផ្ចិតៗចំនួន៣ផ្ទាំងពេញលើខ្នង ដែលផ្ចិតទី១ ស្ថិតនៅខាងក្រោយក ផ្ចិតទី២នៅផ្នែកខាងក្រោយស្មា និងផ្ចិតទី៣នៅលើត្រភាក។ វាមានកុយមួយប្រវែងមិនលើសពី ១៥ ស.ម នៅលើខ្នងច្រមុះ។ ជើងនីមួយៗមានប្រមាណ៣ ដានជើងរមាសពេញវ័យមានទំហំ ២១ ស.ម ឬលើសពីនេះ។

ជីវសាស្ត្រ: រមាសរស់នៅតាមទីជម្រកដែលមានព្រៃក្រាស់ៗ ជាទូទៅវាចូលចិត្តរស់តាមតំបន់ទំនាបសំបូរទៅដោយភក់ដើម្បីនឿយលេង និងតំបន់មានទឹក។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជា ពន្លកឈើដែលដុះចេញពីដី មែកឈើតូចៗ ស្លឹកឈើខ្ចីៗ និងផ្លែឈើដែលជ្រុះ។ វាជាសត្វចូលចិត្តរស់នៅតែងកង ហើយវារស់នៅជាកូននៅពេលរដូវបន្តពូជ។ រមាសផ្តល់កំណើតកូនម្តងបានមួយបន្ទាប់ពីពេញរយៈពេល១៦ខែ ហើយកូនបំបៅដោះមេរហូតដល់អាយុ ២ឆ្នាំ។

របាយរស់នៅ: រមាសមាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរមកហើយ ក្រុមស្រាវជ្រាវ និងអភិរក្សកំពុងតែស្វែងរកពីវត្តមានពិតរបស់វានៅតាមបណ្តាភូមិភាគមួយចំនួន ដែលមានទីជម្រកសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់វា។ សព្វថ្ងៃប្រភេទនេះវាមានផងដែរ នៅប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូង និងនៅកោះចាវភាគខាងលិច។ ការប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយបំផុតអំពីចំនួនរមាសកុយមួយនៅសល់តិចជាង ១០០ក្បាល (Foose and Van Strien 1997) ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: រមាសកុយមួយជាប្រភេទកម្របំផុត និងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (CR) ជាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតលើពិភពលោក។ ក្នុងចំណោមថ្នាក់សត្វ ប្រភេទនេះត្រូវបានគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោក ដោយសារការបំផ្លាញទីជម្រក និងការបរបាញ់ដើម្បីតម្រូវការអាជីវកម្មនាំចេញទៅប្រទេសចិន និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតសំរាប់ផលិតជាឱសថ។

Lesser One-horned Rhinoceros

Rhinoceros sondaicus



© WWF

ក្រុមតិណាសីថ្នាក់តូច

DEER



សេចក្តីផ្តើម: ក្រុមឆ័ត្តតិណាសីស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Artiodactyla ។ ពពួកនេះចូលចិត្តស៊ីត្រួយរុក្ខជាតិ ស្លឹកព្រិច ផ្លែឈើដែលទុំជ្រុះ និងផ្សិតដែលដុះនៅលើសំបកឈើនានានៅក្នុងព្រៃឈ្មោះ និងទីជម្រកផ្សេងទៀត។ នៅប្រទេសកម្ពុជាពពួកតិណាសីមានរបាយរស់នៅស្ទើរគ្រប់តំបន់ព្រៃ។ ប្រភេទខ្លះមានសក្តានុពលបន្តពូជបានលឿន និងឆាប់ផ្តល់កំណើតកូន។ ប៉ុន្តែជាអកុសលពពួកនេះងាយរងគ្រោះថ្នាក់ពីការបរបាញ់ និងទាក់ចាប់ដើម្បីយកស្បែង និងសាច់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

ក្ដាន់ព្រឺងតូច ឬ ជួងតូច

កំណត់: ក្ដាន់ព្រឺងតូចជាថ្នាំសត្វដែលមានមាឌតូចជាងគេបំផុតក្នុងត្រកូលក្រចកជំពាម និង ក្ដាន់ស្នែង។ នៅលើដងខ្លួនពាសទៅដោយរោមពណ៌ត្នោត និងមានឆ្នុតសណ្ឋាននៅក្រោមក។ ជើងមានទំហំធំជាងម្រាមដៃមនុស្សពេញវ័យបន្តិច និងមានជើងក្រោយវែងជាងជើងមុខ។ ផ្នែកខាងក្រោមនៃដងខ្លួនមាន ពណ៌ស ឬព្រលៃត។

ជីវសាស្ត្រ: វាជាសត្វរស់នៅតែឯកឯង លើកលែងតែក្នុងរដូវបន្តពូជទើបវាវល់នៅជាកូន។ ជម្រកដ៏ល្អប្រសើរនៃសត្វនេះគឺចូលចិត្តរស់នៅតាមរន្ធលើ ក្រហែងថ្ម វាអាចរស់នៅតាមព្រៃឈើញឹកចង្អៀត ឬព្រៃឫស្សីដែលត្រជាក់ហើយងងឹត។ វាជាសត្វរាត្រីចរ ចំណីអាហាររបស់វា គឺឆ្កែក រុក្ខជាតិ គ្រួស ឆ្កែឈើ ផ្កា ផ្លែឈើ និងទំពាំងប្លូស្សី។ ជាធម្មតា សត្វនេះធ្វើចលនាលោតត្រឹកៗ ផ្លោះយ៉ាងរហ័សនៅពេលមានអាសន្នតែក្រោយពីរត់បានបន្តិចតែងឈប់ញឹកញាប់ ហើយពិនិត្យមើលស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនវា។ ក្នុងការទាក់ទងគ្នា ក្ដាន់ព្រឺងតូច តែងគោរពជើងក្រោយលើដី ឬអង្កត់ឈើយ៉ាងរហ័សជាសញ្ញាសម្គាល់។ សត្វនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតកូន ក្រោយពីបានពពោះរយៈពេល១៤០-១៧០ថ្ងៃ បង្កើតកូនបានមួយ ជួនកាលអាចភ្លោះតែមានដោយកម្រ។

របាយរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង។ វាមាននៅតាមវាលស្មៅនៅផងដែរ នៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន និងកោះបរណេអូ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ក្ដាន់ព្រឺងតូចស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយបង្អួរ។ ប្រភេទនេះងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ ឬការបណ្តើរឆ្កែទាក់ចាប់ដើម្បីយកសាច់ធ្វើជាអាហារនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារពពួកសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជា ប្រភេទអាស្រ័យលើកិច្ចអភិរក្សនៅតាមតំបន់ជាក់លាក់ដែលវាវល់នៅ (LR) ។

Lesser Oriental Chevrotain

Tragulus javanicus



© Allan Michaud

ក្ដាន់

វិភាគ: ក្ដាន់មានរូបរាងតូចជាងសត្វប្រើស មានពណ៌ប្រផេះចាស់ ឬឆ្នោតលឿង ហើយពណ៌ប្រែប្រួលទៅតាមរដូវ។ វាមានចុងកន្ទុយពណ៌ស និងមានទម្ងន់ជាមធ្យម៥០គីឡូក្រាម។ ក្ដាន់ឈ្មោលមានស្នែងប្រហាក់ប្រហែលស្នែងសត្វប្រើស តែតូច និងខ្លីជាង ហើយរលោងជាង។ កូនក្ដាន់មានសម្បុរសអុចៗជាជួរ និងជួនកាលអុចៗនេះនៅមានរហូតដល់ពេញវ័យ។

ជីវសាស្ត្រ: សត្វក្ដាន់មានទម្លាប់រស់នៅតាមជ្វាយព្រៃបោះ ក្នុងវាលទំនាបល្អាប់ភក់ ឬតាមតំបន់មានដំណុះរុក្ខជាតិសងខាងទន្លេ ពិសេសជិតតំបន់វាលភក់ដែលមានដើមត្រែង និងស្មៅខ្ពស់ៗ។ ជារឿយៗ សត្វនេះរស់នៅជាកូញី-ឈ្មោល តែអាចផ្ដុំគ្នាជាហ្វូងពី ១០-១៥ក្បាល។ សត្វក្ដាន់ចូលចិត្តស៊ីល្អៀងរុក្ខជាតិ និងត្រួយខ្លីដែលមានដូចជា ត្រែង ស្មៅ វល្លិ៍ក្រព្យាញ់ ស្លឹក ខ្ញុំជាដើម។ សត្វឈ្មោលជម្រុះស្នែងនៅក្នុងអំឡុងខែមករា-មីនា ហើយស្នែងខ្លី (ស្នែងទន់) បានដុះឡើងវិញស្រោបដោយស្បែក ដែលមានរោមស្ដើងខុសពីប្រើស។ នៅពេលជម្រុះស្នែងរហូតដល់ស្នែងពុំទាន់រឹង ក្ដាន់ឈ្មោលពុំអាចបង្កាត់ពូជបានទេ។ ក្ដាន់ចូលចិត្តរត់ រឿងតាមព្រៃត្រែង ឬស្មៅខ្ពស់ៗ ច្រើនជាងលោតផ្លោះនៅពេលជួបអាសន្នម្តងៗ។ ក្ដាន់ញឹបន្តពូជក្នុងខែកញ្ញា និងតុលា ហើយផ្តល់កំណើតកូន១ ឬ ភ្លោះ ក្រោយពេលពពោះ ៨ខែ។

របៀបរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជាវាមាននៅភូមិភាគខាងជើង និរតី និងខាងកើតទន្លេមេគង្គ។ វាមានផងដែរនៅ ទីជម្រកព្រៃនៃប្រទេសឥណ្ឌា រហូតដល់ប្រទេសភូមា ថៃ ឡាវ និងប្រទេសវៀតណាម ប៉ុន្តែប្រភេទនេះវាមានចំនួនថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រក និងការបរបាញ់ ហើយបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ជាច្រើន ប្រភេទនេះត្រូវបានផុតពូជពីព្រៃធម្មជាតិ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: នៅកម្ពុជា ក្ដាន់ជាប្រភេទជិតផុតពូជ វាងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ ឬពពួកសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ និងការបាត់បង់ទីកន្លែងរកចំណី។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស និងចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទដែលពុំទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ (DD) ។

Hog Deer

Axis porcinus



កិច្ចការ: ក្នុងប្រភេទជម្រុះស្នែង Antlers ឈ្នួសជាប្រភេទសត្វដែលមានមាឌតូច និងមានស្នែងខ្លីប្រវែងពី ១០-១៥ស.ម ព្រមទាំងប្រវែងខ្លាំងមិនលើសពី ៥ស.ម ។ ឈ្នួសញឹកៗស្នែងដូចឈ្នួសឈ្មោលទេ គឺគ្រាន់តែលេចចេញជាដុំពក ឆ្អឹងតូចនៅពីលើក្បាលជាមួយនឹងរោមកពុំប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្នួសញឹក និងឈ្មោលមានចង្កូមដូចគ្នា ប៉ុន្តែឈ្មោលមានលក្ខណៈវែងជាង ដែលជាទូទៅវាប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយគូប្រជែង នៅពេលដណ្តើមញឹកនៅរដូវបន្តពូជ ។ វាមានរោមពណ៌ត្នោត-លឿង ហើយមានភាពស្រគាំនៅផ្នែកខាងលើ និងព្រលែតនៅផ្នែកខាងក្រោម ។ នៅលើផ្ទៃមុខ បង្ហាញនូវខ្សែឆ្មុតពណ៌ខ្មៅស្ថិតនៅជាប់ចង្កូរស្នែងទាំងពីរ ។ នៅខាងលើកន្ទុយមានពណ៌ក្រហម និងខាងក្រោមមានពណ៌ស ។

ជីវសាស្ត្រ: ឈ្នួសអាចរស់នៅគ្រប់ប្រភេទព្រៃ ។ ឈ្នួសបន្លឺសម្លេងខ្លាំង និងតតបគ្នារហូតដល់រយៈពេល១ម៉ោង ប្រសិនបើវាជួបនូវគ្រោះអាសន្ន ហើយសម្លេងនេះអាចឆ្លើយតបរហូតដល់ ១គ.ម ។ ចំណីរបស់វាមានដូចជា មែកឈើតូចៗ ពិសេសស្លឹកក្រូចជាតិ ផ្លែឈើដែលធ្លាក់ និងដំណុះកូនឈើ ។ នៅតំបន់ខ្លះ វាធ្វើសកម្មភាព និងចេញរកចំណីនៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើសកម្មភាពនិងរកចំណីពេញមួយយប់ ប្រសិនបើមានការរំខាន ។ រដូវបន្តពូជប្រព្រឹត្តទៅនៅខែធ្នូ រហូតដល់ខែមករា និងផ្តល់កំណើតកូនមួយក្បាលជូនកាលភ្លោះ ប៉ុន្តែមានកម្រណាស់ ។

របៀបរស់នៅ: នៅកម្ពុជា វាមានសម្បូរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ។ របៀបភាគច្រើនចំពោះសត្វប្រភេទនេះមាននៅប្រទេសឥណ្ឌា រហូតដល់ប្រទេសចិនភាគខាងត្បូង តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងកោះស៊ូម៉ាត្រា កោះចាវ៉ា និងកោះបាលី ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឈ្នួសស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វមានដោយបង្ករ ។ ប្រភេទនេះងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់ ឬការបណ្តើរឆ្កែទាក់ចាប់ ដើម្បីយកសាច់ធ្វើជាអាហារ និងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារពពួកសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LR) ថាជាប្រភេទអាស្រ័យលើកិច្ចអភិរក្សនៅតាមតំបន់ជាក់លាក់ដែលវារស់នៅ ។

Red Muntjac

Muntiacus muntjak



© WCS

ឈ្នួសយក្ស

ភិនភាគ: ឈ្នួសយក្សមានទម្ងន់ ៣៤ គ.ក ឬក៏លើសពីនេះ ។ ជាមធ្យមស្នែងមានប្រវែងរហូតដល់ ២៨ស.ម មានរាងស្រួចនៅខាងចុង និងពិតលំស្នែងដល់ខ្នងមានប្រវែង ១០ស.ម ។ មានរោមពណ៌ប្រផេះត្នោត រហូតដល់ខ្មៅដាំដង និងមានឆ្នុតខ្មៅនៅថ្ងាស ព្រមទាំងពណ៌សនៅផ្នែកពោះ ។ វាមានកន្ទុយខ្លីរាងត្រីកោណ និងមានពណ៌សនៅផ្នែកខាងក្រោម ។ ដូចប្រភេទឈ្នួសដទៃទៀតដែរ ឈ្នួសយក្សឈ្មោលមានចង្កូមលើដុះលានចេញមកខាងក្រៅ ។

ជីវសាស្ត្រ: វាចូលចិត្តរស់នៅតែឯកឯងតាមតំបន់ខ្ពង់រាបដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់ទៅ ៩០០ម ក្នុងព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។ វាចេញរកស៊ីនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេលព្រលប់ ។ ចំណីរបស់វាមានរុក្ខជាតិ និងផ្លែឈើ ។

របៀបរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា ឈ្នួសយក្សមាននៅភូមិភាគឦសាន ភូមិភាគខាងជើង និងតាមជួរភ្នំក្រវាញ ។ គេបានរកឃើញផងដែរនៅភាគកណ្តាលប្រទេសឡាវ វៀតណាម និងថៃ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ឈ្នួសយក្សស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ ។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់យកសាច់ ស្នែង និងឆ្អឹងរបស់វា ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស និងក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (DD) ថាពុំមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ ។

Large-antlered Muntjac

Muntiacus vuquangensis



© Nam Theun 2 Watershed Management & Protection Authority 2007

ប្រើសស្សី

កិច្ចការ: ប្រើសស្សីជាថតិកសត្វពិការភាព ស្ថិតក្នុងត្រកូលប្រើសដែលមានមាឌធំជាងគេ ។ នៅលើដងខ្នង រោមមានពណ៌ប្រផេះស្ទើរក្រមៅ និងនៅកម្រាលក្រវែងសណ្ឋានប្រែង ។ កន្ទុយរបស់វាខ្លី សំពោងពណ៌ខ្មៅ និងរស់រវើកជានិច្ចនៅពេលរកចំណី ហើយវាមានស្លឹកត្រចៀកធំ ។ ស្នែងប្រើសឈ្មោលពេញវ័យមានប្រវែងពី ៥០-១០០ស.ម ដែលជាទូទៅមានខ្លែងម្ខាងៗចំនួនបី ១នៅជាប់គល់ និង២នៅខាងចុង ។

ជីវសាស្ត្រ: ជាសត្វដែលអាចរស់នៅគ្រប់ជម្រកទាំងអស់ រួមទាំងព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃបោះ ។ វារកស៊ីនៅពេលព្រលប់ និងពេលព្រលឹម ហើយសំរាកនៅពេលថ្ងៃនៅតាមព្រៃក្រាស់ៗ ។ ចំណីរបស់វាមានដូចជា ចុងមែកឈើតូចៗ ស្លឹកឈើ ប្រភេទវល្លិពន្លក (ត្រួយ) ផ្លែឈើ ជ្រូន និង ស្មៅ ។ ប្រើសចូលចិត្តស៊ីដីប្រាប ពិសេសប្រើសឈ្មោលដែលកំពុងតែលូតលាស់ស្នែង និងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃរដូវក្តៅក្នុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែកក្កដា-កញ្ញា ។ នៅរដូវបន្តពូជ ប្រើសឈ្មោលតែងតែជល់គ្នាជាក្រុម ដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ និងពាក់ព័ន្ធដែលនៅក្នុងហ្វូងរហូតដល់ ៨ក្បាល ។ ប្រើសញីកើតកូនម្តងតែ១ បន្ទាប់ពីពេលរយៈពេល ៨ខែ ។

របាយរស់នៅ: ប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅភូមិភាគខាងជើង និរតី និងភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ។ គេក៏បានរកឃើញផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសចិន និងតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមទាំង កោះស៊ូម៉ាត្រា កោះបារ៉ា និងបរណេអូ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ប្រើសជាប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមមានដោយបង្អួរ ។ ប្រភេទនេះកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់យកសាច់ ស្នែង ស្បែក និងឆ្អឹង ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្រើសត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(LR) ថាជាប្រភេទអាស្រ័យលើកិច្ចអភិរក្សនៅតាមតំបន់ជាក់លាក់ដែលវាស់នៅ ។

Sambar

Cervus unicolor



© WWF

រមាំង

កំណត់: រមាំងជាថ្នាក់សត្វពិរុក្ខជាតិដែលមានមាឌតូចជាងប្រើស និងធំជាងសត្វល្អិតបន្តិច ។ ស្នែងរបស់វាមានលក្ខណៈខុសពីស្នែងសត្វប្រើស ដោយនៅផ្នែកគល់នៃស្នែងមានបែកខ្លែងពីរ មួយស្រួចដុះគ្របលើចិញ្ចើមលយទៅមុខ និងមួយទៀតដុះឡើងទៅលើរូងពេនចេញមកក្រៅ ហើយកោងខុបទៅមុខ ហើយនៅខាងចុងស្នែងរបស់វាមានរាងសំប៉ែតបែកជាប្រមាម ។ ជាទូទៅ វាមានសម្បុរលឿងស្រអាប់ ឬលឿងក្រមៅចាស់ មានអុចៗសនៅផ្នែកចំហៀងខ្នង ដង្ហែកក្រោម ពោះ និងកមាសពណ៌ស ប៉ុន្តែសម្បុរនេះអាចប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាល ។ នៅរដូវជម្រុះស្នែង វា មានរោមវែងៗជិតចំរុះពណ៌ប្រផេះក្រហម និងលឿងក្រមៅភ្ជាប់នឹងគល់ក ដែលមានរោមប្រែង មើលគួរឱ្យគយគន់ ។

ជីវសាស្ត្រ: រមាំងជាសត្វមិនសូវឆ្អើល វាស់នៅជាហ្មងពី ១០-១៥ក្បាល ។ វាចូលចិត្តរស់នៅ តាមវាលទំនាបដែលសម្បុរទៅដោយ ផ្ទុក ឬត្រពាំង វាលស្រែ និងព្រៃបោះ ។ ចំណីរបស់វាមាន ដូងជា ស្មៅ ស្លូវ ព្រៃច ល្បះរុក្ខជាតិ ស្រូវ និងផ្លែឈើ ។ វាជម្រុះស្នែងរាល់ឆ្នាំនៅអំឡុងខែមិថុនា ដែលជារដូវកាលសម្បុរចំណីសំរាប់ការលូតលាស់ស្នែងរបស់វា ។ រមាំងញឹកបន្តពូជ នៅចន្លោះខែ មីនា-ឧសភា ហើយកើតកូនម្តងបាន១ក្បាលបន្ទាប់ពីពេលរយៈពេល ៦-៨ខែ ។

របាយរស់នៅ: ចំពោះក្រុមប្រភេទរបស់រមាំង *Cervus siamensis* បច្ចុប្បន្នវាមានចំនួន ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទេសជិតខាង ។ ចំនួនទាំងនេះ មាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង មណ្ឌលគីរី រតនគិរី ក្រចេះ (មានចំនួនតិចតួច) ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ បន្ទាយមានជ័យ (ក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វក្រៀលអាងត្រពាំងថ្ម) ពោធិសាត់ ឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប ជាពិសេសនៅខេត្តព្រះវិហារក្នុងស្រុកវែប ជាក្បាល គូលែន និងសង្កាមថ្មី សរុប ប្រហែល១០០ក្បាល ដែលជាទិន្នន័យមួយបាននិងកំពុងធ្វើការអភិរក្ស ។ ប្រភេទនេះគេបានរក ឃើញផងដែរនៅប្រទេសឡាវ (មានចំនួនតិចតួចបំផុត) និងកោះហៃណាន ។ ដោយឡែក នៅ ប្រទេសថៃត្រូវបានផុតពូជពីធម្មជាតិ ហើយប្រហែលជាផុតពូជនៅប្រទេសវៀតណាម ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: រមាំងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងមានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃ អនុញ្ញាសាយតេស ។ ប្រភេទនេះកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបរបាញ់យកសាច់ ស្បែក ស្នែង និងឆ្អឹង ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្រភេទនេះមានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថាជាប្រភេទ ងាយ រងគ្រោះថ្នាក់ (VU) ។

Eld's Deer

Cervus eldii



© WCS/WWF



© Allan Michaud

ក្រុមគោសាទិស

WILD CATTLE



សេចក្តីផ្តើម: គោព្រៃ ទន្សោង ខ្លឹង ក្របីព្រៃ និង កែវ ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Artiodactyla ។ ពពួកនេះមានរូបរាងធំជាងពពួកតិណាសីដទៃទៀត ។ ដោយសារលក្ខខ័ណ្ឌនៃមជ្ឈដ្ឋានដែលវា រស់នៅប្រភេទសត្វទាំងនេះប្រែប្រួលសំបុរតាមរយៈ ឬអាយុរបស់វា ។ គោព្រៃជាប្រភេទពិសេស ជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមសត្វទាំងនេះព្រោះវាមានកម្លាំងខ្លាំងធំទ្រាំនឹងកំដៅថ្ងៃបានច្រើនជាង សត្វដទៃទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀតគោព្រៃជាសត្វនិមិត្តរូបតំណាងឱ្យថនិកសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្រុមប្រភេទសត្វទាំងនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រក ការបរបាញ់ ការទាក់ចាប់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសំណាកដទៃទៀត ។

កិច្ចការ: ខ្លឹមមានមាឌធំ ខ្លួនខ្មៅ បូកក្រាស់ លាតសន្ធឹងរហូតដល់ស្ទើរពាក់កណ្តាលខ្នង។ កខ្វិ បន្តិច រាងមាំដោយមានបួរនៅផ្នែកខាងក្រោម។ ជើងទាំងបួនចាប់ពីជង្គង់ចុះក្រោមពណ៌ប្រផេះ។ នៅលើថ្ពាសមានរោមវែងពណ៌ប្រផេះ ឬពណ៌លឿងមាសស្រាល។ កូនរបស់វាមានពណ៌ត្នោត រហូតដល់វាមានអាយុពី ៤-៥ខែ ទើបក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅ។ ខ្លឹមញីមានមាឌ និងស្នែងតូចជាង ឈ្មោល ហើយពុំសូវមានបូក និងបួរដូចខ្លឹមឈ្មោលទេ។ ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ ច្រើនហៅឈ្មោះសត្វនេះថា “ខ្លឹមភ្នំ” ។ ស្នែងខ្លឹមមានរាងសំប៉ែតជាងស្នែងទន្សោង ហើយដុះមក ពណ៌ប្រផេះខៀវផ្នែកគល់ ដុះចេញក្រៅរួចកោងឡើងទៅលើដូចទន្សោងដែរ។ ខ្លឹមមានទម្ងន់ពី ៥០០-១០០០គ.ក។ ខ្លឹមឈ្មោលពេញវ័យមានកម្ពស់ ១,៨៥ ម៉ែត្រ និងញី ១,៦០ ម៉ែត្រ។ ខ្លឹមឈ្មោល មានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ ២ម៉ែត្រ។

ជីវសាស្ត្រ: ខ្លឹមអាចរស់នៅបានពីតំបន់ទំនាបរហូតដល់រយៈកម្ពស់២០០០ម (តំបន់ខ្ពង់រាប និងជួរភ្នំក្រវាញ)។ ខ្លឹមរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃឈ្លោះ វាលស្មៅ និងអាចរស់នៅរយៈកម្ពស់ ខ្ពស់ជាងទន្សោង។ ជាធម្មតាខ្លឹមចេញរកស៊ី នៅពេលព្រលឹម និងពេលល្ងាច។ វាចូលចិត្តរស់ នៅជាហ្វូង។ អាហាររបស់វាគឺ ស្បូវខ្ចី ទំពាំង ស្មៅ និងវល្លិ៍ជាដើម។ ខ្លឹមញីអាចបង្កើតកូនបាន១ បន្ទាប់ពីពពោះរយៈពេលពី ៩ខែ ។

របាយរស់នៅ: ខ្លឹមជាប្រភេទសត្វមួយដែលទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំង ហើយ ចំនួនរបស់វាមានការថយចុះគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ។ ខ្លឹមរស់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជា ភូមិភាគ ឦសាន ភូមិភាគខាងជើង ខេត្តកោះកុង ពោធិសាត់(ជួរភ្នំក្រវាញ)និង កំពង់ស្ពឺជាដើម។ របាយ របស់ប្រភេទនេះ មាននៅប្រទេសឥណ្ឌា រហូតដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ខ្លឹមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ ប្រភេទនេះមានដង់ស៊ីតេរស់នៅ កម្រិតទាប គេកម្រឃើញវាមានរស់នៅតាមវាលទំនាបណាស់ ព្រោះសត្វនេះមិនចូលចិត្តកម្ដៅ ថ្ងៃយូរពេកនោះទេ។ សត្វខ្លឹមកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាត់បង់ទី ជម្រករស់នៅ ការបរបាញ់ដើម្បីយកសាច់ ស្នែង ឆ្អឹង និងការជួញដូរ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុង បញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសកល។ សត្វខ្លឹមស្ថិតនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។

Gaur

Bos gaurus



© WCS

ក្របីព្រៃ

វិភាគ: ក្របីព្រៃមានរូបរាងដូចក្របីស្រុកដែរ ប៉ុន្តែក្របីព្រៃមានភាពរហ័សរហួនជាង និងឆាប់ ក្រវែកក្រោយ ។ ទម្ងន់មានពី៧០០-១២០០គ.ក វាមានពណ៌ប្រផេះ រីឆ្មាតខ្មៅ ។ នៅខាងក្រោមក មានពណ៌សរាងជាអក្សរ (V) ។ ស្ទែងទាំងពីរមានរាងសំប៉ែតគន្លាក់ៗបត់ទៅក្រោយ ក្របីព្រៃមាន គម្លាតស្ទែងធំជាងក្របីស្រុក ។ ក្របីព្រៃឈ្មោលមានកម្ពស់រហូតដល់ ២ម៉ែត្រ ។

ជីវសាស្ត្រ: ក្របីព្រៃចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃឈ្លោះ វាលស្មៅក្បែរទឹក វាពុំចូលចិត្តព្រៃស្រោង ទេ ។ ក្របីព្រៃរស់នៅជាហ្លួង ហើយចេញទៅរកស៊ីនៅព្រឹកព្រលឹម និងពេលល្ងាច ។ វាទំពារអៀង នៅពេលដេក ឬពេលដេកត្រាំទឹក ។ ក្របីព្រៃញើដោយឈ្មោលនៅកំឡុងខែតុលា រហូតដល់វិច្ឆិកា និងបង្កើតបានកូន ១ បន្ទាប់ពីបានពពោះរយៈពេល ១០ខែ ។

របាយរស់នៅ: ក្របីព្រៃជាប្រភេទសត្វកម្រ វាមានចំនួនតិចតួចដែលនៅសេសសល់ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ក្របីព្រៃមានវត្តមាននៅតែប៉ុន្មានខេត្តប៉ុណ្ណោះ ដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរី ព្រះវិហារ និងរតនគិរី ។ វាមានវត្តមានរស់នៅផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌា និងនេប៉ាល់ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ក្របីព្រៃស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ជិតផុតពូជជាសកលដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (EN) ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រភេទនេះ មានវត្តមានតិចតួចបំផុត ។ ប្រភេទនេះប្រឈមមុខនឹងការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាត់បង់ ទីជម្រក ការរាំងស្ងួតនៃទីជម្រក និងការបរបាញ់ ។

Wild Water-buffalo

Bubalus arnee



© WCS/WWF

គោលដៅ

កិច្ចការ: គោលដៅជាប្រភេទគោលនិយមមានរូបរាងស្រដៀងទន្សោង។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គេអាចសម្គាល់វាបានច្បាស់តាមលក្ខណៈមានប្លង់រឹងឆ្លាក់ចុះដល់ជង្គង់ និងស្ទើរតែដល់ដីនៅពេលវាចាស់។ ស្ទឹងគោលព្រៃឈ្មោល និងញីមានលក្ខណៈខុសគ្នា ដោយសារស្ទឹងឈ្មោលធំជាងស្ទឹងញី វាដុះចេញមកក្រៅកោងទៅមុខរួចងើបឡើងលើ និងមានបែកចុងស្ទឹង នៅពេលវាមានអាយុប្រមាណ ៣ឆ្នាំ។ ស្ទឹងញីដុះមកមុខរាងងើបបន្តិច រួចរមួលឡើងលើ។ ជើងក្រោមជង្គង់ទាំងបួនមានពណ៌ស ឬប្រផេះ និងនៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃតួចំពុំមានដាងពណ៌សដូចទន្សោងទេ។ សម្បុរគោលព្រៃអាចប្រែប្រួល នៅពេលក្មេងមានសម្បុរត្នោត ដល់ដំទង់មានសម្បុរប្រផេះ និងប្រផេះចាស់នៅពេលវាចាស់។ គោលព្រៃឈ្មោលពេញវ័យមានកម្ពស់រហូតដល់ ១,៨១ ម៉ែត្រ។

ជីវសាស្ត្រ: គោលព្រៃចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃឈ្មោះវាលស្មៅមានព្រៃតូចម្តោត និងជាពិសេសនៅតំបន់ដីប្រាប។ វារស់នៅជាហ្វូង ជួនកាលគេអាចជួបប្រទះវារស់នៅជាមួយហ្វូងទន្សោង ខ្លីង ឬប្រើសផងដែរ។ វាចេញទៅរកស៊ីនៅព្រឹកព្រលឹម និងព្រលប់។ គោលព្រៃបន្តពូជនៅខែមេសា និងបង្កើតកូននៅខែធ្នូ ឬមករា។ វាជាសត្វដែលឆាប់ផ្អើលជាងប្រភេទសត្វដទៃទៀត។ គោលព្រៃមានកម្លាំងខ្លាំង ពូកែធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃ អត់ធន់នឹងចំណីអាហារដែលមានគុណភាពទាប និងធន់នឹងជំងឺគោក្អក។

របៀបរស់នៅ: គោលព្រៃជាប្រភេទមួយកម្របំផុត។ វាអាចមាននៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ ភូមិភាគឦសានមានខេត្តមណ្ឌលគីរី រតនគិរី និងស្ទឹងត្រែង។ គោលព្រៃមានវត្តមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងរយៈកាល ៣០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ គេពុំដែលប្រទះឃើញវត្តមានគោលព្រៃទេ តែគេនៅមានសង្ឃឹមតិចតួចដែរថា វាអាចនៅមានជីវិតរស់នៅក្នុងកម្ពុជានៅឡើយ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: គោលព្រៃត្រូវបានកំណត់ជាសត្វនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (មរតកធម្មជាតិ) តំណាងឱ្យពពួកថនិកសត្វ។ វាស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និងជាប្រភេទត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN(CR) ថាជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោក។ គោលព្រៃត្រូវបានហាមឃាត់ការបរបាញ់តាំងពីសម័យមុនសង្គ្រាមនៃទសវត្សរ៍ទី៦០។ គោលព្រៃត្រូវបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុសញ្ញាសាយតេស។

Kouprey

Bos sauveli



© wcs

ទន្សោង

កិនភាគ: ទន្សោងក្មេងមានសំបុរក្រហមត្នោតស្រាល វាប្រែប្រួលទៅជាពណ៌ក្រហមត្នោតប្រផេះ ឬក្រហមត្នោតចាស់នៅពេលវាចំណាស់បន្តិច។ ជើងទាំងបួនខាងក្រោមជង្គង់មានពណ៌សដូចខ្លីង និងគោព្រៃដែរ ប៉ុន្តែវាមានចំនុចមួយដែលប្លែកពីគេគឺពណ៌សនៅផ្នែកខាងក្រោយត្រង់កំពែង តូច។ ស្នែងទន្សោងមានរាងមូលដាងស្នែងខ្លីង មានពណ៌លឿងស្រគាំនៅផ្នែកពាក់កណ្តាលចុះ ក្រោម ហើយចុងស្នែងពណ៌ខ្មៅ។

ជីវសាស្ត្រ: ទន្សោងចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃឈ្មោះ វាលស្មៅ ព្រៃគម្ពោតជាដើម និងចូលចិត្តរក ស៊ីនៅតាមមាត់អូរ។ វាមិនសូវរស់នៅតំបន់មានទីជម្រាលទេ។ វាចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូងៗ ឬនៅ ជាមួយគោព្រៃ ប្រើស ខ្លីងជាដើម។ ទន្សោងចេញរកស៊ីនៅពេលព្រលឹម និងពេលព្រលប់។ ជាធម្មតាទន្សោងមេចាស់ជាងគេ តែងតែជាអ្នកដឹកនាំហ្វូង។ ទន្សោងបន្តពូជនៅខែឧសភាដល់ មិថុនា និងអាចបង្កើតកូនបាន ១-២ក្បាល បន្ទាប់ពីពេញវ័យៈពេល ១០ខែ ហើយមេអាចដោយ ឈ្មោលម្តងទៀតក្រោយពេលកើតកូនបាន ២ខែ។

របររស់នៅ: វារស់នៅរាយប៉ាយស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង មានដូចជា តំបន់ភូមិភាគពាយ័ព្យសាន និរតី និងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានផងដែរនៅភូមា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និងថៃ។ ទន្សោងជាប្រភេទមួយដែលទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីការបរបាញ់ខុសច្បាប់ ដើម្បីយកសាច់ និងស្នែង។ បច្ចុប្បន្នទន្សោងមានដោយកម្រនៅតំបន់ភាគច្រើន។

ស្ថានភាពរក្សា: ទន្សោងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វមានដោយកម្រ និងចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (EN) ថាជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ។ ប្រភេទនេះទទួលសម្ពាធខ្លាំងពីការ បរបាញ់ យកស្បែក សាច់ ស្នែង ឆ្អឹង ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

Banteng

Bos javanicus



© WCS



© WWF

កែ៖

វិភាគ៖ កែមានសម្បុរខ្មៅប្រផេះ និងរោមវែងៗស្តើង។ វាមានដងខ្លួនខ្លី ហើយជើងទាំង៤ របស់វាវែង។ ផ្នែកខាងលើដងខ្លួនសម្បុរខ្មៅ និងផ្នែកក្រោមនៃជើងចាប់ពីក្បាលដង្កង់ចុះមាន ពណ៌ចម្រុះខ្មៅ-ប្រផេះ-លឿង។ នៅលើពន្ធុលក្បាលរបូតដល់ស្មារបស់វាមានរោមវែងៗ សណ្ឋានដូចជាប្រែង។ បបូរមាត់ពណ៌ស ហើយផ្នែកក្រោមកមានពណ៌លឿង ឬពណ៌ស ត្រចៀក វាវែងត្រង់ទៅលើ។ វាមានស្បែងដូចសត្វពពែ ដុះកោងទៅក្រោយបន្តិច ប្រវែងប្រហែល ២៨០មម ពណ៌ខ្មៅ និងមានគន្លាក់ៗជារង្វង់នៅផ្នែកគល់។ កន្ទុយខ្លី ហើយមានរោមសំពោង ពណ៌ខ្មៅប្រផេះ។

ជីវសាស្ត្រ៖ កែចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំ ជ្រលង ផ្ទាំងថ្មខ្ពស់ៗ ដែលមានគំរូបព្រៃ និងមាន ស្រទាប់រុក្ខជាតិថ្នាក់ក្រោមច្រើន។ កែមានជើងយ៉ាងចំណាប់ក្នុងការដើរឡើងតាមផ្ទាំងថ្មចោតៗ។ នៅពេលថ្ងៃវាចូលចិត្តសំរាកតាមគម្ពោតព្រៃក្រាស់ ហើយចេញរកស៊ីនៅពេលព្រលឹម ឬក្បាល ព្រលប់។ វាចូលចិត្តស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិ និងឈ្លះគ្រប់ប្រភេទ។ សត្វកែចូលចិត្តយករូងភ្នំភ្នាក់ៗធ្វើជា ទីជម្រករបស់វា ហើយគេអាចសម្គាល់វត្តមានវាដោយសារគំនរលាមក។ ដោយសារកែជាសត្វ ដែលមានភាពរហ័សរហួន និងពូកែស្រង់ក្លិន ភ្នែកពូកែ និងរស់នៅតាមទីជម្រកស្ងាត់ ដូចនេះគេកម្រជួបប្រទះវាណាស់។ រដូវបន្តពូជមាននៅខែតុលា និងខែធ្នូ ហើយកើតកូនបាន១ ជួនកាលភ្លោះមានដោយកម្រ បន្ទាប់ពីពពោះ៧ខែ។ កូនរស់នៅជាមួយមេវាស្ទើរពេញមួយឆ្នាំ ទើបចាកចេញ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស៖ ប្រភេទសត្វនេះមានដងស៊ីតែរស់នៅកម្រិតទាប គេកម្រឃើញវាមានរស់ នៅតាមតំបន់ទំនាបវាលស្មៅ ដូចសត្វទំពារអៀងដទៃទៀតណាស់ សត្វកែកំពុងប្រឈម មុខនឹងការរងគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រករស់នៅ ការទាក់ចាប់ ឬរបបពូជពូកវា ដើម្បីយកសាច់ ស្បែង ឆ្អឹង និងការជួញដូរ។ កែស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយកម្រ វាត្រូវបានចុះក្នុង បញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសាកល។ សត្វកែស្ថិតនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី១ របស់អនុសញ្ញាសាយតេស។

Southern Serow

Naemorhedus sumatraensis



© CI



© WCS

ទន្សាយ HARE



សេចក្តីផ្តើម: ទន្សាយគល់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ Lagomorpha ។ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានទន្សាយពីរប្រភេទ ទន្សាយគល់ជាប្រភេទស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ (genus Lepus) និងប្រភេទរោម ឆ្នួតស្ថិតនៅក្នុងអំបូរ (genus Nesolagus) ដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ Sumatra និងក្នុងព្រៃ ស្រោងនៃតំបន់ឥណ្ឌូចិន ។

ទន្សាយគល់

កិនភាគ: ទន្សាយគល់មានមាឌតូចជាងប្រភេទទន្សាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបពាង ។ វាមាន ធ្មេញមុខលើ១តូរវែង ។ វាខុសពីប្រភេទដទៃទៀតនៅពេលវាកើតមកក្លាយវាបើកភ្នែក និងមានរោម វែងៗពាសពេញខ្លួន ។ សម្បុរវាមានពណ៌ត្នោតខ្ចីនៅផ្នែកខាងលើ និងពណ៌សនៅផ្នែកខាង ក្រោម ។ ចំណែកកន្ទុយមានពីរពណ៌ខុសគ្នាគឺផ្នែកខាងលើមានពណ៌ត្នោតនិងផ្នែកខាងក្រោមមាន ពណ៌ស ។ ស្លឹកត្រចៀកមានពណ៌ប្រផេះហើយខាងចុងមានពណ៌ខ្មៅ ។

ជីវសាស្ត្រ: វាមានជម្រកនៅក្នុងព្រៃបោះ វាលស្មៅធំៗ ចំការដំណាំ ដីចំការគេបោះបង់ចោល ។ វាពុំមានជំនាញខាងកកាយ ឬជីករន្តទេ ។ ជាសត្វរស់នៅតែងកងហើយពុំសូវផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង ហើយចូលចិត្តរស់នៅក្នុងគម្ពោតព្រៃ និងស្មៅខ្ពស់ៗ ។ វាមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការរត់-លោត ឬគេចពីសត្រូវដោយសារតែជើងក្រោយមានការវិវត្តន៍ខ្ពស់ អាចរត់រហូតដល់ល្បឿន ៨០គម ក្នុង១ម៉ោង ។ ទន្សាយគល់វាណាខ្លួននៅពេលថ្ងៃក្នុងគម្ពោតព្រៃខ្ពស់ៗ ហើយចេញរកស៊ីនៅពេល ល្ងាច និងពេលយប់ ។ ចំណីអាហាររបស់វាមាន សំបកឈើ មែកឈើតូចៗ ត្រួយរុក្ខជាតិ ស្មៅ និង ស្រូវ ។ វាមានអាយុកាលរហូតដល់ ៦ឆ្នាំ ។

របាយរស់នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រភេទនេះរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ។ វាមានផងដែរនៅ ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសភូមា ប្រទេសថៃ ឥណ្ឌូចិន និងកោះហាយណាន ។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: ទន្សាយគល់ជាប្រភេទមានដោយបង្កួរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

Siamese Hare

Lepus peguensis



© WWF



ថនិកសត្វសមុទ្រ

CETACEA



សេចក្តីផ្តើម: ថ្វីត្បិតពពួកថនិកសត្វសមុទ្ររស់នៅក្នុងទឹកដូចត្រី តែពួកវាមានឈាមក្តៅ ដកដង្ហើមពីខ្យល់ដែលនៅលើផ្ទៃទឹកផ្តល់កំណើតជាកូនតែម្តង បំបៅកូនដោយទឹកដោះរបស់មេ និងជាពិសេសពួកវាមានឆ្មេងដូចថនិកសត្វដទៃទៀតដែលនៅលើគោកដែរ។ ពពួកនេះស្ថិតនៅក្នុងស្មៅក្នុងទឹក ផ្កាថ្ម បង្ការ និងប្រភេទត្រីដទៃទៀតធ្វើជាអាហារ។ នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានថនិកសត្វយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន ២៥ ប្រភេទដែលមានវត្តមាន។ តាមលទ្ធផលនៃការអង្កេតឆ្នាំ ២០០១ នៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាថនិកសត្វសមុទ្រចំនួន ៩ ប្រភេទត្រូវបានបញ្ជាក់ពីវត្តមាន រីឯប្រភេទដទៃទៀតត្រូវបានកត់ត្រាតាមឯកសារខ្លះដែលមានអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងថនិកសត្វសមុទ្រក្នុងកម្ពុជា។ ដោយឡែកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រភេទផ្សេងៗត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមានរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រដាច់ដោយឡែកពីផ្សេងៗគ្នា ត្រូវបានគេឃើញរស់នៅក្នុងទឹកសាបមិនអាចរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្របានឡើយ។

ផ្សេងគ្នានៃព្រយខ្នង

ភិក្ខុភាគ: ផ្សេងគ្នានៃព្រយខ្នងជាថនិកសត្វមានទំហំតូចជាងគេក្នុងអំបូរផ្សេងៗ និងមានប្រវែងដងខ្លួនទើបនឹងកើតពី ៦៨-៨០ស.ម ពេញវ័យ: ១,៥៥-២ម និងកូនទើបកើតមានទម្ងន់ ៦គ.ក ពេញវ័យ ៧២គ.ក ។ ផ្សេងគ្នាប្រភេទនេះពុំមានព្រយខ្នងទេ ប៉ុន្តែនៅពិសេសខ្លួនមានទ្រនុងអ័ក្សក្រើមដូចឆ្កែព្យួរណាមួយកាត់តាមចង្កូរបណ្តោយខ្នង ។ ក្បាលមូលគ្មានចំពុះ ។ ដងខ្លួនមានពណ៌ប្លែកពីប្រភេទទៅខ្មៅនៅលើខ្នង និងចំហៀងសង្វាង ហើយមានពណ៌ប្រផេះស្រាលលាយពណ៌សនៅផ្នែកខាងក្រោម ។

ជីវសាស្ត្រ: ជាទូទៅរស់នៅតែងកង និងជាក្រុមតូចៗនៅទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ ។ វាងើបឡើងមកលើផ្ទៃទឹក ដើម្បីដកដង្ហើមដោយមិនបង្ហាញឱ្យឃើញខ្លួនទាំងមូលឡើយ ។ ចំណីអាហាររបស់វាមាន បង្កា មីក ត្រីជាដើម ។

របាយការណ៍នៅ: នៅប្រទេសកម្ពុជា វាមាននៅតាមទឹកភ្នំភ្នំនៃអាកាសសម លាតសន្ធឹងពីទិសនិរតីបន្តដល់ កោះរុង កោះរុងសន្ធឹម តាមឆ្នេរភាគខាងជើងខេត្តកោះកុង និងឆ្នេរកែប ។ ប្រភេទនេះមានរស់នៅផងដែរនៅតាមឈូងសមុទ្រថៃ អាស៊ីភាគខាងកើត ភាគខាងត្បូងបង់ក្លា-ដេស ចិន ប៉ាគីស្ថាន អ៊ីរ៉ាក់ ជប៉ុន សិង្ហបុរី និង វៀតណាម ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្សេងគ្នានៃព្រយខ្នងជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (DD) ជាប្រភេទមិនទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់លើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុសញ្ញា CITES ។

Finless Porpoise

Neophocaema phocaenoides



© Pete Davidson

ផ្សេងៗពីផ្កាឈូក

ភិនភាគ: ផ្សេងៗពីផ្កាឈូកដែលទើបនឹងកើតនិងពេញជំទង់មានពណ៌ប្រផេះក្រម៉ៅ និងមានពណ៌ផ្កាឈូកលាយសនៅពេលដែលមានវ័យចំណាស់ ។ វាមានព្រួយខ្ពង់ដែលមានរាងដូចចូកសត្វគោ និងមានចំពុះតូចល្មម ។ កូនកើតភ្លាមមានប្រវែង១ម ពេញវ័យ ២,៤៩-២,៧៩ម និងទម្ងន់ទើបកើត ១៤ គ.ក ពេញវ័យ ១៧០-២៦០គ.ក ។


ជីវសាស្ត្រ: ពួកវាស់នៅជាក្រុមតូចៗ មិនលោតលេងលើផ្ទៃទឹក និងមិនហែលដេញតាមក្បាលទូកឡើយ ។ វាចូលចិត្តរស់នៅ និងលេងតាមឆ្នេរខ្សាច់ ហើយរកចំណីនៅតាមផ្ទាំងថ្ម ។

របាយរស់នៅ: វាស់នៅក្បែរឆ្នេរ មាត់ទន្លេ មាត់ពាម និងក្បែរព្រៃកោងកាងក្នុងស្រុកថ្មស ខេត្តកោះកុង និងប្រហែលជាមាននៅរាម ក្រុងកែបនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជា ។ វាមានវត្តមាននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ែកខាងលិច និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា ចាប់ពីទ្វីបអាហ្វ្រិករហូតដល់ទ្វីប អូស្ត្រាលី ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្សេងៗពីផ្កាឈូកជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (DD) ជាប្រភេទមិនទាន់មានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់លើពិភពលោក ។

Indo-Pacific Humpbacked Dolphin

Sousa chinensis



© Pete Davidson

ផ្សេងគ្នាក្បាលត្រឡោក

វិភាគ: ផ្សេងគ្នាក្បាលត្រឡោកត្រូវបានអ្នកសត្វសាស្ត្ររកឃើញនៅទីជម្រកពីរខុសគ្នារវាងដែនទឹកសមុទ្រ និងទឹកសាបហើយមានរូបរាងដូចគ្នា។ ប្រវែងដងខ្លួនទើបកើតមាន៩០-១០០ស.ម ពេញវ័យ ២.៣២-២.៧៥ម និងកូនទើបកើតមានទម្ងន់ ១០-១២គ.ក ពេញវ័យ ១៣០គ.ក។ វាគ្មានចំពុះទេ ក្បាលមាំមួន រីឯព្រួយខ្នងមានទំរង់ផ្សេងៗគ្នា។ល។ ផ្នែកខាងខ្នង និងចំហៀងសង្វាងមានពណ៌ប្រផេះចាស់ ឯពោះមានពណ៌ប្រផេះស្រាល។ ព្រួយចំហៀងមានទំហំធំវែងរាងដូចច្រវ៉ា។

ជីវសាស្ត្រ: ផ្សេងគ្នាប្រភេទនេះហែល និងក្រឡាប់ខ្លួនលើផ្ទៃទឹកយឺតៗ ហើយងើបដកដង្ហើមក្នុងបរិយាកាស រយៈពេលពី ៧០-១៥០ វិនាទីម្តង។ ផ្សេងគ្នាក្បាលត្រឡោកញើអាចបន្តពូជបានចាប់ពីអាយុ ៧ឆ្នាំឡើងទៅ និងរយៈពេលពពោះគឺ ៩ខែ។

របាយរស់នៅ: វាមាននៅក្រុងព្រះសីហនុ បណ្តោយឆ្នេរខេត្តកោះកុង (ចំនុចប្រសព្វរវាងទឹកប្រៃ-សាប) កោះថ្មី កោះសេះ ឧទ្យានជាតិរាម និងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងតាមបណ្តោយឆ្នេរនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជា។ ដែនរបស់វាមានផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងកើតដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកសាបធំៗចំនួន៣ នៅអាស៊ីរួមមាន៖ ទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ (បច្ចុប្បន្នដែនជម្រករដូវប្រាំងគឺមានតែនៅចន្លោះពីខេត្តក្រចេះ) (ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងទន្លេមេគង្គពីខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសឡាវប៉ុណ្ណោះ) ប្រព័ន្ធទន្លេម៉ាហាកាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេអាឈ័យយ៉ាវ៉ាឌីនៃប្រទេសភូមា ហើយក៏មានផងដែរនៅតំបន់ទឹកភ្នំនៃបឹងសុងក្លាប្រទេសថៃ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្សេងគ្នាមេគង្គជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (LR) ជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចប៉ុន្តែវាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នៅ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ នៃអនុសញ្ញា CITES ។ ប្រភេទនេះងាយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលជម្រៅទឹកមានកំរិតរាក់ច្រើន ដែលមិនបង្កលក្ខណៈឱ្យវាហែលចាប់ចំណីបាន។ ជាពិសេសចំពោះផ្សេងគ្នាទន្លេ វាកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជាប់សំណាញ់អ្នកនេសាទ និងការប្រែប្រួលជម្រៅ និងគុណភាពនៃទឹកទន្លេ។

Irrawaddy Dolphin

Orcaella brevirostris



© Pete Davidson

ផ្សោតអុច

វិនិច្ឆ័យ៖ ផ្សោតអុចមានទំហំតូចមធ្យមរាងស្រលូនដែលមានអុចៗនៅពេញដងខ្លួន ហើយរូបរាងរបស់វាប្រែប្រួលទៅតាមអាយុ និងទីកន្លែង។ ជ្រោយខ្នង និងព្រួយខ្នងមានពណ៌ប្រផេះក្រមៅឆ្លុះចំហៀងមានពណ៌ប្រផេះស្រាល។ ព្រួយខ្នងមានរាងដូចកណ្តៀវដែលមានបាតតូចចង្អៀត និងជាសត្វដែលមានថ្ងាសវែងចំពុះពណ៌ស។ ប្រវែងខ្លួនទើបកើត ៨៥ស.ម ពេញវ័យ ២,៤-២,៥៧ម និងទម្ងន់ពេញវ័យ ១២០គ.ក។

ជីវសាស្ត្រ៖ វាជាសត្វសកម្មអាចហែលទឹកបានលឿន លោតបានឆ្ងាយ និងស្លាហាមឡើងវិញ។ ជួនកាលគេប្រទះឃើញវត្តមានវាស់នៅជាមួយផ្សោតបង្គិលផងដែរ។

រចនាសម្ព័ន្ធ៖ ផ្សោតអុចរស់នៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ ហើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរកោះតាង កោះប៊ូឡូរីននៃដែនសមុទ្រកម្ពុជា។ ប្រភេទនេះត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅតំបន់ត្រូពិច ឈូងសមុទ្រថៃ និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ស្ថានភាពអភិរក្ស៖ ផ្សោតអុចជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN (LR) ជាប្រភេទរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចលើពិភពលោក និងនៅតាមតំបន់ជាកំណត់ដែលធ្លាប់រស់នៅ។

Pantropical Spotted Dolphin

Stenella attenuata



© Pete Davidson

ផ្សោតបង្វិល

កំណត់: ផ្សោតបង្វិលជាសត្វមានទំហំតូច ចំពុះវែង និងមានព្រួយខ្នងត្រង់ស្រួចឡើងលើ។ ព្រួយខ្នងមានពណ៌ខ្មៅ ចំហៀងសង្វាងពណ៌ប្រផេះស្រាល និងពោះពណ៌ប្រផេះលាយស។ ប្រវែងដងខ្លួនពេញវ័យ ១,៤៥-១,៥៨ម និងទម្ងន់ពេញវ័យ ៣១-៣៦គ.ក។

ជីវសាស្ត្រ: ផ្សោតបង្វិលរស់នៅជាហ្វូងចាប់ពី៥០ក្បាលឡើងទៅ និងជួនកាលគេប្រទះឃើញ វារស់នៅជាមួយផ្សោតអុចផងដែរ។ វាអាចលោតហាក់បង្វិលខ្លួនបានខ្ពស់ និងជាសត្វឆាប់ផ្អើល។ ចំណីអាហាររបស់វាមាន មីក ត្រី និងបង្កាជាដើម។

រាយការណ៍នៅ: ផ្សោតបង្វិលរស់នៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ ហើយគេប្រទះឃើញនៅកោះតាងនៃដែន សមុទ្រកម្ពុជា។ គេរកឃើញមានរស់នៅតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី។


ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្សោតបង្វិលជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LR) ជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចលើពិភពលោក។ ប្រភេទនោះកំពុងរងគ្រោះដោយសារការទាក់ទាញ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម ផ្នែកខាងសម្លៀកនៅតាមសួនសត្វ និងការនេសាទសមុទ្រ។

Dwarf Spinner Dolphin

Stenella longirostris roseiventris



© Roland Seitre



ផ្សោតច្រមុះដបខ្លី និង វែង

កំណត់: ថនិកសត្វទាំងពីរប្រភេទនេះមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា មានព្រួយខ្លងខ្ពស់ឡើងទៅលើ និងស្ថិតនៅចំពាក់កណ្តាលខ្លង ហើយស្ថិតក្នុងអំបូរតែមួយ ។ ផ្សោតច្រមុះដបចំពុះខ្លី អាចរស់នៅក្បែរ និងឆ្ងាយពីឆ្នេរ ។ វាមានចំណុចអុចទំហំតូច ចំពុះខ្លី និងមានទម្ងន់ពេញវ័យ ១៨០គ.ក ។ ចំណែកឯផ្សោតច្រមុះដបចំពុះវែងមានទំហំធំមាំរស់នៅឆ្ងាយពីច្រាំង និងមានទម្ងន់រហូតដល់ ៥០០គ.ក ។ វាមានជ្រោយខ្លងពណ៌ប្រផេះខ្មៅ ។ ផ្នែកចំហៀងសងខាងមានពណ៌ប្រផេះស្រាល និងពោះមានពណ៌ផ្កាឈូក ។

ជីវសាស្ត្រ: សត្វផ្សោតទាំងពីរប្រភេទនេះរស់នៅជាក្រុម ដែលមានចំនួនរហូតដល់១៥ក្បាល ។ ផ្សោតជាសត្វសកម្ម និងមានលក្ខណៈរហ័ស ហើយចូលចិត្តហែលដេញតាមក្បាលលូត ។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជាត្រី មីក និងបង្កា ។

របាយរស់នៅ: ក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជា វាមានវត្តមាននៅកោះរុង កោះរុងសាលីម និងកោះតាងនៅតំបន់ភាគខាងលិច និងខាងកើតនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌា មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក និងតាមតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសផ្សេងៗ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្សោតច្រមុះដបចំពុះខ្លី និងផ្សោតច្រមុះដបចំពុះវែង ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជី IUCN (DD) ជាប្រភេទមិនទាន់មានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅលើពិភពលោក ។ ប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រក និងការនេសាទជលផលសមុទ្រ ។

Indo-Pacific/Common Bottlenose Dolphin

Tursiops aduncus/Tursiops truncatus



© Pete Davidson

ផ្សោតក្របី

ភិនភាគ: ដងខ្លួនមានពណ៌ខ្មៅ រីប្រផេះក្រមៅលើកលែងតែផ្នែកខាងក្រោមមានពណ៌ប្រផេះស្រាល។ ព្រួយខ្នងបញ្ឈរ និងខាងចុងរាងមូល។ ធ្មេញជួរខាងលើវែងជាងធ្មេញជួរខាងក្រោមពី ៣-៤ ស.ម។ កូនដែលទើបកើតប្រវែង១,៦-១,៩ម នៅពេលពេញវ័យអាចមានប្រវែង ៥-៦ម និងមានទម្ងន់ប្រមាណ១៣៦០គ.ក។

ជីវសាស្ត្រ: ផ្សោតក្របីរស់នៅជាក្រុម ដែលអាចមានចំនួនរហូតដល់៦០ក្បាល។ ជួនកាលគេប្រទះឃើញរស់នៅជាមួយផ្សោតច្រមុះដបផងដែរ។ វាជាសត្វដែលមានកំលាំងខ្លាំង និងហែលទឹកបានលឿន។ ចំណីអាហាររបស់វាមានដូចជា ត្រី មីក បង្កា និងពពួកថនិកសត្វទឹក ដែលមានទំហំតូចជាងវា។

របាយរស់នៅ: ក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាគេបានប្រទះឃើញផ្សោតប្រភេទនេះនៅក្បែរកោះរុងសាលីម និងមានវត្តមាននៅកន្លែងទឹកជ្រៅ តំបន់ត្រូពិចដែលមានសីតុណ្ហភាពក្ដៅល្មម។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ផ្សោតខ្មៅជាប្រភេទសត្វដែល បានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LR) ជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចលើពិភពលោក និងនៅតាមតំបន់កំណត់ដែលមានវត្តមានពួកវា។

False Killer Whale

Pseudorca crassidens



© Pete Davidson

ផ្សេងគ្នាក្បាលធំ

ភិក្ខុភាគៈ ផ្សេងគ្នាក្បាលធំមានដងខ្លួនធំក្រាស់ ហើយមានពណ៌ប្រផេះក្រមៅ ឬ ខ្មៅស្រីល។ កន្លែងខ្លះនៃទ្រូងពណ៌ប្រផេះស្រាល។ ក្បាលមានរាងមូលមាំ ព្រួយខ្នងមូលធំ ដែលមានបាតធំទូលាយស្ថិតនៅទីតាំង ១/៣ ពីក្បាល។ កូនទើបកើតមានប្រវែងៈ ១,៤ - ១,៨៥ម និងមានទម្ងន់ពី ៣៧-៨៤គ.ក ហើយនៅពេលវាពេញវ័យអាចមានប្រវែងពី ៥,៣ - ៧,២ម។

ជីវសាស្ត្រៈ ផ្សេងគ្នាក្បាលធំចូលចិត្តរស់នៅ និងរកចំណីអាហារជាហ្វូងដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ ៣០ក្បាល នៅតាមបណ្តាឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទឹកជ្រៅៗ ហើយវាតែងតែរំហែលយ៉ាងជិតៗតាមបណ្តោយក្បាលទឹក។ ជួនកាលគេប្រទះឃើញប្រភេទនេះរស់នៅជាមួយផ្សេងៗច្រើនដប។ វាជាសត្វរកចំណីអាហារនៅពេលយប់ និងពេលព្រលឹមដែលចំណីសំខាន់របស់វាគឺត្រី។ ផ្សេងគ្នាក្បាលធំញឹកអាច បន្តពូជរហូតដល់អាយុប្រហែល ៣៥ឆ្នាំ និងបំបៅដោះកូនរហូតដល់អាយុ ១៥ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។

របររស់នៅៈ មាននៅកម្ពុជាដែលបានការកត់ត្រាចំនួន១ក្បាលតាមរយៈការជាប់កើលនៅឆ្នេរតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានវត្តមាននៅតំបន់ត្រូពិចក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅល្មម និងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់ភាគខាងជើងក្នុងតំបន់ទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់។

ស្ថានភាពអភិរក្សៈ ផ្សេងគ្នាក្បាលធំជាប្រភេទដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (LR) ជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចលើពិភពលោក ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទនេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការនេសាទ និងការប្រែប្រួលដែនតំបន់ ដែលពួកវាធ្លាប់រស់នៅ និងរកចំណី ។

Short-finned Pilot Whale

Globicephala macrorhynchus



© Graeme Cresswell

បាឡែន

កិនភាគ: បាឡែនមួយក្បាលត្រូវបានប្រទះឃើញអណ្តែតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ គ្រោងឆ្អឹងទាំងមូលត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅស្នាក់ការអធិការកិច្ច នៃរដ្ឋបាល ជលផលក្រុងព្រះសីហនុ ។ វាមិនទាន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយ ប៉ុន្តែវាអាចកំណត់ បានថាប្រហែលជាប្រភេទបាឡែន *Bryde's Whale Balaenoptera edeni* រឺក៏ *Fin Whale Balaenoptera physalus* ។

ជីវសាស្ត្រ: បាឡែនប្រភេទនេះអាចប្រទះឃើញតែមួយ ឬជាក្រុមតូចៗ ។ វាអាចមុជទឹកជម្រៅ រហូតដល់ជាង ២០០ម និងមានអាយុវែងរហូតដល់ ៩០ឆ្នាំ ។

របាយរស់នៅ: ក្រៅពីការប្រទះឃើញសាកសពនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជា បាឡែនប្រភេទនេះ មានការអះអាងថាមានវត្តមាននៅខេត្តកោះកុងក្បែរកោះរុង ប៉ុន្តែពុំទាន់កំណត់ពីភិនភាគច្បាស់ លាស់ គឺបាឡែនមាននៅតាមបណ្តាសមុទ្រក្នុងពិភពលោកយើងនេះ ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: បាឡែនជាប្រភេទដែល បានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (DD) ជាប្រភេទមិន ទាន់មានព័ត៌មាន ទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់លើពិភពលោក និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ នៃអនុ សញ្ញា CITES ។ គេកម្រឃើញ មានវត្តមានបាឡែន នេះនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជា ណាស់ព្រោះ ជំរៅទឹកភាគដែលពុំអាចអោយបាឡែនហែលរកចាប់ចំណីបានដោយងាយស្រួល ។

Baleen Whales

Balaenoptera sp.



ជ្រូកទឹក

កំណត់: វាមានទំហំធំប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្សោតដែរ ប៉ុន្តែវាធាត់ជាងហើយមានភ្នែកខ្ពស់ដូចដំរី ដែលដុះចេញពី អញ្ចាញធ្មេញ និងមានព្រួយចំហៀងធំរាងដូចជ្រូកទឹក ។ វាមានស្បែករលោងពណ៌ ត្នោតប្រផេះក្រមៅ និងដុះរោមមួយ ។ វន្តច្រមុះស្ថិតនៅទីតាំងចុងច្រមុះ ហើយមានសន្ទះគ្រប សម្រាប់បិទនៅពេលវាមុជទៅក្នុងទឹក ។ ប្រវែងទើបកើត១-១,៥ម ពេញវ័យ ៣,៣-៤,១ម និង ទម្ងន់ ទើបកើត ២៥-៣៥គ.ក ពេញវ័យ ១០០០គ.ក ។

ជីវសាស្ត្រ: ជ្រូកទឹករស់នៅជាក្រុមដែលមានចំនួនរហូតដល់រាប់រយ ដោយធ្វើចលនាឃើតៗ ក្នុងល្បឿនមធ្យមប្រមាណ ១០គ.ម/ម ។ ហើយចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ដែលមានទឹករាក់ៗ និង សំបូរទៅដោយស្មៅសមុទ្រដែលជាចំណីអាហាររបស់វា ។

របាយរស់នៅ: សត្វប្រភេទនេះមាននៅដែនសមុទ្រកម្ពុជាតាមតំបន់មានស្មៅសមុទ្រនៃខេត្ត កោះកុង ឆក់ពង់សោម កោះរុង និង កោះរុងសន្លឹម ហើយសព្វថ្ងៃមាននៅខេត្តកំពត និង ក្រុង កែបតែប៉ុណ្ណោះ ។ គេបានរកឃើញផងដែរនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរមហាសមុទ្រឥណ្ឌា និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ប៉ែកខាងលិច ។

ស្ថានភាពអភិរក្ស: ជ្រូកទឹកជាប្រភេទមានដោយកម្រ និងបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោក ប្រភេទនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ ១ របស់ អនុសញ្ញា សាយតេស ។

Dugong

Dugong dugon



© Mark Goodchild

កំណត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពអភិរក្សពូកថនិកសត្វ

ក. តារាងឧបសម្ព័ន្ធ សាយតេស (CITES)

សាយតេស គឺជាអនុសញ្ញាស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់។ គ្រប់សំណាកនៃប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃក្នុងប្រតិបត្តិការនៃ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទាំងបីរបស់អនុសញ្ញានេះ និងដែល មានការធ្វើនិយ័តកម្ម ឬ ដាក់បញ្ញត្តិដោយឡែកពីគ្នាតាមកំណត់សង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

ប្រភេទក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ I រួមមានប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលកំពុងទទួល រងគ្រោះថ្នាក់ ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជទាំងស្រុង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសំណាកនៃប្រភេទ នេះត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាត លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសតែមួយគត់។

ប្រភេទក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ II រួមមានប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃ ដែលនាពេល បច្ចុប្បន្នមិនទាន់ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជ ប៉ុន្តែវាអាចនឹងវិនាសផុតពូជ បើសិនជាគ្មានការដាក់បញ្ញត្តិ ត្រួតពិនិត្យ និងការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើប្រភេទទាំងនេះ។ ទោះបីជាមានប្រភេទខ្លះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនេះបានទទួលការការពារ ឬត្រួតពិនិត្យរួចហើយក៏ដោយ ក៏ទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាបន្ថែម ទៀត បើពុំនោះទេ វានឹងឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជជាមិនខាន។

ប្រភេទក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ III រួមមានប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលត្រូវបាន ទទួលការការពារ និងធ្វើនិយ័តកម្មស្របតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់របស់ភាគី ដែលជាម្ចាស់ដើមនៃ ប្រភេទ(ប្រទេសសាមីនៃប្រភេទសត្វ ឬរុក្ខជាតិ)ឬប្រភេទដែលត្រូវស្នើសុំឱ្យមានកិច្ចសហ- ប្រតិបត្តិការពីប្រទេសជាសមាជិកអនុសញ្ញា ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ និងធ្វើនិយ័តកម្មលើការធ្វើ អាជីវកម្មប្រភេទនោះនៅក្នុងយុត្តាធិការនៃដែនទឹកដីរៀងៗខ្លួន។

ខ. ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារ អភិរក្សពូកថនិកសត្វនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- អនុសញ្ញា សាយតេស (CITES) ១៩៧៣ (កម្ពុជាចូលជាសមាជិក ០២-តុលា- ១៩៩៧)
- អនុសញ្ញា ស្តីពី ជីវចម្រុះ (Convention on Biological Diversity) ១៩៩២ កម្ពុជាចូលជាសមាជិក (០៩-កុម្ភៈ-១៩៩៥) រដ្ឋសភាផ្តល់សច្ចាប័ន(២០០៦)
- ច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ (ចូលជាធរមាន ៣១-សីហា-២០០២)
- ច្បាប់ ស្តីពី ជលផល (ចូលជាធរមាន ២១-ឧសភា-២០០៦)

- ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៥/១៤៩ ចុះថ្ងៃទី ២១-មីនា-២០០៥ ស្តីពី ការកំណត់ ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិ សម្រាប់ជាមិច្ឆ្យប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
- អនុក្រឹត្យលេខ៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩-ឧសភា-២០០៦ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ។

គ.និយមន័យចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាសត្វតាមការវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ជីក្រហម របស់អង្គការសហភាពអភិរក្សពិភពលោក IUCN ឆ្នាំ ២០០៦

- Extinct (EX)** សំដៅដល់ប្រភេទ " វិនាសផុតពូជទាំងស្រុង " គ្មានការសង្ស័យណាមួយ ដែលបង្ហាញថា មានសត្វចុងក្រោយមួយក្បាលទើបនឹងស្លាប់ឡើយ ។ ប្រភេទនេះត្រូវបានគេជឿ ជាក់ថាវាផុតពូជបាត់ទៅហើយនៅពេល ដែលគេបានចុះអង្កេតស្រាវជ្រាវច្រើនដង និង/ ឬ នៅទីជម្រកដែលបាន គិតទុកតាមពេលវេលាពិតប្រាកដ ហេតុការណ៍កើតមានតាមថ្ងៃ រដូវកាល និងតាមឆ្នាំ) និងតាមរយៈប្រវត្តិផែន រស់នៅដើម្បីកត់ត្រាអំពីសត្វណា មួយ ។ ការអង្កេតទាំងឡាយគួរតែធ្វើឱ្យបានច្រើនសារច្រើនជាន់ការ អង្កេតលើវដ្តជីវិត និងការរស់នៅនៃប្រភេទនោះ ។
- Critically Endangered (CR)** សំដៅដល់ប្រភេទ " កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនាស ផុតពូជបំផុត " នៅពេលដែលមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បង្ហាញថាវាកំពុង តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត ដែលអាចនឹងវិនាសផុតពូជទាំងស្រុង នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ។
- Endangered (EN)** សំដៅដល់ប្រភេទ " កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ " នៅពេលដែលមាន ភស្តុតាងច្បាស់លាស់បង្ហាញថា វាកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ដែលអាចនឹងវិនាស ផុតពូជនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ។
- Vulnerable (VU)** សំដៅដល់ប្រភេទ " ងាយរងគ្រោះថ្នាក់ " នៅពេលដែលមានភស្តុតាង ច្បាស់លាស់បង្ហាញថា វាកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចឈាន ទៅរកវិនាសផុតពូជ នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ។
- Near threatened (NT)** សំដៅដល់ប្រភេទ " ជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ " ដែលវាត្រូវបានជំទាស់ ទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យនៃសៀវភៅក្រហម ព្រោះវាមិនអាចចាត់ថ្នាក់ទៅក្នុង ក្រុមទាំងបីខាងលើ ក្នុងពេលនេះបាន ប៉ុន្តែវាឈានទៅរកការចាត់ចូល ក្នុងថ្នាក់ណាមួយនៃថ្នាក់ទាំងបី ខាងលើ នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។

Least concern (LC) សំដៅដល់ប្រភេទ " រងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច " ដែលវាត្រូវបានជំទាស់ទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យខាងលើ ព្រោះវាមិនអាចចាត់ថ្នាក់ទៅក្នុងក្រុមណាមួយក្នុងក្រុមទាំងបួនខាងលើ។ ការកើនចំនួន និងការរាយប៉ាយប្រភេទ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះ ឬ អាស្រ័យលើស្ថានភាពអភិរក្សតាមតំបន់ជាក់លាក់ របស់ប្រភេទនោះ ។

Data deficient (DD) សំដៅដល់ប្រភេទ " ពុំមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ " សម្រាប់វាយតម្លៃភាពរងគ្រោះថ្នាក់វាទាំងដោយផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់ ដោយគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើស្ថានភាព រហ័យ រស់នៅ ឬ ចំនួនរស់នៅតាមភូមិសាស្ត្ររបស់វា។ ប្រភេទក្នុងការវិនិច្ឆ័យនេះ អាចនឹងត្រូវសិក្សាបានល្អ និងយល់ដឹងច្រើនពីជីវសាស្ត្ររបស់វា ប៉ុន្តែទិន្នន័យពិតប្រាកដអំពីភាពសំបូរលើសលប់ និង/ឬ រហ័យរស់នៅរបស់វា នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ ។

ប្រភេទក្នុងក្រុមវិនិច្ឆ័យ " ពុំមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ " នេះមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃក្រុម " រងគ្រោះថ្នាក់ " នោះទេ ។ ការចាត់ថ្នាក់ ប្រភេទក្នុងក្រុមនេះបញ្ជាក់ថា ត្រូវមានព័ត៌មានបន្ថែម និងត្រូវដឹងលទ្ធភាពរបស់វា ដែលការស្រាវជ្រាវខាងមុខនឹងបង្ហាញថា ការចាត់វាចូលក្នុងក្រុម " រងគ្រោះថ្នាក់ " គឺពិតជាទំនង ឬ សមរម្យហើយ ។

Not evaluated (NE) សំដៅដល់ប្រភេទ " មិនទាន់សិក្សាវាយតម្លៃ " នៅឡើយ ។ វាជាប្រភេទដែល ជំទាស់នឹងការចាត់ថ្នាក់ ឬ មិនអាចចាត់ចូលក្នុងថ្នាក់តាមការវិនិច្ឆ័យនៃសៀវភៅក្រហម ។

ប្រភេទឋានិកសត្វនៅកម្ពុជា

ចំនា់	ឈ្មោះខ្មែរ	Scientific name	English Name	IUCN/CITES	Status
12	កង្កែបក្បាលជួរ	<i>Dendrogale murina</i>	Mainland Slender-tailed Treeshrew	II	C
14	កង្កែប	<i>Tupaia belangeri</i>	Northern Treeshrew	II	C
18	កំប្លោកប្លែងប្លែង	<i>Callosciurus caniceps</i>	Grey Bellied Squirrel		
20	កំប្លោក	<i>Ratufa bicolor</i>	Black Giant Squirrel	II	C
22	កំប្លោក	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	Variable Squirrel		C
24	កំប្លោកខ្លាច	<i>Callosciurus erythra</i>	Pallas Squirrel		
26	កំប្លោក ដំ	<i>Petaurista sp.</i>	Giant Flying Squirrels		C
28	កំប្លោក តូច	<i>Hylopetes spp.</i>	Small Flying Squirrels		
30	កង្កែប	<i>Tamias spp</i>	Striped Tree Squirrels		C
32	កង្កែប	<i>Menetes berdmorei</i>	Berdmore's Squirrel		C
36	ប្រដា	<i>Hystrix brachyura</i>	East Asian Porcupine	VU	C
38	ប្រដា	<i>Atherurus macrourus</i>	Asian Brush-tailed Porcupine		C
42	កង្កែប	<i>Rat spp.</i>	Rat		
44	កង្កែប	<i>Rhizomys</i>	Bamboo Rat		
48	ប្រដា		Insectivorous Bats		
50	ប្រដា		Carnivorous Bats		

ប្រភេទឋានិកសត្វនៅកម្ពុជា

52	ប្រូចូរ៉ូ	<i>Taphozous theobaldi</i>	Tomb Bat			C
54	ប្រូចូរ៉ូ		Horseshoe and Roundleaf Bats			
56	ប្រូចូរ៉ូអ៊ូម៉ាម		Free-tailed Bats			
58	ត្រីសង់ ជ្រឹងច្បុម ជ្រឹងតាខ	<i>Pteropus sp.</i>	Large Fruit Bats - Flying foxes		II	
60	ជ្រឹងអ៊ូម៉ាម		Small Fruit Bats			
64	មាឃម្ពង់	<i>Hylobates pileatus</i>	Pileated Gibbon	VU	I	C
66	មាឃម្ពង់ឈ្លើង	<i>Nomascus gabriellae</i>	Yellow-cheeked Crested Gibbon	VU	I	C
68	អ៊ីប្រូនេន៖	<i>Nycticebus bengalensis</i>	Northern Slow Loris	DD	I	
70	អ៊ីប្រូអ៊ីដ	<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Pygmy Loris	VU	I	
72	ស្វាព្រឹត្ត 1 ស្វាឆ្មុយ ស	<i>Pygathrix nigripes</i>	Black-Shanked Douc Langur	EN	I	C
74	ស្វាព្រៃស	<i>Macaca leonina</i>	Northern Pig-tailed Macaque	VU	II	C
76	ស្វាព្រៃម	<i>Macaca fascicularis</i>	Long-tailed Macaque	LR/nt	II	C
78	ស្វាអម្ពង់	<i>Macaca arctoides</i>	Stump-tailed Macaque	VU	II	C
80	ស្វាព្រៃម	<i>Trachypithecus germaini</i>	Silvered Langur	DD	II	C
82	ផ្កាបា	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Sunda Colugo			C
86	បាដ្រូ	<i>Manis javanica</i>	Sunda Pangolin	LR/nt	II	C
90	ម៉ែនចក	<i>Canis aureus</i>	Golden Jackal	EN		C

ប្រភេទជីវិតសត្វនៅកម្ពុជា

92	ផ្លែព្រា	<i>Cuon alpinus</i>	Dhole	EN	II	C
96	ខ្លាប្លង់	<i>Ursus thibetanus</i>	Asian Black Bear	VU	I	C
98	ខ្លាសត្វ	<i>Ursus malayanus</i>	Sun Bear	DD	I	C
102	ជ្រូកព្រា	<i>Sus</i>	Wild Pig			C
106	សំពោលក្បាលរឹង	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten		III	C
108	សំពោលធំ	<i>Viverra zibetha</i>	Large-spotted Civet			C
110	ខ្លា	<i>Viverra zibetha</i>	Large Indian Civet		III	C
112	សំពោលស្លឹក	<i>Viverricula indica</i>	Small Indian Civet			C
114	សំពោលក្រមុំ	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Common Palm Civet		III	C
116	សំពោលពណ៌ក្រហម	<i>Paguma larvata</i>	Masked Palm Civet		III	C
118	សំពោលអុជខ្លា	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Small-toothed Palm Civet			
120	ក្រំដង្កូវ	<i>Hemigalus owstoni</i>	Owston's Civet	GT	I	
122	សំពោលស្លឹក	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong			C
124	ជ្រូកព្រា	<i>Arctonyx collaris</i>	Hog Badger			C
126	ផ្កា	<i>Melogale sp</i>	Ferret Badger			C
128	ក្រំដង្កូវ	<i>Prionodon pardicolor</i>	Spotted Linsang	NT	I	C
130	ស្លាប	<i>Herpestes javanicus</i>	Small Asian Mongoose		III	C
132	ស្លាប	<i>Herpestes urva</i>	Crab-eating Mongoose		III	C

ប្រភេទធម្មជាតិកសិកម្មនៅកម្ពុជា

136	អន្ទូលលាង	<i>Lutrogale perspicillata</i>	Smooth-coated Otter	VU	II	C
138	អណ្តាមប្រូមុះ	<i>Lutra sumatrana</i>	Hairy-nosed Otter	DD	II	C
140	អន្ទូល	<i>Aonyx cinerea</i>	Oriental Small-clawed Otter	NT	II	C
144	ខ្លាច រឺ ខ្លាចបង	<i>Panthera tigris</i>	Tiger	EN	I	C
146	ខ្លាខ្លី	<i>Panthera pardus</i>	Leopard		I	C
148	ខ្លាពោក	<i>Pardofelis nebulosa</i>	Clouded Leopard	VU	I	C
150	ខ្លាប្រីស៊ីន	<i>Pardofelis marmorata</i>	Marbled Cat	VU	I	C
152	ខ្លាឈ្មើមាស	<i>Catopuma temminckii</i>	Asian Golden Cat	VU	I	C
154	ខ្លាច្រី	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Fishing Cat	VU	II	C
156	ផ្កាព្រៃ	<i>Felis chaus</i>	Jungle Cat		II	C
158	ផ្កាឯវ៉ា	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Leopard Cat		I	C
162	ដំរី	<i>Elephas maximus</i>	Asian Elephant	EN	I	C
166	រមាសរាយមួយ	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Lesser One-horned Rhinoceros	CR	I	C
170	ក្អែងព្រៃតូច រឺ ផ្កាតូច	<i>Tragulus javanicus</i>	Lesser Oriental Chevrotain			C
172	ក្អែង	<i>Axis porcinus</i>	Hog Deer	DD	I	C
174	ល្អិត	<i>Muntiacus muntjak</i>	Red Muntjac			C
176	ល្អិតយក្ស	<i>Muntiacus vuquangensis</i>	Large-antlered Muntjac	DD	I	
178	ប្រីស៊ីនស្បែក	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar			C
180	អម្ពា	<i>Cervus eldi</i>	Eld's Deer	VU	I	C
184	ខ្លា	<i>Bos gaurus</i>	Gaur	VU	I	C

ប្រភេទជីវិតសត្វនៅកម្ពុជា

186	ក្របីព្រៃ	<i>Bubalus arnee</i>	Wild Water Buffalo	GT	II	C
188	គោព្រៃ	<i>Bos sauveli</i>	Kouprey	CR	I	C
190	មន្រ្តាង	<i>Bos javanicus</i>	Banteng	EN		C
192	ក្រៃ	<i>Naemorthedus sumatraensis</i>	Southern Serow	VU	I	C
196	មន្រ្តាង	<i>Lepus peguensis</i>	Siamese Hare			C
200	ម្លោតត្បូងប្រមាញ់	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	Finless Porpoise	DD	I	C
202	ម្លោតឈ្មាំ ផ្កាឫក	<i>Sousa chinensis</i>	Indo-Pacific Hump-backed Dolphin	DD	I	C
204	ម្លោតក្បាលក្រអឺក	<i>Orcaella brevirostris</i>	Irawaddy Dolphin	DD	II	C
206	ម្លោតមុន	<i>Stenella attenuate</i>	Pantropical Spotted Dolphin		II	
208	ម្លោត ឈ្មុល	<i>Stenella longirostris roseiventris</i>	Dwarf Spinner Dolphin		II	C?
210	ម្លោតក្រមុះវង់ខ្លី និងវែង	<i>Tursiops aduncus/Tursiops truncatus</i>	Indo-Pacific Common Bottlenose Dolphin		II	
212	ម្លោតក្របី	<i>Pseudorca crassidens</i>	False Killer Whale		II	
214	ម្លោតក្បាលធំ	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Short-finned Pilot Whale		II	
216	ចម្លើង	<i>Balaenoptera sp.</i>	Baleen Whales		I	
218	ជ្រូកទឹក	<i>Dugong dugon</i>	Dugong	VU	II	C

សត្វល្អិត spp. (គ្រប់ប្រភេទសត្វល្អិតក្នុងក្រុមនេះ)

sp. (ប្រភេទ)



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

លេខ០២០.....ប្រក.កសក

ប្រ ក ១ ស

ស្តីពី

បំណាច់ថ្នាក់ និង បញ្ជីឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃ

២០ ១៥ ៥០ ១៥

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រម លេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករាឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
- បានឃើញព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/០៨០២/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០២ ដែលប្រកាសអោយប្រើប្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈើ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការ ប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ ទៅជារដ្ឋបាលព្រៃឈើ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៥០៩ ប្រក.កសក.បុ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ
- តាមសំណើរបស់ប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

ស វ ១ ម ប

ប្រការ១ .-

ពពួកសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ និង ជាសមាសភាគនៃធនធានព្រៃឈើដែលរួមមាន៖ ពួកចំនីកសត្វ បក្សីសត្វ ឧរុងសត្វ បាណកសត្វ និង សត្វឥតឆ្អឹងកងផ្សេងៗទៀត ព្រមទាំងកូនរបស់វា។ ពពួកសត្វ ព្រៃទាំងអស់នេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ការអភិរក្សដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលត្រី និង សត្វបង្កក់ឈើតក់ក្នុងទឹក ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ចាត់ថ្នាក់ពពួកសត្វព្រៃជាក្រុមត្រូវឈរលើលក្ខខណ្ឌសង្គម សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថានជាក់ស្តែង ផ្នែកតាមព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិ ឬ អន្តរជាតិ ។

ប្រការ២ .-

គ្រប់ប្រភេទសត្វព្រៃទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុមគឺ៖

១-ក្រុមប្រភេទសត្វព្រៃទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិ : គឺជាប្រភេទសត្វព្រៃទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិ ដែលចំពោះមុខដង់ស៊ីតេនៃសារព័ន្ធ និង ភូមិសាស្ត្រនៃទីជម្រករបស់វាត្រូវបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងជាងសត្វក្នុងរយៈពេលដប់ (១០) ឆ្នាំចុងក្រោយ ឬក្នុងរយៈពេល បី(៣) ឆ្នាំ ជំនាន់តំណពូជ នៅក្នុងធម្មជាតិ និង ជាប្រភេទដែលមានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ព្រមទាំងមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ។ ឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃ ប្រកាសនេះ ។

២-ក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ : គឺជាប្រភេទសត្វព្រៃទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិ ដែលចំពោះមុខដង់ស៊ីតេនៃសារព័ន្ធរបស់វាមានកម្រិតទាប កម្រជួបប្រទះ ឬ មានដោយកម្រ ដែលអាចជួបប្រទះតែនៅក្នុងទីជម្រកណាមួយជាក់លាក់ ឬ ជាស្ថានីយប្រភេទ និង អាចប្រឈមមុខចំពោះការគំរាមកំហែង ឈានទៅរកការផុតពូជនៅក្នុងធម្មជាតិ ។ ឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រភេទមានដោយកម្រ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី២ នៃប្រកាសនេះ ។

៣-ក្រុមប្រភេទមានដោយបង្ក : គឺជាប្រភេទសត្វព្រៃទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិ ដែលចំពោះមុខដង់ស៊ីតេនៃសារព័ន្ធរបស់វាមានកម្រិតច្រើនបង្ក មានរបាយទូលំទូលាយ មានសក្តានុពលបន្តពូជឆាប់រហ័ស និង រងការគំរាមកំហែង តិចតួចក្នុងតម្រូវការសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ។ ប្រភេទសត្វព្រៃក្នុងក្រុមមានដោយបង្ក រួមមានប្រភេទសត្វដែលមិនបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ និង ក្រុមមានដោយកម្រ ។ ឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃ ក្នុងក្រុមមានបង្ក ត្រូវបានកំណត់ក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី៣ នៃប្រកាសនេះ ។

ប្រការ៣ .-

ឈ្មោះប្រភេទ ឬ អនុប្រភេទសត្វព្រៃក្នុងក្រុមនីមួយៗ ត្រូវមានឈ្មោះប្រើជាភាសាជាតិ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ និង ឈ្មោះធ្លាប់ប្រើ ហើយត្រូវមានកំណត់សម្គាល់ប្រភេទតាមឧបសម្ព័ន្ធរបស់អនុសញ្ញាសាយតេស(CITES) ។

ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មឧបសម្ព័ន្ធទី I II III នៃប្រភេទសត្វព្រៃក្នុងអនុសញ្ញាសាយតេស ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដូចបានកំណត់ក្នុងប្រការ១ នៃប្រកាសនេះ ។ សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងសាយតេសកម្ពុជាត្រូវបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ ជូនដំណឹងជាសាធារណៈនូវសេចក្តីសម្រេចលើវិសោធនកម្មឧបសម្ព័ន្ធទាំងបី នៃអនុសញ្ញាសាយតេស ។

ប្រការ៤ .-


ផ្អែកលើព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រ និង របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ រដ្ឋបាលព្រៃឈើអាចលើកសំណើរធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ចំពោះប្រភេទ សត្វព្រៃដែលរកឃើញថ្មី និង សំណើរកែប្រែ ឬ ផ្លាស់ប្តូរប្រភេទសត្វព្រៃណាមួយ ចេញពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយទៀត ដែលបានកំណត់ក្នុងប្រការ២ នៃប្រកាសនេះមកក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្រេចតាមការចាំបាច់ ។

ប្រការ៥ .-

បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលផ្ទុយពីប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍ ។

ប្រការ៦ .-

អគ្គនាយកនៃក្រសួង អគ្គាធិការ លេខាធិការដ្ឋាននាយកដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន ប្រធាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវ អនុវត្តប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។



រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ២០០៧

កន្លែងទទួល:

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រៃឈើ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រៃទឹកដ្ឋាន
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- គ្រប់សាលាខេត្ត-ក្រុង
- ដូចប្រការ៦
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ



ស្នងការ



ឧបសម្ព័ន្ធ ភ្ជាប់ប្រកាសលេខ ០២០ ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៧
ក្រុមប្រភេទវិស្វកម្ម

ក. ជីវិតសត្វ

ល.រ	ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	សាយភេស
1	ក្តាន់	<i>Axis porcinus</i>	Hog Deer	I
2	ក្រចិព្រៃ	<i>Bubalus arnee</i>	Wild Water Buffalo	III
3	ខ្លឹងរឿង, ខ្លឹងពស់	<i>Pseudonovibos spiralis</i>	Khting Vor	
4	ខ្លាប្រាំ	<i>Ursus thibetanus</i>	Asiatic Black Bear	I
5	ខ្លាជំ ឬ ខ្លាជំបង	<i>Panthera tigris</i>	Tiger	I
6	ខ្លាពពក	<i>Neofelis nebulosa</i>	Clouded Leopard	I
7	គោព្រៃ	<i>Bos sauveli</i>	Kouprey	I
8	ដំរី	<i>Elephas maximus</i>	Asian Elephant	I
9	រមាស	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Javan Rhinoceros	I
10	រមាំង	<i>Cervus eldii</i>	Eld's Deer	I

ក្រុមប្រភេទឈ្មោះដោយកម្រ

ក. ជីវិតសត្វ

ល.រ	ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	សាយភេស
1	កែវ	<i>Naemorhedus sumatraensis</i>	Southern Serow	I
2	កំប្រុកធំ	<i>Ratufa bicolor</i>	Black Giant Squirrel	II
3	កំប្រុកស្លាបភ្នំ	<i>Hylopetes alboniger</i>	Particoloured Flying Squirrel	
4	កំពឹងដូងអុជ	<i>Prionodon pardicolor</i>	Spotted Linsang	I
5	ខ្លឹង	<i>Bos gaurus</i>	Gaur	I
6	ខ្លាភ្លឺចូកែវ	<i>Pardofelis marmorata</i>	Marbled Cat	I
7	ខ្លាវន្ត	<i>Panthera pardus</i>	Leopard	I
8	ខ្លាលឿងមាស	<i>Catopuma temminckii</i>	Asian Golden Cat	I
9	ខ្លាប្រាំតូច	<i>Ursus malayanus</i>	Sun Bear	I
10	ផ្កាព្រៃ	<i>Cuon alpinus</i>	Dhole	II
11	ឆ្កាតកន្ទុយក្រហម	<i>Petaurista petaurista</i>	Giant Flying Squirrel	
12	ឆ្កាតកន្ទុយខ្មៅ	<i>Petaurista philippensis</i>	Indian Giant Flying Squirrel	
13	ឆ្កាព្រៃ	<i>Felis chaus</i>	Jungle Cat	II

14	ត្រីងពោះ	<i>Pteropus hypomelanus</i>	Island Flying-fox	II
15	ជ្រូកពោន, ជ្រូកព្រួល	<i>Arctonyx collaris</i>	Hog Badger	
16	ឈ្នួសយក្ស	<i>Megamuntiacus vuquangensis</i>	Large-antlered Muntjac	I
17	ទន្សោង	<i>Bos javanicus</i>	Banteng	
18	ទោចផ្កាល់លឿង	<i>Nomascus gabriellae</i>	Yellow-cheeked Gibbon	I
19	ទោចម្កុដ	<i>Hylobates pileatus</i>	Pileated Gibbon	I
20	ប្រព្រឹត្តិវង្ស	<i>Otomops wroughtoni</i>	Wroughton's Free-tailed Bat	
21	ពង្រួល	<i>Manis javanica</i>	Sunda Pangolin	II
22	តេត្យាល់សំប៉ែត	<i>Lutra lutra</i>	Eurasian Otter	I
23	តេត្យាច្រមុះ	<i>Lutra sumatrana</i>	Hairy-nosed Otter	II
24	រឿងប្រផេះ	<i>Nycticebus coucang</i>	Slow Loris	II
25	រឿងភ្លើង	<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Pygmy Loris	II
26	ស្វាត្រកាំក់ ឬ ស្វាត្រុយស	<i>Pygathrix nemaeus</i>	Douc Langur	I
27	ស្វាអង្គក់	<i>Macaca arctoides</i>	Stump-tailed Macaque	II

ក្រុមប្រភេទសត្វជាយមន្ត្រី

ក. មីសត្វ

ល. រ	ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	សាយភពស
1	កង្កែប	<i>Tamias maritimus</i>	Eastern Striped Squirrel	
2	កង្កែបកម្ពុជា	<i>Tamias rodolphii</i>	Cambodian Striped Tree Squirrel	
3	កង្កែប	<i>Menetes berdmorei</i>	Berdmore's Squirrel	
4	កណ្តុរភ្នំធំ	<i>Rhizomys sumatrensis</i>	Large Bamboo Rat	
5	កង្កែប ឬ កណ្តុរ	<i>Tupaia belangeri</i>	Northern Treeshrew	II
6	កង្កែបកណ្តុរ	<i>Dendrogale murina</i>	Northern Smooth-tailed Treeshrew	II
7	កំប្រុកក្នុង	<i>Callosciurus erythraeus</i>	Pallas's Squirrel	
8	កំប្រុកផ្កាល់ក្រហម	<i>Dremomys rufigenis</i>	Red-cheeked Squirrel	
9	កំប្រុកពណ៌	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	Variable Squirrel	
10	កំប្រុកពោះប្រផេះ	<i>Callosciurus caniceps</i>	Grey-bellied Squirrel	
11	កំប្រុកស្វាប	<i>Hylopetes phayrei</i>	Phayre's Flying Squirrel	
12	កំប្រុកស្វាបផ្កាល់ក្រហម	<i>Hylopetes spadiceus</i>	Red-cheeked Flying Squirrel	
13	កំប្រុកស្វាបរមេង	<i>Trogopterus pearsonii</i>	Hairy-footed Flying Squirrel	
14	កំពិលដូង	<i>Hemigalus owstoni</i>	Owston's Civet	

15	ក្ដាន់វែងតូច ឬ ផ្ទងតូច	<i>Tragulus javanicus</i>	Lesser Mousedeer	
16	ក្ដាន់វែងធំ ឬ ផ្ទងធំ	<i>Tragulus napu</i>	Greater Mousedeer	
17	ខ្លីន	<i>Viverra zibetha</i>	Large Indian Civet	III
18	ខ្លាត្រី	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Fishing Cat	II
19	ផ្កែចក	<i>Canis aureus</i>	Asiatic Jackal	III
20	ត្នាដាវ	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Leopard Cat	II
21	អ្នក	<i>Melogale personata</i>	Large-toothed Ferret Badger	
22	ជ្រឹងមធ្យម	<i>Pteropus lylei</i>	Lyle's Flying-fox	II
23	ជ្រឹងធំ	<i>Pteropus vampyrus</i>	Large Flying-fox	II
24	ជ្រឹងអង្គាមកន្ទុយខ្លី	<i>Megaerops niphanae</i>	Northern Tail-less Fruit Bat	
25	ជ្រឹងអង្គាមត្រមុះតូច	<i>Cynopterus brachyotis</i>	Lesser Short-nosed Fruit Bat	
26	ជ្រឹងអង្គាមត្រមុះធំ	<i>Cynopterus sphinx</i>	Greater Short-nosed Fruit Bat	
27	ជ្រឹងអង្គាមអណ្តាតធំ	<i>Macroglossus sobrinus</i>	Greater Long-tongued Fruit Bat	
28	ជ្រូកព្រៃ	<i>Sus scrofa</i>	Wild Pig	
29	ឈ្នួស	<i>Muntiacus muntjak</i>	Red Muntjac	
30	ទន្សាយគល់	<i>Lepus peguensis</i>	Burmese Hare	
31	ប្រថ្នែវ	(Order: CHIROPTERA)	Bats	
32	ប្រមា	<i>Hystrix brachyura</i>	East Asian Porcupine	
33	ប្រមោញ	<i>Atherurus macrourus</i>	Asian Brush-tailed Porcupine	
34	ប្រើស	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar	
35	សំពោតកលៀង ឬ កាំង	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten	III
36	សំពោតក្រអូប ឬ សំពោតត្នោត	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Common Palm Civet	III
37	សំពោតធំ	<i>Viverra megaspila</i>	Large-spotted Civet	III
38	សំពោតពិណលាត	<i>Paguma larvata</i>	Masked Palm Civet	III
39	សំពោតភ្នំ ឬ ឈ្នួសប្រែង	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong	III
40	សំពោតវល្លិ៍, ឈ្នួសវល្លិ៍	<i>Viverricula indica</i>	Small Indian Civet	III
41	សំពោតអុជខ្នង	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Small-toothed Palm Civet	
42	ស្ពាន់តូច	<i>Herpestes javanicus</i>	Small Asian Mongoose	
43	ស្ពាន់ធំ	<i>Herpestes urva</i>	Crab-eating Mongoose	III
44	ស្វាត្រាម	<i>Macaca fascicularis</i>	Long-tailed Macaque	II
45	ស្វាត្រោស	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed Macaque	II
46	ស្វាព្រាម	<i>Semnopithecus germaini</i>	Silvered Langur	II



KINGDOM OF CAMBODIA

Nation Religion King



**Ministry of Agriculture,
Forestry & Fisheries**



Nº: 020 PR.MAFF

PRAKAS

On

Classification and List of Wildlife Species

Minister of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)

- Seen the constitution of the Kingdom of Cambodia
- Seen the Royal Decree No NS/RKT/0704/124 dated 15 July 2004 on the appointment of the Royal Government of Cambodia.
- Seen the Royal Kram No 02/NS/94 dated 20 July 1994, which promulgated to use the law on the Organization and functioning of the Council of Ministers.
- Seen the Royal Kram No NS/RKT/0196/13 dated 24 January 1996, which promulgated to use the law on the establishment of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
- Seen the Royal Kram No NS/RKT/0802/016 dated 31 August 2002, which promulgated to use the law on Forestry.
- Seen the Sub-decree No 17 ANK/BK dated 07 April 2000 on the Organization and Functioning of MAFF.
- Seen the Sub-decree No 64 ANK/BK dated 11 September 2003 on the change of Department of Forestry and Wildlife to Forestry Administration.
- Seen Prakas No 509 BK/MAFF.B dated 17 September 2003 on the Organization and Functioning of the Forestry Administration.
- Pursuant to the request of the Director General of Forestry Administration.

HEREBY DECIDED

Praka 1.- (article)

All kinds of wildlife species in the Kingdom of Cambodia are State property and the component of forest resources, including all species of animals, birds, reptiles, amphibians, insects, other invertebrates, and their eggs or offspring. Such wildlife species are under the management, research and conservation of the Forestry Administration, except for fish and animal that breed in water.

The determination of (criteria for) classification of wildlife species shall be based on the actual conditions of social, economics, environment and national or international scientific information.

Praka 2.- (Definition of the three Wildlife Categories)

All wildlife species in the Kingdom of Cambodia shall be divided into three groups:

- 1- Group of Endangered Species: All wildlife species in the wild which is their population densities and geographic habitats has declined within the last period of 10years or within the last period of their three times generation or breeding in the wild. Species listed in this group are highly importance for scientific and economic value. All species listed in this group is attached as an annex 1 to this Prakas.
- 2- Group of Rare Species: All wildlife species in the wild which is low population densities, rarely seen or having rare in their population living in the any specific habitat or there is endemic species and it is maybe considered to be facing a risk of extinction in the wild. All species listed in this group is attached as an annex 2 to this Prakas.
- 3- Group of Common Species: All wildlife species in the wild which is fairly common population densities, their distributions are widespread, high potential breeding and low threatened in the social and economic demands. Species listed in this group includes all species are not listed in group of endangered and rare species. All species listed in this group is attached as an annex 3 to this Prakas.

Praka 3.-

Species or sub-species in each group shall have the names in national language, scientific and common name in English and represent CITES appendices.

Any amendment of species listing in CITES's appendices (I, II, III) shall be in accordance with the criteria stated in Praka 1 of this Prakas. The CITES Management Authority of Cambodia shall issue a public notification of the adapted results.

Praka 4.-

With reference to scientific information and reports, Forestry Administration can propose additional species or amendment the species listed in the groups stated in Praka 2 of this Prakas to the Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries for revision and necessary decision.

Praka 5.-

Any contrary provision to this Prakas shall be repealed.

Praka 6.-

General director of the Ministry, director of General Inspectorate, Cambodia CITES management authority, director of Cabinet, director general of Forestry Administration, directors of relevant departments under the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries shall implement this Prakas from the date of it is signed.

Phnom Penh, January 25, 2007

Receivers:

- The Ministry of the Royal Palace
- General Secretariat of the Senate
- General Secretariat of National Assembly
- Council of Ministers
- Cabinet of Prime Minister
- Ministry of Justice
- Ministry of Economics and Finance
- Ministry of Environment
- All municipals and provincial governors
- As stated in Praka 6
- Documents

Minister



Dr. Chan Sarun

ក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ (Group of Endangered Species)

ក.ថង់កសត្វ (Mammals)

ល. រ	ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	សាយភាយ
1	ក្តាន់	<i>Axis porcinus</i>	Hog Deer	I
2	ក្របីព្រៃ	<i>Bubalus arnee</i>	Wild Water Buffalo	III
3	ខ្លឹមវល្លិ៍, ខ្លឹមពស់	<i>Pseudonovibos spiralis</i>	Khting Vor	
4	ខ្លាម៉ូជំ	<i>Ursus thibetanus</i>	Asiatic Black Bear	I
5	ខ្លាធំ ឬ ខ្លាជំបង	<i>Panthera tigris</i>	Tiger	I
6	ខ្លាពពក	<i>Neofelis nebulosa</i>	Clouded Leopard	I
7	គោព្រៃ	<i>Bos sauveli</i>	Kouprey	I
8	ដំរី	<i>Elephas maximus</i>	Asian Elephant	I
9	រមាស	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Javan Rhinoceros	I
10	រមាំង	<i>Cervus eldii</i>	Eld's Deer	I

ក្រុមប្រភេទមានដោយកម្រ (Group of Rare Species)

ក.ថង់កសត្វ (Mammals)

ល. រ	ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	សាយភាយ
1	កែវ	<i>Naemorhedus sumatraensis</i>	Southern Serow	I
2	កំប្រុកធំ	<i>Ratufa bicolor</i>	Black Giant Squirrel	II
3	កំប្រុកស្លាបភ្នំ	<i>Hylopetes alboniger</i>	Particoloured Flying Squirrel	
4	កំពឹងដូងអុជ	<i>Prionodon pardicolor</i>	Spotted Linsang	I
5	ខ្លឹម	<i>Bos gaurus</i>	Gaur	I
6	ខ្លាភ្លឺចូកែវ	<i>Pardofelis marmorata</i>	Marbled Cat	I
7	ខ្លាខ្លី	<i>Panthera pardus</i>	Leopard	I
8	ខ្លាឃ្លីមាស	<i>Catopuma temminckii</i>	Asian Golden Cat	I
9	ខ្លាម៉ូតូ	<i>Ursus malayanus</i>	Sun Bear	I
10	ផ្តែព្រៃ	<i>Cuon alpinus</i>	Dhole	II

11	ឆ្មាតកន្ទុយក្រហម	<i>Petaurista petaurista</i>	Giant Flying Squirrel	
12	ឆ្មាតកន្ទុយខ្មៅ	<i>Petaurista philippensis</i>	Indian Giant Flying Squirrel	
13	ច្នាក់ព្រៃ	<i>Felis chaus</i>	Jungle Cat	II
14	ជ្រីងកោះ	<i>Pteropus hypomelanus</i>	Island Flying-fox	II
15	ជ្រូកពោន, ជ្រូកព្រល	<i>Arctonyx collaris</i>	Hog Badger	
16	ឈ្នួសយក្ស	<i>Megamuntiacus vuquangensis</i>	Large-antlered Muntjac	I
17	ទន្សោង	<i>Bos javanicus</i>	Banteng	
18	ទោតតាល់លឿង	<i>Hylobates gabriellae</i>	Yellow-cheeked Gibbon	I
19	ទោតអៀម	<i>Hylobates pileatus</i>	Pileated Gibbon	I
20	ប្រលៀងវង្ស	<i>Otomops wroughtoni</i>	Wroughton's Free-tailed Bat	
21	ពង្រួល	<i>Manis javanica</i>	Sunda Pangolin	II
22	កេក្យាលសំប៉ែត	<i>Lutra lutra</i>	Eurasian Otter	I
23	កេរោមច្រមុះ	<i>Lutra sumatrana</i>	Hairy-nosed Otter	II
24	រឿងប្រដេះ	<i>Nycticebus coucang</i>	Slow Loris	II
25	រឿងភ្លើង	<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Pygmy Loris	II
26	ស្វាត្រាំកំ ឬ ស្វាកន្ទុយស	<i>Pygathrix nemaeus</i>	Douc Langur	I
27	ស្វាអង្កត់	<i>Macaca arctoides</i>	Stump-tailed Macaque	II

ក្រុមប្រភេទមានដោយបង្កុះ (Group of Common Species)

ក. ម៉ែតសត្វ (Mammals)

ល. រ	ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ស្ថានភាព
1	កង្កែប	<i>Tamiops maritimus</i>	Eastern Striped Squirrel	
2	កង្កែបក្រដា	<i>Tamiops rodolphii</i>	Cambodian Striped Tree Squirrel	
3	កង្កែប	<i>Menetes berdmorei</i>	Berdmore's Squirrel	
4	កណ្តុរភ្នំ	<i>Rhizomys sumatrensis</i>	Large Bamboo Rat	
5	កន្ទឹក ឬ កល្លរឹក	<i>Tupaia belangeri</i>	Northern Treeshrew	II
6	កន្ទឹកក្បាលឆ្មា	<i>Dendrogale murina</i>	Northern Smooth-tailed Treeshrew	II
7	កំប្រុកក្នុង	<i>Callosciurus erythraeus</i>	Pallas's Squirrel	

8	កំប្រុកផ្កាល់ក្រហម	<i>Dremomys rufigenis</i>	Red-cheeked Squirrel	
9	កំប្រុកពិណ	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	Variable Squirrel	
10	កំប្រុកពោះប្រផេះ	<i>Callosciurus caniceps</i>	Grey-bellied Squirrel	
11	កំប្រុកស្លាប	<i>Hylopetes phayrei</i>	Phayre's Flying Squirrel	
12	កំប្រុកស្លាបផ្កាល់ក្រហម	<i>Hylopetes spadiceus</i>	Red-cheeked Flying Squirrel	
13	កំប្រុកស្លាបរោមជើង	<i>Trogopterus pearsonii</i>	Hairy-footed Flying Squirrel	
14	កំពឹងដូង	<i>Hemigalus owstoni</i>	Owston's Civet	
15	ក្ដាន់ញែងតូច ឬ ផ្លុងតូច	<i>Tragulul javanicus</i>	Lesser Mousedeer	
16	ក្ដាន់ញែងធំ ឬ ផ្លុងធំ	<i>Tragulul napu</i>	Greater Mousedeer	
17	ខ្លីន	<i>Viverra zibetha</i>	Large Indian Civet	III
18	ខ្លាត្រី	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Fishing Cat	II
19	ផ្តែចចក	<i>Canis aureus</i>	Asiatic Jackal	III
20	ឆ្មាជារ	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Leopard Cat	II
21	អ្នក	<i>Melogale personata</i>	Large-toothed Ferret Badger	
22	ជ្រឹងមធុរម	<i>Pteropus lylei</i>	Lyle's Flying-fox	II
23	ជ្រឹងធំ	<i>Pteropus vampyrus</i>	Large Flying-fox	II
24	ជ្រឹងអង្កាមកនុយឌី	<i>Megaerops niphanae</i>	Northern Tail-less Fruit Bat	
25	ជ្រឹងអង្កាមច្រមុះតូច	<i>Cynopterus brachyotis</i>	Lesser Short-nosed Fruit Bat	
26	ជ្រឹងអង្កាមច្រមុះធំ	<i>Cynopterus sphinx</i>	Greater Short-nosed Fruit Bat	
27	ជ្រឹងអង្កាមអណ្តាតធំ	<i>Macroglossus sobrinus</i>	Greater Long-tongued Fruit Bat	
28	ជ្រូកព្រៃ	<i>Sus scrofa</i>	Wild Pig	
29	ល្អៀស	<i>Muntiacus muntjak</i>	Red Muntjac	
30	ទន្សាយគល់	<i>Lepus peguensis</i>	Burmese Hare	
31	ប្រចៀវ	(Order: CHIROPTERA)	Bats	
32	ប្រមាំ	<i>Hystrix brachyura</i>	East Asian Porcupine	
33	ប្រមោញ	<i>Atherurus macrourus</i>	Asian Brush-tailed Porcupine	
34	ច្រើស	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar	
35	សំពោតកលៀង ឬ កាំង	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten	III
36	សំពោតក្រអូប ឬ សំពោតភ្លោក	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Common Palm Civet	III

37	សំពោចធំ	<i>Viverra megaspila</i>	Large-spotted Civet	III
38	សំពោចពីណាលាត	<i>Paguma larvata</i>	Masked Palm Civet	III
39	សំពោចភ្នំ ឬ ឈ្មួសប្រៃង	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong	III
40	សំពោចវល្លិ, ឈ្មួសវល្លិ	<i>Viverricula indica</i>	Small Indian Civet	III
41	សំពោចអុជខ្នង	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	Small-toothed Palm Civet	
42	ស្កាតូច	<i>Herpestes javanicus</i>	Small Asian Mongoose	
43	ស្កាធំ	<i>Herpestes urva</i>	Crab-eating Mongoose	III
44	ស្វាភ្លាម	<i>Macaca fascicularis</i>	Long-tailed Macaque	II
45	ស្វាព្រោស	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed Macaque	II
46	ស្វាព្រាម	<i>Semnopithecus cristatus</i>	Silvered Langur	II

A Guide to the MAMMALS OF CAMBODIA



ប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយជីវចម្រុះច្រើនប្រភេទណាស់ បើយើងពិនិត្យពីអតីតកាលក្នុងភូមិសាស្ត្រ ប្រទេសយើង គឺពោរពេញទៅដោយប្រភេទសត្វស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ។ នៅក្នុងប្រទេសយើងមានថនិកសត្វចំនួន ២១២ ប្រភេទ ដែលនៅក្នុងនោះរួមមាន ទន្សោង គោព្រៃ ខ្នង រមាំង ប្រើស ក្តាន់ ឈ្លូស និង រមាសជាដើម។ ប៉ុន្តែគួរឱ្យស្តាយ ជីវចម្រុះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់ក្នុងកម្រិតមួយគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ សង្គ្រាម ភាពក្រីក្រ អនិកម្មភាព ការបំផ្លាញទីជម្រកសត្វព្រៃ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហួសកម្រិតលើ ប្រភេទសត្វព្រៃទាំងនេះ គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការបាត់បង់ធនធានសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្លាធំរាប់ សិបក្បាលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ យកស្បែក និងឆ្អឹង ដើម្បីលក់ទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនលើសកលលោក។

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើសត្វព្រៃលើសច្បាប់នៅតែបន្តមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងទូទាំងផ្ទៃប្រទេស ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញតាមរយៈការយកសត្វព្រៃជាច្រើនមកសម្លាប់ និងលក់ដូរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនានា ដូចជា អាហារដ្ឋាន ទីចិញ្ចឹមសាធារណៈ កន្លែងសុកសត្វព្រៃសម្រាប់ការនាំចេញ ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ឬយកចេញតាមច្រករបៀងនានាទៅក្រៅប្រទេស ដែលកន្លងមកនេះមានតែករណីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដែល ត្រូវបានគេចាប់ឃាត់។ បើពិនិត្យមើលតាមស្ថានភាពនេះឃើញថា សត្វព្រៃទាំងឡាយពិតជាមានសត្វព្រៃច្រើន ណាស់ ហើយខ្លាំងសត្វព្រៃដែលធំជាងគេ គឺពូកឈ្មួញទុរិតដែលជួញដូរសត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់នេះតែម្តង។

ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិគ្រប់រូប សូមមេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការបរបាញ់ ទិញ លក់ ធនធានសត្វ ព្រៃ ដើម្បីបំបាត់ឱ្យបាននូវទសវត្សរ៍អនាធិបតេយ្យជួញដូរសត្វព្រៃកន្លងមកនេះ។

(ដកស្រង់ចេញពីសន្ទនាថវិកាបស់សម្តេច **ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងឱកាសបិទអង្គ សិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃ នៅសណ្ឋាគារអាំងទែរកុងទីណង់តាល់ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០១)។